Notiziario
AGROMETEOROLOGICO
di PRODUZIONE INTEGRATA per la provincia di Macerata

7
19 febbraio 2025

Centro Agrometeo Locale - Via Cavour, 29 – Treia. Tel. 0733/216464
e-mail: calmc@regione.marche.it Sito Internet: meteo.regione.marche.it/

NOTE AGROMETEOROLOGICHE

La settimana è stata caratterizzata dalle frequenti e abbondanti precipitazioni che si sono verificate su tutto il territorio provinciale soprattutto nelle giornate di venerdì 14 e sabato 15 febbraio. L'instabilità meteorologica ha determinato anche una sensibile diminuzione delle temperature sia massime che minime.





Per visualizzare i grafici relativi alle stazioni meteorologiche della provincia si può consultare l'indirizzo: https://meteo.regione.marche.it/Monitoraggi/Meteorologia

DIFESA DEI FRUTTIFERI

I fruttiferi stanno riprendendo la loro attività vegetativa favoriti dalle condizioni meteorologiche piuttosto miti e dalle temperature generalmente superiori alle medie del periodo che hanno caratterizzato le prime settimane di febbraio. Solo occasionalmente e per brevi durate sono scese sotto lo zero di pochi gradi.

DRUPACEE	
ALBICOCCO	**Fase Fenologica: bottoni rossi - comparsa dei petali (BBCH 55 - 57)**
SUSINO	**Fase Fenologica: riposo vegetativo - bottoni bianchi (BBCH 00 - 57)**
PESCO	**Fase Fenologica: rigonfiamento gemme - calici visibili (BBCH 01 - 55)**
CILIEGIO	**Fase Fenologica: riposo vegetativo (BBCH 00)**
POMACEE	
MELO	**Fase Fenologica: riposo vegetativo (BBCH 00)**
PERO	**Fase Fenologica: riposo vegetativo - rigonfiamento gemme (BBCH 00 - 01)**

Albicocco - bottoni rossi (BBCH 55)

Pesco - calici visibili (BBCH 55)

Susino - bottoni bianchi (BBCH 57)

Ciliegio - riposo vegetativo (BBCH 00)

Melo - riposo vegetativo (BBCH 00)



Pero - rigonfiamento gemme (BBCH 01)

Di seguito si riportano i principi attivi più opportuni per i trattamenti consigliati in questa fase.

DIFESA Albicocco 2024 v2							
Avversità	Nome latino	Criteri di intervento: **vincoli**/consigli	Sostanza attiva	n. max interventi per singola s.a.	n. max interventi per gruppo di s.a.	Limitazioni d'uso e note	Limitazioni d'uso per avversità
MONILIA	Monilia laxa; Monilia fructigena; Monilia fructicola	Mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo delle piante attraverso il contenimento dei rapporti di azoto liquido e di acqua di irrigazione, evitare i ristagni idrici. Intervenire con un trattamento cautelativo nella fase di prefioritura.	*Bacillus subtilis* (♣)	4			Contro questa avversità sono consentiti al massimo 3 trattamenti all'anno.
			Bacillus amyloliquefaciens(♣)	6			
			Saccharomyces cerevisiae (♣)				
			Bicarbonato di potassio (♣)				
			Polisolfuro di Ca (♣)				
			Cyprodinil	1		In alternativa al Pyrimethanil Tra Cyprodinil e Fludioxonil è ammesso un unico intervento all'anno impiegando la singola s.a. se ammessa o la miscela delle due.	
			Fludioxonil	1		Tra Cyprodinil e Fludioxonil è ammesso un unico intervento all'anno impiegando la singola s.a. se ammessa o la miscela delle due.	
			Fenexamid	2	3		
			Fenpyrazamina	2			
			Penthiopyrad.	1	3		
			Isofetamid	2			

DIFESA Ciliegio 2024 v2							
Avversità	Nome latino	Criteri di intervento: **vincoli**/consigli	Sostanza attiva	n. max interventi per singola s.a.	n. max interventi per gruppo di s.a.	Limitazioni d'uso e note	Limitazioni d'uso per avversità
MONILIA	Monilia laxa; Monilia fructigena; Monilia fructicola	Mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo delle piante attraverso il contenimento degli apporti di azoto e di acqua di irrigazione, impedire i ristagni idrici nel terreno. I trattamenti vanno posizionati in pre-fioritura e a caduta dei petali, in funzione dell'andamento climatico.	*Bacillus subtilis* (♣)				Al massimo 3 trattamenti all'anno contro questa avversità.
			Bicarbonato di potassio (♣)				
			Polisolfuro di Ca (♣),				
			Cyprodinil	1		Tra Cyprodinil e Fludioxonil è ammesso un unico intervento all'anno impiegando la singola s.a. se ammessa o la miscela delle due.	
			Fludioxonil	1		Tra Cyprodinil e Fludioxonil è ammesso un unico intervento all'anno impiegando la singola s.a. se ammessa o la miscela delle due.	
			Fenexamid		2		
			Fenpyrazamina				
			Isofetamid	2	3	Massimo 3 interventi all'anno tra Boscalid, Fluopyram e Isofetamid indipendentemente dall'avversità	

DIFESA Susino 2024 v2							
Avversità	Nome latino	Criteri di intervento: **vincoli**/consigli	Sostanza attiva	n. max interventi per singola s.a.	n. max interventi per gruppo di s.a.	Limitazioni d'uso e note	Limitazioni d'uso per avversità
MONILIA	Monilia laxa; Monilia fructigena; Monilia fructicola	Mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo delle piante attraverso il contenimento dei rapporti di azoto liquido e di acqua di irrigazione, evitare i ristagni idrici. Intervenire con un trattamento cautelativo nella fase di prefioritura.	*Bacillus subtilis (♣)*				Al massimo 3 trattamenti all'anno contro questa avversità, sono ammessi 4 trattamenti su cultivar raccolte dal 15 agosto in poi.
			Saccharomyces cerevisiae (♣)				
			Bicarbonato di potassio (♣)				
			Polisolfuro di Ca (♣)				
			Cyprodinil	1		Tra Cyprodinil e Fludioxonil è ammesso un unico intervento all'anno impiegando la singola sostanza attiva se ammessa o la miscela delle 2	
			Fludioxonil	**1**			
			Fenexamid	2	3		
			Fenpyrazamina	2			
TRIPIDI	Taeniothrips meridionalis	Soglia: Presenza sulle varietà sensibili	*Sali potassici di acidi Grassi (♣)*				Massimo 1 trattamento all'anno contro questa avversità
			Beauveria bassiana (♣)				
			Lambda-cialotrina	1	3		
			Deltametrina	2			
			Azadiractina A (♣)				
AFIDE FARINOSO DEL PESCO	Hyalopterus sp.	**Soglia: Presenza** Intervenire preferibilmente in maniera localizzata sulle piante infestate	*Sali potassici di acidi Grassi (♣)*				
			Acetamiprid	2			
			Flonicamid	1			
TENTREDINI	Hoplocampa sp.	Eseguire il monitoraggio con trappole cromotropiche di colore bianco nel periodo compreso fra pre-fioritura e allegagione- Soglia: 50 catture/trappola.	Deltametrina	2	3		Contro questa avversità massimo 1 intervento all'anno

DIFESA Pesco 2024 v2							
Avversità	Nome latino	Criteri di intervento: **vincoli**/consigli	Sostanza attiva	n. max interventi per singola s.a.	n. max interventi per gruppo di s.a.	Limitazioni d'uso e note	Limitazioni d'uso per avversità
MONILIA	Monilia laxa; Monilia fructicola; Monilia fructigena	Ridurre le concimazioni azotate, eseguire potature equilibrate, limitare le irrigazioni, raccogliere e distruggere i frutti mummificati e i rami colpiti. Intervenire con un trattamento cautelativo nella fase di pre-fioritura e successivamente alla caduta dei petali in condizione di elevata umidità relativa atmosferica.	*Bacillus subtilis* (♣)				Al massimo 3 trattamenti all'anno contro questa avversità - ammessi 4 trattamenti su cultivar raccolte dal 15 agosto in poi
			Bacillus amyloliquefaciens(♣)	6			
			Bicarbonato di potassio (♣)				
			Polisolfuro di Ca (♣)				
			Saccharomyces cerevisiae (♣),				
			Cyprodinil	1		Tra Cyprodinil e Fludioxonil è ammesso un unico intervento all'anno impiegando la singola s.a. se ammessa o la miscela delle 2	
			Fludioxonil	1		Tra Cyprodinil e Fludioxonil è ammesso un unico intervento all'anno impiegando la singola s.a. se ammessa o la miscela delle 2	
			Fenexamid	2	3		
			Fenpirazamine	2			
			Penthiopyrad	1	3	Massimo 3 interventi all'anno tra Boscalid, Fluxapyroxad, Penthiopiyad e Fluopyram indipendentemente dall'avversità	
CANCRI RAMEALI	*Fusicoccum amygdali; Cytospora spp*	Limitare le concimazioni azotate, evitare i ristagni idrici, raccogliere e distruggere i rametti infetti. Intervenire alla caduta delle foglie e ripetere il trattamento nella fase di bottoni rosa.	***Prodotti rameici** * (♣)			In vegetazione limitare l'impiego ad un massimo di 4 interventi all'anno.	
			Captano	4		Tra Captano e Ziram massimo 4 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità.	
			Trichoderma asperellum (♣)				
			Trichoderma gamsii (♣)				
			Trichoderma atroviride (♣)			Ammesso solo su Fusicoccum	
AFIDE VERDE DEL PESCO	Myzus persicae	**Soglia: Nella fase di bottone rosa presenza di fondatrici. Soglia: In post-fioritura 3% di germogli infestati per le nettarine e 10%per pesche e percoche**	*Sali potassici di acidi Grassi* (♣)				
			Beauveria bassiana (♣)				
			Flonicamid	2			
			Acetamiprid	2			
			Spirotetramat	1			
			Tau-fluvalinate	2	3	Impiego consentito nel solo trattamento per-fiorale	
AFIDE FARINOSO DEL PESCO	Hyalopterus sp.	**Soglia: Presenza** Intervenire preferibilmente in maniera localizzata sulle piante infestate	*Sali potassici di acidi Grassi* (♣)				
			Spirotetramat	1			
			Acetamiprid	2			

DIFESA Pesco 2024 v2							
Avversità	Nome latino	Criteri di intervento: **vincoli**/consigli	Sostanza attiva	n. max interventi per singola s.a.	n. max interventi per gruppo di s.a.	Limitazioni d'uso e note	Limitazioni d'uso per avversità
AFIDE SIGARAIO	Myzus varians	**Soglia: Nella fase di bottone rosa presenza di fondatrici. Soglia: In post-fioritura 3% di germogli infestati per le nettarine e 10%per pesche e percoche**	*Sali potassici di acidi Grassi (♣)*				
			Beauveria bassiana (♣)				
			Acetamiprid	2			
			Spirotetramat	1			
TRIPIDI	Taeniothrips meridionalis; Thrips major	**Soglia: Presenza** Eseguire i campionamenti su varietà nettarine, maggiormente suscettibili a questi parassiti.	*Azadiractina A (♣)*				Nel periodo primaverile sono ammessi al massimo 2 trattamenti da effettuarsi in concomitanza delle fasi fenologiche di pre e post fioritura. Ammesso un ulteriore intervento nel periodo estivo contro Thrips major.
			Sali potassici di acidi Grassi (♣)				
			Beauveria bassiana (♣)				
			Spinosad (♣)	3	3		
			Spinetoram	1			
			Tau-fluvalinate	2	3		
			Etofenprox	**1**			
			Deltametrina			Ammessa in pre-fioritura	
			Formetanato	1			

Con il simbolo (♣) vengono indicati i principi attivi ammessi in agricoltura biologica.

*Non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di Rame per ettaro nell'arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo applicato di 4 kg di Rame per ettaro all'anno (al raggiungimento di tale limite concorrono anche gli apporti di Rame metallo impiegati per la fertilizzazione). In vegetazione limitare l'impiego ad un massimo di 4 interventi all'anno.

Nella colonna "criteri di intervento: **vincoli**/consigli" in **grassetto** sono riportati i **vincoli.**

Nella colonna "sostanza attiva" in **grassetto** sono riportati i **candidati alla sostituzione** e *in corsivo,* evidenziati in verde, i principi attivi ammessi in agricoltura biologica.

BOLLETTINO NITRATI

Come negli anni scorsi, a partire dal mese di febbraio, riprenderà la pubblicazione del Bollettino Nitrati (visibile on-line all'indirizzo https://meteo.regione.marche.it/Nitrati). Il Bollettino Nitrati viene emesso in applicazione alla DGR Marche 1282 del 22 ottobre 2019 "Programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola".
La DGR Marche 1282/2019 prevede (in ottemperanza al DM 5046 del 26/02/2016) un periodo invernale di divieto di distribuzione di fertilizzanti azotati pari a 90 giorni di cui 62 fissi, a partire dal 1 dicembre al 31 gennaio, mentre altri 28 giorni (distribuiti fra il mese di novembre e febbraio) stabiliti sulla base delle condizioni pedoclimatiche locali. Al fine di ottimizzare, dal punto di vista agronomico, i periodi nei quali è consentito lo spandimento, anche sulla base delle esperienze degli anni precedenti, nel mese di novembre verranno comunque individuati almeno 15 giorni di divieto spandimento, così da poter comunque avere un congruo numero di giorni utili anche nel mese di febbraio. Si precisa che il rispetto di tale calendario di distribuzione è vincolante soltanto per le aziende che ricadono in Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN) e solo per i seguenti materiali:

a) Concimi azotati ed ammendanti organici di cui al Decreto Legislativo 29 aprile 2010 n.75, ad eccezione dell'ammendante compostato verde e dell'ammendante compostato misto con tenore di azoto < 2,5% sul secco (di questo non più del 20% in forma ammoniacale)
b) I letami, ad eccezione del letame bovino, ovicaprino e di equidi, quando utilizzato su pascoli e prati permanenti o avvicendati ed in pre-impianto di colture orticole;
c) I materiali assimilati al letame;
d) Liquami, materiali ad essi assimilati ed acque reflue nei terreni con prati, ivi compresi i medicai, cereali autunno-vernini, colture ortive, arboree con inerbimento permanente o con residui colturali ed in preparazione dei terreni per la semina primaverile anticipata.

A partire dal 31 gennaio riprenderà la pubblicazione del Bollettino Nitrati, per la determinazione dei giorni in cui è vietato lo spandimento nel mese di febbraio, aggiornato con cadenza bisettimanale, il martedì (con indicazioni per i giorni di mercoledì, giovedì e venerdì) ed il venerdì (con indicazione per il sabato, domenica, lunedì e martedì). Il Bollettino potrà essere consultato al link https://meteo.regione.marche.it/Nitrati

Tutti i principi attivi indicati nel Notiziario sono previsti nelle* Linee Guida per la Produzione Integrata delle Colture, Difesa Fitosanitaria e Controllo delle Infestanti" della Regione Marche – 2024 - Finestra estiva *ciascuno con le rispettive limitazioni d'uso e pertanto il loro utilizzo risulta **conforme con i principi della difesa integrata volontaria**.
I prodotti contrassegnati con il simbolo (♣) sono ammessi anche in agricoltura biologica
Le aziende che applicano soltanto la **difesa integrata obbligatoria**, non sono tenute al rispetto delle limitazioni d'uso dei prodotti fitosanitari previste nelle Linee Guida di cui sopra, per cui possono **utilizzare tutti gli agrofarmaci regolarmente in commercio**, nei **limiti di quanto previsto in etichetta,** applicando comunque ***i principi generali di difesa integrata,*** di cui all'***allegato III del D.Lgs 150/2012, e decidendo quali misure di controllo applicare sulla base della conoscenza dei risultati dei monitoraggi e delle informazioni previste al paragrafo A.7.2.3. del PAN (DM 12 febbraio 2014)***

Nel sito https://meteo.regione.marche.it/ è attivo un **Servizio di Supporto per l'Applicazione delle Tecniche di Produzione Integrata e Biologica** dove è possibile la consultazione dei Disciplinari di Produzione e di Difesa Integrata suddivisi per schede colturali. Sono inoltre presenti link che consentono di collegarsi alle principali Banche dati per i prodotti ammessi in Agricoltura Biologica.

Per la consultazione dei prodotti commerciali disponibili sul mercato contenenti i principi attivi indicati nel presente notiziario è possibile fare riferimento alla banca dati disponibile su SIAN

Banca Dati Fitofarmaci ***Banca Dati Bio***

COMUNICAZIONI

Si comunica che è stato realizzato il nuovo sito Agrometeo, pertanto, **l'aggiornamento dei contenuti del vecchio sito** www.meteo.marche.it **non sarà più garantito**.
Al momento è in corso la migrazione dei contenuti verso il nuovo sito e quindi potrebbero verificarsi dei malfunzionamenti che possono essere comunicati a: agrometeo@regione.marche.it
Per rimanere aggiornati sulle nostre attività è possibile **consultare il nuovo sito** all'indirizzo meteo.regione.marche.it.
Ci scusiamo per gli eventuali disagi e ringraziamo per la collaborazione.

Con Decreto del Dirigente del Settore Struttura Decentrata Agricoltura di Pesaro Urbino n. 80 del 1 luglio 2024 sono state approvate le **Linee guida per la produzione integrata delle colture, difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti della Regione Marche 2024 – finestra estiva**. È possibile consultare il decreto sul sito della Regione Marche al seguente link: https://www.regione.marche.it/Portals/0/Agricoltura/ProduzioneIntegrata/DDS_DPU_2024_0080.zip

L'**AIOMA Soc. Coop. Agr.** in collaborazione con il **Consorzio di Tutela Cartoceto DOP,** organizza per i giorni **1 e 2 aprile 2025** un **Corso Base di Potatura dell'Olivo a Vaso Policonico, con prove pratiche ed esercitazioni in campo.**
Il costo del corso è di **150 €uro** (IVA INCLUSA).
Direttore del corso: dott. Giorgio Pannelli (già CREA-OFA, Spoleto)
Sede del corso:
- Lezione teorica: **Sala Biblioteca "Afra Ciscato" CARTOCETO (PU)**
- Lezioni pratiche: **Aziende olivicole della zona.**
Direttore del corso, Docente e Responsabile delle esercitazioni: dott. Giorgio Pannelli (già CREA-OFA, Spoleto e Direttore della Scuola Potatura Olivo Giorgio Pannelli srl – Impresa Sociale).
Per informazioni scrivere a: **aioma@aioma.it** oppure telefonare al n. **071-2073196.**
N.B.: il corso verrà attivato al raggiungimento di almeno 20 partecipanti
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

È stato pubblicato l'**E-book "Per fare un albero" - L'esperienza dei GO delle Marche (Sottomisura 16.1 PSR Marche 2014-2022).**
È possibile scaricare in formato pdf l'e-book edito da AMAP "Per fare un albero" – L'esperienza dei GO delle Marche, un catalogo completo di tutti i 58 Gruppi Operativi finanziati con i tre bandi della Sottomisura 16.1 del PSR 2014-2022 della Regione Marche.
Il catalogo è suddiviso in 10 tematiche che riuniscono i progetti innovativi messi in atto nella Regione Marche, in ambito di: Valorizzazione del biologico; Tutela delle risorse naturali; Zootecnia sostenibile; Bioeconomia circolare; Gestione sostenibile delle foreste; Nuove colture e prodotti; Tecniche colturali innovative; Agricoltura di precisione; Chimica verde; Agricoltura sociale.

L'AMAP, nell'ottica di garantire la migliore offerta formativa, ha istituito e detiene un "**Albo Formatori**", al fine di poter avere sempre a disposizione un elenco docenti a cui potenzialmente poter conferire incarichi sulla base delle esigenze di erogazione di attività formative.

Tra i requisiti necessari per poter presentare la propria candidatura risulta essenziale possedere un'esperienza professionale, almeno triennale, nell'area formativa prescelta.

Le aree formative individuate dall'Agenzia, definite "Specifiche" e di "Supporto – Trasversali" interessano settori quali, per esempio, quello olivicolo – oleario, zootecnico, forestale, scienze agronomiche, multifunzionalità dell'impresa agricola e benessere operatori.

Contatti e tutta la documentazione utile e necessaria ai fini dell'iscrizione nelle diverse aree tematiche al link: https://www.amap.marche.it/servizi/attivita-formative

Sul sito AMAP è disponibile, per la consultazione online, l'edizione aggiornata del Repertorio della Biodiversità agraria delle Marche.

Ulteriori informazioni su eventi AMAP sono reperibili al sito: https://www.amap.marche.it/eventi

ANDAMENTO METEOROLOGICO DAL 12/02/2025 AL 18/02/2025

	Montecosaro (45 m)	Potenza Picena (25 m)	Montefano (180 m)	Treia (230 m)	Tolentino (183 m)	Cingoli Troviggiano (265 m)	Apiro (270 m)	Cingoli Colognola (494 m)
T. Media (°C)	7.6 (7)	7.4 (7)	6.6 (7)	6.2 (7)	6.5 (7)	6.3 (7)	5.9 (7)	5.3 (7)
T. Max (°C)	14.5 (7)	14.2 (7)	14.3 (7)	14.0 (7)	13.7 (7)	15.4 (7)	14.0 (7)	12.7 (7)
T. Min. (°C)	1.8 (7)	0.6 (7)	1.7 (7)	1.1 (7)	1.5 (7)	0.9 (7)	-1.0 (7)	0.7 (7)
Umidità (%)	88.6 (7)	84.0 (7)	85.5 (7)	87.5 (7)	87.6 (7)	83.8 (7)	93.7 (7)	87.4 (7)
Prec. (mm)	43.2 (7)	37.6 (7)	42.4 (7)	44.6 (7)	32.4 (7)	53.4 (7)	49.2 (7)	58.2 (7)
ETP (mm)	7.7 (7)	8.1 (7)	7.2 (7)	7.1 (7)	6.9 (7)	7.2 (7)	7.2 (7)	6.0 (7)

	S. Angelo in Pontano (373 m)	Serrapetrona (478 m)	Sarnano (480 m)	Matelica (325 m)	Castel Raimondo (415 m)	Muccia (430 m)	Visso (978 m)	Serravalle del Chienti (925 m)
T. Media (°C)	5.8 (7)	5.4 (7)	4.9 (7)	5.6 (7)	4.9 (7)	5.6 (7)	2.4 (7)	3.2 (7)
T. Max (°C)	13.2 (7)	14.8 (7)	13.1 (7)	14.0 (7)	13.7 (7)	15.4 (7)	11.2 (7)	14.4 (7)
T. Min. (°C)	1.0 (7)	0.0 (7)	-0.4 (7)	-0.4 (7)	-0.2 (7)	-0.3 (7)	-3.3 (7)	-2.8 (7)
Umidità (%)	87.1 (7)	91.0 (7)	87.5 (7)	84.8 (7)	82.7 (7)	87.3 (7)	89.4 (7)	90.4 (7)
Prec. (mm)	51.6 (7)	39.0 (7)	55.6 (7)	40.8 (7)	51.8 (7)	42.8 (7)	43.4 (7)	62.0 (7)
ETP (mm)	6.5 (7)	6.7 (7)	6.5 (7)	7.4 (7)	7.0 (7)	8.1 (7)	6.0 (7)	7.3 (7)

SITUAZIONE METEOROLOGICA ED EVOLUZIONE

Il Vecchio Continente appare diviso in due macroaree, quella orientale influenzata dalla maestosa area depressionaria gelida di stampo artico-continentale, e in spinta dalla Russia, e quella occidentale contaminata dall'azione dal campo anticiclonico di matrice subtropicale oceanica in proiezione verso l'Europa di sud-ovest. Il Bel Paese viene così a trovarsi nella zona cuscinetto tra i due litiganti ricevendo convogli d'aria più mite sul versante tirrenico e al contempo ospitando ancora delle diramazioni di masse d'aria più fredde lungo il comparto adriatico, la Val Padana e le Prealpi. La dorsale appenninica funge da spartiacque tra i due flussi. Le correnti da nord-nord-est mantengono i valori termici ancora un po' sotto le medie del periodo su lato orientale pur senza indurre ripercussioni sotto il profilo precipitativo.
Per domani sono attese delle infiltrazioni umide tirreniche essenzialmente su Lazio e Sicilia, ma per il resto i modelli previsionali descrivono l'ulteriore rimonta dell'anticiclone oceanico accompagnato dalla sua dote di aria più mite. Ne conseguirà per l'Italia un tempo prevalentemente stabile con un po' di nuvolosità in transito da nord-nord-ovest, tuttavia senza produzione significativa di piogge e valori termici in recupero specialmente nei valori massimi. Solo nel corso di sabato i flussi di libeccio si accentueranno su Liguria ed Alta Toscana potendo apportare qualche fenomeno piovoso. Fino a domani spireranno sull'Adriatico e sulla Val Padana correnti fredde nord-orientali, mentre saranno possibili locali brinate/gelate e qualche banco di nebbia al primo mattino, specie nei fondivalle interni con scarsa ventilazione.

PREVISIONE DEL TEMPO SULLE MARCHE

Giovedì 20: Cielo alla prevalente nuvolosità della prima mattinata seguiranno schiarite sempre più ampie da nord per il resto della giornata Precipitazioni assenti. Venti deboli da nord-ovest all'interno, da nord sulla costa. Temperature in leggero aumento.
Venerdì 21: Cielo a parte un po' di nuvolaglia bassa mattutina, il cielo risulterà sereno o poco coperto. Precipitazioni assenti. Venti deboli da nord-est sull'entroterra, da nord/nord-ovest lungo la costa. Temperature in flessione le minime, in lieve aumento le massime. Possibilità di deboli brinate mattutine nei fondivalle interni.
Sabato 22: Cielo in mattinata, poco nuvoloso, specialmente sulla fascia costiera; incremento di nuvolaglia medio-bassa dall'interno specialmente sulla fascia appenninica dalle ore centrali. Precipitazioni assenti. Venti deboli da sud/sud-est sulla costa, da ovest/sud-ovest sull'entroterra. Temperature in crescita.
Domenica 23: Cielo affetto da nuvolosità parziale e sparsa. Precipitazioni ad oggi non se ne escludono di isolate. Venti deboli da nord-nord-ovest, per lo più deboli, ma sino a moderati lungo la fascia costiera. Temperature ancora in ascesa.

Previsioni elaborate dal Centro Operativo di Agrometeorologia

Le previsioni meteorologiche aggiornate quotidianamente (dal lunedì al venerdì) sono consultabili all'indirizzo: https://meteo.regione.marche.it/Previsioni

È TEMPO DI AGRICOLTURA
PSR MARCHE 2014-2020 Unione Europea / Regione Marche PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020
FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI
Unione Europea
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
REGIONE MARCHE

Notiziario curato dal Centro Agrometeo Locale per la Provincia di Macerata, d'intesa con il Servizio Fitosanitario Regionale.
Per informazioni: Dott. Alberto Giuliani - Tel. 0733/216464

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche vi informiamo che i vostri dati personali comuni sono acquisiti e trattati nell'ambito e per le finalità della fornitura, dietro vostra richiesta, del presente servizio informativo, nonché per tutti gli adempimenti conseguenti. Il titolare del trattamento è: MarcheAgricolturaPesca - via Thomas Edison, 2 Osimo Stazione, a cui potete rivolgervi per esercitare i vostri diritti di legge. L'eventuale revoca del consenso al trattamento comporterà, fra l'altro, la cessazione dell'erogazione del servizio.