




di PRODUZIONE INTEGRATA per la provincia di Pesaro e Urbino

Centro Agrometeo Locale - Via Marconi,1 – Calcinelli di Colli al Metauro Tel.0721/896222  
Fax 0721/879337 e-mail: [calps@regione.marche.it](mailto:calps@regione.marche.it) Sito Internet: [www.meteo.marche.it](http://www.meteo.marche.it)

### NOTE AGROMETEOROLOGICHE

Settimana contraddistinta da instabilità, nei giorni scorsi si sono registrate precipitazioni sparse di tipo temporalesco, localmente e a tratti anche di forte intensità, si riscontra una accentuata escursione termica: è possibile consultare tutti i grafici meteorologici disponibili per l'intera provincia al seguente indirizzo: [http://meteo.regione.marche.it/calmonitoraggio/pu\\_home.aspx](http://meteo.regione.marche.it/calmonitoraggio/pu_home.aspx).



## OLIVO: MOSCA DELLE OLIVE

La fase fenologica raggiunta è quella di invaiatura [BBCH 81](#).

Dal monitoraggio effettuato questa settimana si evidenzia nella maggior parte delle aziende una ripresa delle catture di adulti nelle trappole, dall'analisi delle drupe si evidenzia una modesta ovideposizione.

In relazione a quanto riscontrato e in considerazione delle condizioni meteorologiche ottimali per lo sviluppo della mosca olearia, **si consiglia di intervenire tempestivamente, a tutte le aziende olivicole della fascia a rischio elevato (3) e a rischio medio (2), con un trattamento di tipo adulticida localizzato o a tutta chioma.**

In sintesi:

| DIFESA INTEGRATA – AZIENDE CONVENZIONALI                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AREA DA TRATTARE</b>                                                      | <p><b>Fascia 3 (elevato rischio): sottozona litoranea:</b> Gabicce Mare, Gradara, Pesaro, Tavullia, Fano, San Costanzo, Mondolfo.</p> <p><b>Sottozona collinare:</b> Cartoceto, Colli al Metauro, Mombaroccio, Mondavio, Monte Porzio, Montelabbate, Terre Roveresche, Vallefoglia.</p> <p><b>Fascia 2 ( medio rischio):</b> Acqualagna, Auditore, Fermignano, Fossombrone, Fratte Rosa, Isola del Piano, Montecalvo in Foglia, Monteciccardo, Montefelcino, Pergola, Petriano, San Lorenzo in Campo, Sant'Ippolito, Tavoletto.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>METODO ADULTICIDA</b><br>(applicazione localizzata su parte della chioma) | <b>Modalità del trattamento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Applicazione localizzata su parte della chioma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                              | <b>Prodotti utilizzabili</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p><b>Spinosad</b>(♣) già formulato con specifica esca pronta per l'uso per 1 ettaro di oliveto utilizzare 1 litro di prodotto commerciale, (max 6 interventi anno).</p> <p><b>Acetamiprid</b> (<b>ATTENZIONE E' CONSENTITO L'UTILIZZO DEI SOLI FORMULATI COMMERCIALI CHE RIPORTANO IN ETICHETTA L'USO LOCALIZZATO CON ESCHE ATTRATTIVE, INDICATIVAMENTE 100 ML DI PRODOTTO PER ETTARO DISTRIBUITI IN 30 LITRI DI ACQUA</b>).</p> <p><b>Cyantraniliprole:</b> autorizzato all'uso specifico con modalità bait spray per l'applicazione di trattamenti adulticidi su porzione di chioma con max 3 trattamenti per anno. Impiegare 75 ml /ha di prodotto in combinazione con esca attrattiva a base di proteine idrolizzate (VISAREL 1.25 ml/ha) con un volume d'acqua compreso tra i 5 e 30 l/ha.</p> <p><b>Con DDS n 794 del 13 Agosto è stata concessa la deroga alle "Linee guida per la produzione integrata delle colture, difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti" della Regione Marche 2021 per l'impiego della s.a. Cyantraniliprole con modalità bait spray.</b></p> |
| OPPURE IN ALTERNATIVA                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>METODO ADULTICIDA</b><br>(applicazione a tutta chioma)                    | <b>Modalità del trattamento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | su tutta la chioma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                              | <b>Prodotti utilizzabili</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p><b>Beauveria bassiana</b>(♣), ammessa in bio e dotata anche di azione repellente</p> <p><b>Piretro</b> (♣) ammesso in bio</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>EPOCA DI INTERVENTO</b>                                                   | Tempestivamente entro giovedì 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| DIFESA CON METODO DI COLTIVAZIONE BIOLOGICO                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Soglia d'intervento per olive da olio</b>                              | 1% di infestazione attiva (uova e larve di I e II età) per cultivar da olio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |
| <b>AREA DA TRATTARE</b>                                                   | <p><b>Fascia 3 (elevato rischio): sottozona litoranea:</b> Gabicce Mare, Gradara, Pesaro, Tavullia, Fano, San Costanzo, Mondolfo.</p> <p><b>Sottozona collinare:</b> Cartoceto, Colli al Metauro, Mombaroccio, Mondavio, Monte Porzio, Montelabbate, Terre Roveresche, Vallefoglia.</p> <p><b>Fascia 2 (medio rischio):</b> Acqualagna, Auditore, Fermignano, Fossombrone, Fratte Rosa, Isola del Piano, Montecalvo in Foglia, Monteciccardo, Montefelcino, Pergola, Petriano, San Lorenzo in Campo, Sant'Ippolito, Tavoletto.</p> |                                                                                                                                                                 |
| <b>METODO ADULTICIDA (applicazione localizzata su parte della chioma)</b> | <b>Prodotti utilizzabili</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Spinosad:</b> già formulato con specifica esca pronta per l'uso, per 1 ettaro di oliveto utilizzare 1 litro di prodotto commerciale, (max 6 interventi anno) |
| <b>OPPURE IN ALTERNATIVA</b>                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |
| <b>METODO ADULTICIDA (applicazione a tutta chioma)</b>                    | <b>Prodotti utilizzabili</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Beauveria bassiana</b>, dotata anche di azione repellente, da distribuire a tutta chioma.</p> <p><b>Piretro</b></p>                                       |
| <b>EPOCA DI INTERVENTO</b>                                                | Tempestivamente entro giovedì 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |

### OLIVO: indici di maturazione

Le olive si apprestano alla maturazione ma in molti casi sono di piccole dimensioni a causa della siccità.

Anche quest'anno verranno forniti i dati relativi all'evoluzione degli indici di maturazione, riferiti a piante aventi una carica media, delle principali cultivar: **Leccino**, **Raggiola** e **Frantoio**, in zona litoranea ed interna; al fine di individuare l'epoca ottimale di raccolta, intesa come periodo in cui poter conciliare la massima quantità di olio con la migliore qualità.

Gli indici che verranno valutati sono:

**1. Indice di invaiatura:** è un indice visivo, utile per indicare il modello di colorazione delle varietà (ad esempio precoce e contemporaneo nel Leccino, tardivo e scalare nel Frantoio).

Per ogni classe di colore viene attribuito un numero indice come riportato nella tabella sottostante:

|          |                                             |
|----------|---------------------------------------------|
| Indice 0 | olive tutte verdi                           |
| Indice 1 | olive invaiate su meno del 50% della buccia |
| Indice 2 | olive invaiate su più del 50% della buccia  |
| Indice 3 | olive tutte invaiate in superficie          |
| Indice 4 | olive invaiate su meno del 50% della polpa  |
| Indice 5 | olive invaiate fino in profondità           |

| Indice 0                                                                            | Indice 1                                                                            | Indice 2                                                                            | Indice 3                                                                             | Indice 4                                                                              | Indice 5                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| olive tutte verdi                                                                   | olive invaiate su meno del 50% della buccia                                         | olive invaiate su più del 50% della buccia                                          | olive tutte invaiate in superficie                                                   | olive invaiate su meno del 50% della polpa                                            | olive invaiate fino in profondità                                                     |
|  |  |  |  |  |  |

**2. Consistenza della polpa:** viene misurata con il penetrometro, strumento con un puntale di un mm di diametro che, forando le olive, misura il grado di ammorbidimento della polpa. Con la maturazione la consistenza della polpa tende a diminuire più o meno velocemente a seconda delle varietà. Valori troppo bassi di penetrometria rischiano di compromettere l'integrità del frutto, e di conseguenza la qualità dell'olio (aumento di acidità, riduzione dei perossidi, difetti sensoriali di avvinato e riscaldamento, ecc....).

**In generale si consiglia di raccogliere le olive con un indice di penetrometria non inferiore ai 350 g/mm<sup>2</sup> al fine di mantenere un buon livello qualitativo dell'olio.**

### VITE DA VINO

La coltura si trova nella fase fenologica di maturazione: **BBCH 89**.

Le operazioni di vendemmia negli areali viticoli provinciali sono ormai nelle fasi conclusive.

Di seguito si riportano i dati delle analisi delle uve del vitigno Montepulciano che è fra i più tardivi ed emerge che sia il valore del grado zuccherino sia il valore dell'acidità rispetto la scorsa settimana è pressoché invariato.

Nella tabella che segue si riportano i valori delle analisi effettuati questa settimana:

|                    | Zona litoranea | Zona collinare |
|--------------------|----------------|----------------|
| Vitigni*           | Montepulciano  | Montepulciano  |
| Zuccheri (°Babo)   | 18÷18.8        | 21.8           |
| Acidità tot. (g/l) | 6              | 6              |
| pH                 | 3.3÷3.4        | 3.3            |

*i dati riportati in tabella si riferiscono a n. 3 campioni prelevati il 21.9.2021*

Si consiglia di segnare le viti colpite da mal dell'esca al fine di procedere poi con la potatura in maniera separata da quelle sane.

Nel sito [www.meteo.marche.it](http://www.meteo.marche.it) è attivo un **Servizio di Supporto per l'Applicazione delle Tecniche di Produzione Integrata e Biologica** dove è possibile la consultazione dei Disciplinari di Produzione e di Difesa Integrata suddivisi per schede colturali. Sono inoltre presenti link che consentono di collegarsi alle principali Banche dati per i prodotti ammessi in Agricoltura Biologica.

Il risultato completo dell'intera **attività di monitoraggio** (meteorologico, fenologico e fitopatologico) effettuato dal Servizio Agrometeorologico è consultabile all'indirizzo: [http://meteo.regione.marche.it/calmonitoraggio/pu\\_home.aspx](http://meteo.regione.marche.it/calmonitoraggio/pu_home.aspx)

Tutti i principi attivi indicati nel Notiziario sono previsti nelle "Linee Guida per la Produzione Integrata delle colture, Difesa Fitosanitaria e Controllo delle Infestanti" della Regione Marche 2021 [http://www.meteo.marche.it/news/2021/LineeGuidaPI\\_2021\\_estiva.pdf](http://www.meteo.marche.it/news/2021/LineeGuidaPI_2021_estiva.pdf) ciascuno con le rispettive limitazioni e pertanto il loro utilizzo risulta conforme con i principi della **difesa integrata volontaria**.

Le aziende che applicano soltanto la **difesa integrata obbligatoria**, non sono tenute al rispetto delle limitazioni d'uso dei prodotti fitosanitari previste nelle Linee Guida di cui sopra, per cui possono utilizzare tutti gli agro farmaci regolarmente in commercio, **nei limiti di quanto previsto in etichetta**, applicando comunque i principi generali di difesa integrata, di cui all'allegato III del D.Lgs 150/2012, e decidendo quali misure di controllo applicare sulla base della conoscenza dei risultati dei monitoraggi e delle informazioni previste al paragrafo A.7.2.3. del PAN (DM 12 febbraio 2014). Con il simbolo (♣) vengono indicati i principi attivi ammessi in agricoltura biologica.

Per la consultazione dei prodotti commerciali disponibili sul mercato contenenti i principi attivi indicati nel presente notiziario è possibile fare riferimento alla banca dati disponibile su SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale).

[Banca Dati Fitofarmaci](#)



[Banca Dati Bio](#)



### APPUNTAMENTI E COMUNICAZIONI

Con Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentare n 794 del 13 Agosto è stata concessa la deroga alle “Linee guida per la produzione integrata delle colture, difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti” della Regione Marche 2021 secondo il dettaglio della tabella riportata nella pagina seguente:

| Colture interessate alla deroga (e avversità) | Ambito applicazione della deroga (Comuni e/o territorio specifico)                                                         | DEROGHE AL DISCIPLINARE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OLIVO (mosca dell'olivo)                      | Tutto il territorio della REGIONE MARCHE                                                                                   | di consentire la deroga in tutto il territorio regionale al disciplinare di difesa integrata 2021 in merito all'utilizzo di prodotti insetticidi contenenti la sostanza attiva <b>Cyantraniliprole</b> recentemente autorizzati allo specifico uso con modalità <b>bait spray</b> per l'applicazione di trattamenti adulti su porzione di chioma (ammessi n° 3 interventi da etichetta) con l'indicazione di intervenire nel rispetto delle indicazioni di etichetta;                                                                                                                                                                                     |
|                                               | ZONE DEL TERRITORIO REGIONALE INDIVIDUATE DALL'ASSAM NEI NOTIZIARI AGROMETEO                                               | di consentire, solo ed unicamente nelle zone in cui i prossimi notiziari agrometeo individuino tale necessità, deroga al disciplinare di difesa integrata 2021, consentendo l'esecuzione di complessivi n° 3 interventi larvicidi a piena chioma per il controllo della mosca dell'olivo (il disciplinare ne ammette n.2), comunque nel rispetto del limite complessivo di n° 2 interventi con la s.a. acetamiprid e di n° 1 intervento con la s.a. fosmet e nel rispetto delle indicazioni di etichetta dei formulati commerciali;                                                                                                                       |
|                                               | Comuni di<br>– GRADARA<br>– PESARO<br>– VALLEFOGLIA<br>– MONTEFELCINO<br>– ISOLA DEL PIANO<br>– CARTOCETO<br>– FOSSOMBRONE | di consentire alle aziende che ricadono nei comuni di <b>GRADARA, PESARO, VALLEFOGLIA, MONTEFELCINO, ISOLA DEL PIANO. CARTOCETO E FOSSOMBRONE</b> e che nel mese di maggio abbiano effettuato un trattamento con la s.a. acetamiprid per il controllo della cecidomia fogliare, deroga al disciplinare di difesa integrata 2021, solo ed unicamente nelle zone in cui i prossimi notiziari agrometeo individuino tale necessità, di eseguire n° 3 interventi larvicidi a piena chioma per il controllo della mosca dell'olivo, di cui n° 2 interventi con la s.a. fosmet, comunque nel rispetto delle indicazioni di etichetta dei formulati commerciali. |

Il testo integrale del documento è consultabile e scaricabile al seguente indirizzo:

[http://www.meteo.marche.it/news/2021/DDS\\_794\\_AEA\\_2021\\_deroga\\_olivo.pdf](http://www.meteo.marche.it/news/2021/DDS_794_AEA_2021_deroga_olivo.pdf)

### ANDAMENTO METEOROLOGICO DAL 15 AL 21 SETTEMBRE

|                  | Quota stazione (m.s.l.m) | Temp. Media (°C) | Temp. Max (°C) | Temp. Min (°C) | Umidità relativa (%) | Precipitazione (mm) |
|------------------|--------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------|---------------------|
| FANO             | 11                       | 21.9 (7)         | 33.2 (7)       | 13.7 (7)       | 73.4 (7)             | 17.6 (7)            |
| PESARO           | 40                       | 22.1 (7)         | 32.2 (7)       | 13.0 (7)       | 70.8 (7)             | 19.4 (7)            |
| MONDOLFO         | 90                       | 22.0 (7)         | 32.3 (7)       | 14.0 (7)       | 68.8 (7)             | 28.6 (7)            |
| MONTELABBATE     | 110                      | 21.0 (7)         | 31.1 (7)       | 11.1 (7)       | 71.9 (7)             | 23.0 (7)            |
| PIAGGE           | 120                      | 22.0 (7)         | 32.0 (7)       | 13.7 (7)       | 57.1 (7)             | 33.8 (7)            |
| SERRUNGARINA     | 210                      | 20.6 (7)         | 30.3 (7)       | 13.0 (7)       | 61.7 (7)             | 33.2 (7)            |
| S. LORENZO IN C. | 260                      | 22.2 (7)         | 31.5 (7)       | 13.6 (7)       | 64.2 (7)             | 19.8 (7)            |
| MONTEFELCINO     | 270                      | 21.1 (7)         | 30.2 (7)       | 12.1 (7)       | 61.3 (7)             | 19.0 (7)            |
| CAGLI            | 280                      | 20.6 (7)         | 29.5 (7)       | 10.6 (7)       | 70.6 (7)             | 23.6 (7)            |
| ACQUALAGNA       | 295                      | 19.4 (7)         | 28.4 (7)       | 7.9 (7)        | 72.1 (7)             | 18.6 (7)            |
| SASSOCORVARO     | 340                      | 20.8 (7)         | 30.8 (7)       | 13.9 (7)       | 69.3 (7)             | 16.8 (7)            |
| S. ANGELO IN V.  | 360                      | 19.2 (7)         | 28.4 (7)       | 9.7 (7)        | 76.4 (7)             | 28.0 (7)            |
| URBINO*          | 476                      | 19.9 (7)         | 27.6 (7)       | 13.4 (7)       | 83.1 (7)             | 14.5 (7)            |
| FRONTONE         | 530                      | 18.7 (7)         | 25.6 (7)       | 10.1 (7)       | 65.2 (7)             | 39.4 (7)            |

\* Stazione dell'Osservatorio Meteorologico "A. Serpieri" Università degli Studi di Urbino;

## SITUAZIONE METEOROLOGICA E EVOLUZIONE

L'allungamento verso la Francia dell'alta pressione atlantica e, al contempo, la risalita del promontorio nord-africano hanno interrotto il flusso di correnti umide orientali che alimentavano un vortice iberico. La figura ciclonica complice, con la sua rotazione, del sollevamento dell'anticiclone nord-africano, è stata dunque isolata e non è più in grado di influenzare le condizioni sul territorio italiano dove infatti il bel tempo è tornato decisamente a prevalere. C'è da aggiungere che la fusione altopressionaria che sta avvenendo sui nostri cieli riesce anche ad impedire che una vasta massa d'aria freddo-umida orientale in discesa sui Balcani dilaghi anche sulle nostre regioni; la sua presenza si avverte comunque nei valori termici mattutini piuttosto "frizzantini" sul versante adriatico. Le regioni centrali adriatiche si vengono a trovare oggi sul corridoio di correnti freddo-umide solcato da un nucleo depressionario, staccatosi dalla saccatura principale che scorre alle alte latitudini europee ed in movimento verso la Spagna. Sicché, le suddette regioni continuano a subire una certa instabilità con valori termici in progressiva discesa.

L'alta pressione, nella fattispecie nord-africana, in ulteriore rafforzamento ancora per la presenza della circolazione ciclonica iberica, garantirà diffuse condizioni di stabilità fino a sabato. Le temperature, condizionate dal freddo balcanico, torneranno a risalire dalla giornata di venerdì. Un peggioramento è atteso per domenica quando verremo interessati dalla migrazione verso oriente del vortice occidentale che nel frattempo verrà agganciato da una saccatura nord-atlantica. Le precipitazioni si manifesteranno anche in modo intenso sulle regioni settentrionali e centrali tirreniche mentre la restante parte del territorio resterà sotto la protezione anticiclonica.

## PREVISIONE DEL TEMPO SULLE MARCHE

**giovedì 23** Cielo sereno o poco velato. Precipitazioni assenti. Venti deboli orientali. Temperature in lieve aumento le massime. Altri fenomeni ad inizio giornata, possibili locali foschie specie sui fondovalle dell'entroterra.

**venerdì 24** Cielo sereno. Precipitazioni assenti. Venti deboli meridionali. Temperature in crescita, marcata per le massime.

**sabato 25** Cielo generalmente sereno. Precipitazioni assenti. Venti meridionali, deboli in genere, più avvertibili nel pomeriggio quando si disporranno da sud-est. Temperature ancora in rialzo.

**domenica 26** Cielo sereno o poco coperto con la formazione, nelle ore centrali-pomeridiane, di addensamenti sulle settore appenninico in particolare settentrionale. Precipitazioni al momento non si escludono rovesci e temporali nel pomeriggio sull'urbinate; possibile estensione dei fenomeni verso il settore costiero, sempre settentrionale, in serata. Venti ancora in prevalenza deboli e meridionali. Temperature in aumento

*Notiziario curato dal Centro Agrometeo Locale per la Provincia di Pesaro e Urbino, d'intesa con il Servizio Fitosanitario Regionale.*

*Per informazioni Dr Agr Angela Sanchioni 0721896222*



Unione Europea / Regione Marche  
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020  
FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE - L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI



Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche vi informiamo che i vostri dati personali comuni sono acquisiti e trattati nell'ambito e per le finalità della fornitura, dietro vostra richiesta, del presente servizio informativo, nonché per tutti gli adempimenti conseguenti. Il titolare del trattamento è: ASSAM - via Dell'Industria, 1 Osimo Stazione, a cui potete rivolgervi per esercitare i vostri diritti di legge. L'eventuale revoca del consenso al trattamento comporterà, fra l'altro, la cessazione dell'erogazione del servizio.

prossimo notiziario: **mercoledì 29 settembre 2021**