



Centro Agrometeo Locale - Via dell'Industria, 1 – Osimo St. Tel. 071/808242 –+ Fax. 071/85979  
e-mail: [calan@regione.marche.it](mailto:calan@regione.marche.it) Sito Internet: [www.meteo.marche.it](http://www.meteo.marche.it)


## ANALISI DELL'ONDATA DI FREDDO CHE HA COLPITO LE MARCHE NEL PERIODO 13-23 MARZO 2021

Nelle occasioni in cui l'Atlantico chiude i rubinetti, nel senso che si interrompe il flusso di correnti per loro natura umide che dall'oceano si riversano sul continente europeo, si innesca un movimento delle masse d'aria che si sviluppa lungo i meridiani. Il promontorio anticiclonico che dallo stesso oceano prende origine e che con il passare dei giorni si espande fino alle latitudini artiche inibisce, appunto, la usuale circolazione ovest-est, va a "stuzzicare" l'aria gelida nordica aiutandola a fluire verso il comparto continentale centro-orientale. Proprio una tale dinamica è stata la causa del freddo che ha interessato l'Italia dalla seconda decade del mese di marzo, investita dal flusso di correnti nordiche giunte in gran parte dai Balcani.

Analizzando i dati rilevati da alcune stazioni meteo scelte come rappresentative dell'intero territorio regionale, si osserva come l'aria fredda abbia iniziato ad interessare la nostra regione dal giorno 13 quando la temperatura media regionale è iniziata a scendere (*figura 1*). Il calo termico fra il giorno più caldo (12 marzo) e quello più freddo (18 marzo) è stato di ben **-9°C**. Con i dati aggiornati al giorno 23 marzo, la temperatura media si mantiene ancora inferiore alla norma e **il mese di marzo risulta il più freddo degli ultimi 25 anni**. Interessante osservare che, se confrontato con i mesi di marzo più freddi per le Marche (*figura 2*), quelli degli anni 1962, 1971, 1987 e 1996, quest'anno la temperatura media non è scesa mai sotto la soglia dei 0°C come invece è accaduto negli episodi più lontani (1962, 1971 e 1987); stessa caratteristica si può osservare anche per marzo 1996. Forse anche questo fatto è una testimonianza del progressivo riscaldamento globale dovuto al cambiamento climatico in atto, riscontrabile anche nella nostra regione, che progressivamente sta alzando l'asticella dei valori termici medi.

**Tra le giornate di mercoledì 17 e sabato 20, in numerose località le temperature minime sono scese sotto la soglia dei 0°C anche per parecchie ore e questo potrebbe aver provocato qualche problema alle colture (*tabella 1*).**

Poco da segnalare sul fronte delle precipitazioni, verificatesi in maggior parte come nevicate sull'Appennino per effetto dello sbarramento orografico che la catena montuosa ha imposto alla massa d'aria fredda balcanica, non particolarmente umida in partenza, che ha raccolto poi quel poco di umidità marina offerta dalla superficie dell'Adriatico. Del resto, sempre con i dati aggiornati al giorno 23, **la precipitazione totale media regionale, pari a 38mm, mostra un deficit di oltre il 41% rispetto alla norma del mese di marzo**.



*Figura 1. Andamento temperatura media (°C) regionale giornaliera, periodo 1-23 marzo 2021, confrontata con la media di riferimento 1981-2020.*




Figura 2. Andamento della temperatura media di marzo 2021 confrontata con quella dello stesso mese degli anni 1962, 1971, 1987 e 1996 che rappresentano i più freddi per le Marche dal 1961.

Provincia	Stazione	Numero ore con temp. Min < 0°C											
		domenica 14	lunedì 15	martedì 16	mercoledì 17	giovedì 18	venerdì 19	sabato 20	domenica 21	lunedì 22	martedì 23		
PU	Frontone		6		5	14	12	12	15	3	4		
	Sant'Angelo in Vado		5		12	10	13	10	4	2	2		
	Fano			4									
	Acqualagna		7	8	14	11	15	13	6				
	Cagli		6	5	10	9	11	10	3	7	5		
	Montefeltro			1									
	Montelabbate		2		8	5	10	9	4	2			
	Pesaro				3		1						
AN	Piagge					2							
	San Lorenzo in Campo					3							
	Sassofiorato					2							
	Serrungarina					2							
	Augugliano						7						
	Arcevia						9						
	Barbara						1						
	Camerano						4						
MC	Castelplanio						1						
	Falconara Marittima						6						
	Jesi						2						
	Maiolati Spontini						7						
	Santa Maria Nuova						10						
	Sassoferrato						9						
	Senigallia						10						
	Serra de' Conti						1						
AP-FM	Muccia		8	14	15	17	13	10	10	4	4		
	Matelica		5	9	12	13	12	10	3	3	3		
	Montecosaro			3		4	9	5		2			
	Apilo		2	6	11	11	12	10	2	2			
	Castelraimondo		3	1	9	15	10	9	8	4	1		
	Cingoli					1	6	2					
	Montefano						6						
	Pollenza						2			1	6		
	Potenza Picena						8	9					
	Sant'Angelo in Pontano						8	4					
	Sarnano						11	9	7		1		
	Serrapetrona						5	8					
	Serravalle di Chienti		3	12	14	15	19	15	21	9	13		
	Treia					4	7	10					
	Visso		2	9		19	17	17	24	13	5		

Tabella 1. Numero di ore con temperatura minima inferiore ai 0°C, periodo 13-23 marzo 2021.

## CEREALI AUTUNNO-VERNINI

La maggior parte degli appezzamenti si trova tra la fase di **levata** (BBCH 30-32).

Alcuni sporadici ingiallimenti e/o arrossamenti non sono dovuti a patologie fungine ma a temporanee fisiopatie dovute a stress abiotici incrociati (stress idrico, scarso azoto disponibile, **freddo**).

**Non si rileva lo sviluppo di malattie, pertanto al momento non vi è la necessità di alcun intervento fitosanitario.**

Dopo il brusco calo delle temperature e la costante presenza di vento, sarà possibile, dai prossimi giorni, rientrare in campo e riprendere le operazioni di diserbo.

## • Diserbo post-emergenza

A seguito dell'approvazione delle Linee guida per la produzione integrata delle colture – difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti della Regione Marche 2021 (DDS 162 del 18 marzo 2021) si pubblica la tabella aggiornata, in vigore dalla data di approvazione delle nuove linee guida, relativa al diserbo post-emergenza dei cereali autunno vernini.

### FRUMENTO TENERO E DURO

EPOCHE DI INTERVENTO	INFESTANTI CONTROLLATE	SOSTANZE ATTIVE	NOTE
Post emergenza precoce	Graminacee e Dicotiledoni	Diflufenican (6) Prosulfocarb Flufenacet (5) Bifenox (3) (4) Beflubutamid	(3) Impiegabile massimo una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento indipendentemente dalla coltura su cui è applicato
Post-emergenza	Graminacee	Fenoxaprop-p-ethyl (*) (7) Clodinafop-propargyl (*) Pinoxaden (*) Diclofop-metile	(4) Prodotto dicotiledonicida
	Graminacee e Dicotiledoni	Iodosulfuron-metil-sodium (*) (8) Mesosulfuron-metile (*) (8) Pyroxulam (*) (8) Propoxycarbazone-sodium (*) (8) Tiencarbazone Bensulfuron metile	(5) Non impiegabile se utilizzato per il diserbo di pre-emergenza della coltura precedente
	Dicotiledoni	Tribenuron metile Tifensulfuron metile (8) Mecoprop-P Tritosulfuron Metsulfuron metile MCPA 2,4-D Clopiralid Aminopyralid (8) Dicloprop-P (8) Halaoxyfen-metile Fluroxypyr Florasulam Amidosulfuron	(6) Dicotiledonicida con azione secondaria su graminacee. Impiegabile al massimo in un intervento per ciclo colturale  (7) Non efficace nei confronti di Lolium  (8) Impiegabile come erbicida solo in miscela  (*) formulato con antidoto

### ORZO

EPOCHE DI INTERVENTO	INFESTANTI CONTROLLATE	SOSTANZE ATTIVE	NOTE
Post-emergenza precoce	Graminacee e Dicotiledoni	Diflufenican (6) Bifenox (3)(4) Flufenacet (5) Prosulfocarb Beflubutamid	(3) Impiegabile massimo una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento indipendentemente dalla coltura su cui è applicato (4) Prodotto dicotiledonicida
Post-emergenza	Graminacee	Fenoxaprop-p-ethyl (*) (7) Pinoxaden (*) Diclofop-methyl	(5) Non impiegabile se utilizzato per il diserbo di pre-emergenza della coltura precedente
	Dicotiledoni	Iodosulfuron metile Tribenuron metile Tifensulfuron metile (8) Metsulfuron metile Bensulfuron metile Mecoprop-P Tritosulfuron Clopiralid	(6) Dicotiledonicida con azione secondaria su graminacee. Impiegabile al massimo in un intervento per ciclo colturale (7) Non efficace nei confronti di Lolium  (8) Impiegabile come erbicida solo in miscela

		MCPA 2,4-D Aminopiralid (8) Diclorprop-P (8) Haloxyfen-metile Florasulam Fluroxypyr Amidosulfuron	(*) Formulato con antidoto
--	--	--	----------------------------

Le note in **grigio** risultano vincolanti

## HALYOMORPHA HALYS

Nome comune: **Cimice asiatica**

Tipologia di organismo: Insetto pentatomide

[Codice Eppo: HALYHA](#)

### • Descrizione

*Halyomorpha halys* è un insetto originario dell'Asia Orientale (Cina, Giappone, Corea e Taiwan), molto polifago, in grado di attaccare e provocare gravi danni su numerose specie da frutto, orticole ed anche seminativi (oltre 150 piante ospiti segnalate). Gli adulti hanno una colorazione del dorso grigio-marrone marmorizzato, sono lunghi circa 12-17 mm e larghezza dai 7 ai 10 mm. Le uova di forma leggermente allungata (circa 1,3 mm di diametro e 1,6 mm di lunghezza), color grigio fumo, vengono deposte a gruppi di 20-30 (ogni femmina può deporre dalle 200 alle 280 uova). Dopo la schiusura lo sviluppo avviene attraverso 5 forme giovanili (ninfé), di cui la prima si presenta con colori vivaci (neri e arancio rossastri). Normalmente durante il primo stadio le forme giovanili rimangono raggruppate sulla massa delle uova e si allontanano solo dopo che si è verificata la muta al secondo stadio.



Halyomorpha halys (HALYHA) - https://gd.eppo.int

### • Biologia


*Halyomorpha halys* compie fino ad un massimo di 5 cicli in un anno nelle condizioni più favorevoli, ma generalmente compie 1 o 2 generazioni. Gli adulti costituiscono lo stadio svernante e generalmente escono dalla diapausa nei mesi di marzo- aprile. La fine della diapausa è legata al fotoperiodo (ore di luce/giorno) ed alla temperatura; in particolare sembra che il fotoperiodo sia determinante per l'inizio dello sviluppo sessuale. In questa fase vi è quindi il primo spostamento verso le colture, principalmente alberi da frutto. Dopo l'accoppiamento le femmine depongono le uova in gruppi sulla pagina inferiore delle foglie. Lo sviluppo della fase giovanile avviene attraverso 5 stadi con una soglia di temperatura minima pari a 14° C ed una soglia massima di 35° C. Il numero di generazioni dipende dalle condizioni climatiche, nelle nostre zone generalmente compie 2 generazioni ogni anno.



Halyomorpha halys (HALYHA) - https://gd.eppo.int

### • Diffusione

*Halyomorpha halys* è una specie originaria dell'Asia Orientale, solo di recente si è diffusa negli Stati Uniti, a partire dai primi anni 2000, causando danni sempre più rilevanti, fino al 2008-2010, quando nella regione medio-atlantica si è avuta una vera e propria esplosione della popolazione di *H. halys*, con danni alle colture e disagi alla popolazione in ambiente domestico a causa degli adulti in diapausa. Negli ultimi anni si è rapidamente diffusa anche in Europa (primo ritrovamento in Svizzera



2021-03-24

(c) EPPO <https://gd.eppo.int>

nel 2004); in Italia è stata segnalata la prima volta in Emilia nel 2012 e si è poi rapidamente diffusa in altre regioni. Nella Regione Marche è presente in tutte le provincie.

- **Sintomi e danni**

I danni sono causati sia dagli adulti sia dalle ninfe: sulla frutta le lesioni alimentari causano delle aree depresse, che diventano sempre più evidenti man mano che il frutto cresce e con il tempo tendono a formare una zona suberificata. Nel caso di attacchi su frutticini appena allegati si può verificare anche il completo aborto. Anche sulle colture orticole si verificano danni simili sui frutti. Molto spesso i danni sono più gravi sui bordi degli appezzamenti delle colture interessate, proprio per effetto del movimento degli adulti al termine del periodo di diapausa.



- **Difesa**

Negli ultimi anni *Halyomorpha Halys* si sta diffondendo rapidamente anche in Italia, imponendosi all'attenzione come uno dei principali parassiti. Questo insetto, oltre a causare danni ingenti alle colture attaccate, è in grado di percorrere in volo grandi distanze e questo ne rende più complesso il controllo. Un sistema fisico per il controllo di *H. halys* consiste nell'utilizzo di reti anti-insetto. Privo di effetti ambientali tale sistema può essere applicato solo su alcune colture da frutto. Il controllo chimico con insetticidi può essere effettuato facendo particolare attenzione al trattamento dei bordi della coltura difesa, cercando di intercettare gli adulti nella fase di spostamento. Nella nostra Regione la presenza del fitofago è ancora modesta, per cui assume grande importanza il monitoraggio degli adulti per mezzo di trappole a feromoni, in modo da effettuare un'attenta valutazione della dinamica della popolazione. Nel corso del 2020 nelle regioni del Nord Italia, in cui il fitofago è più dannoso, sono stati effettuati lanci del parassitoide oofago *Trissolcus japonicus* (Vespa samurai). Nei prossimi anni occorrerà verificare se questo metodo di lotta biologica è in grado di produrre i risultati auspicati nel controllo di *Halyomorpha halys*.

Per ulteriori informazioni consultare il sito:

<https://gd.eppo.int/taxon/HALYHA>

<https://www.cabi.org/isc/datasheet/27377>

## COMUNICAZIONI E APPUNTAMENTI

Con Decreto del Dirigente del Servizio Politiche agroalimentari n°162 del 18 marzo 2021 la Regione Marche ha pubblicato il **disciplinare di difesa integrata delle colture per l'anno 2021**:

[http://www.meteo.marche.it/news/LineeGuidaPI\\_DifesaFito\\_2021.pdf](http://www.meteo.marche.it/news/LineeGuidaPI_DifesaFito_2021.pdf)

**Mercoledì 31 marzo dalle ore 10:30** Con oltre 120 mila ettari seminati nel 2020, il girasole rappresenta una delle principali colture oleaginose del nostro Paese. Marche, Toscana e Umbria sono tra le regioni dove questa coltura è più diffusa e dove, con cadenza biennale, si tiene il convegno nazionale ad essa dedicato. L'evento, che quest'anno si terrà in modalità on line, sarà dedicato a ricercatori, ditte sementiere, commercianti di filiera, industriali, agronomi e studenti e sarà moderato da Giuseppe Mandolino, responsabile della sede di Bologna del Centro. La giornata vedrà la partecipazione di Andrea del Gatto e Ilaria Alberti con un intervento sull'attività di ricerca e sperimentazione condotta a favore di questa coltura dal titolo: **"il girasole: una coltura da valutare e difendere"**. I seminari riguarderanno anche gli scenari economici e di politica nazionale ed estera, oltre che le peculiarità dei vari segmenti della filiera e le possibili iniziative o misure che, se implementate, potrebbero contribuire alla crescita del settore girasole e della sua competitività.

In allegato la locandina dell'evento e due articoli di approfondimento sulle tematiche che verranno trattate durante il convegno.

La partecipazione al convegno è gratuita. Per partecipare è necessario iscriversi al link:

[https://zoom.us/webinar/register/WN\\_JEwul\\_EASkeqvKaLw7pKOQ](https://zoom.us/webinar/register/WN_JEwul_EASkeqvKaLw7pKOQ)

Con Decreto del Direttore n. 61 del 05.03.2021, L'ASSAM indice **n. 3 procedure selettive finalizzate all'assunzione a tempo determinato di n. 4 operai agricoli stagionali** da inquadrare nel livello 3° del CCNL Agricoltura – Operai Agricoli e Florovivaisti e da assegnare al Vivaio “Valmetauro di Sant’Angelo in Vado (PU), al vivaio “Bruciate” di Senigallia (AN), al vivaio “Altotenna” di Amandola (FM) e all’azienda Sperimentale di Jesi (AN).

I relativi bandi e i rispettivi schemi di domanda sono pubblicati sul sito istituzionale dell'ASSAM, nella sezione Amministrazione trasparente alla voce "Selezione del personale" al seguente link:

<http://www.assam.marche.it/chi-e-l-assam1/amministrazione-trasparente/selezione-del-personale>

**La domanda di partecipazione deve pervenire entro le ore 12,00 di venerdì 26.03.2021, a pena di esclusione. L'estratto del presente bando è pubblicato sul B.U.R. n° 19 del 11/03/2021.**

Il termine suddetto è perentorio e pertanto l'ASSAM non prenderà in considerazione le domande che, per qualsiasi ragione, siano pervenute oltre la data indicata.

Per informazioni è possibile rivolgersi alle seguenti email: [disebastiano\\_donata@assam.marche.it](mailto:disebastiano_donata@assam.marche.it) o [desantis\\_giulia@assam.marche.it](mailto:desantis_giulia@assam.marche.it)

**Sondaggio on-line n°1/2021** sul sito web [www.assam.marche.it](http://www.assam.marche.it) "Valutazione, gradimento e conoscenza degli strumenti di comunicazione e informazione dell'ASSAM".

Per migliorare i servizi offerti da questa Amministrazione ti chiediamo, cortesemente, solo 5 minuti del tuo tempo per rispondere ad alcune domande. La tua opinione, per noi, è preziosa e ci permetterà di migliorarci ed offrire servizi sempre più rispondenti alle tue esigenze. Il questionario è in forma anonima per scopi di ricerca, i dati raccolti saranno trattati in modo aggregato nel rispetto delle normative sulla privacy. Il sondaggio avrà durata di 30 giorni e hai tempo fino all'8 aprile 2021. Puoi compilare il questionario direttamente dal seguente link: <https://forms.gle/3gsDp6Pg6Ups1w2u9>

## ANDAMENTO METEOROLOGICO DAL 17/03/2021 AL 23/03/2021

	Agugliano (140 m)	Apilo (270 m)	Arcevia (295 m)	Barbara (196 m)	Camerano (120 m)	Castelplanio (330 m)	Corinaldo (160 m)	Cingoli (362 m)	Jesi (96 m)
T. Media (°C)	<b>6.3 (7)</b>	<b>3.4 (7)</b>	<b>4.5 (7)</b>	<b>5.9 (7)</b>	<b>6.6 (7)</b>	<b>4.6 (7)</b>	-	<b>3.9 (7)</b>	<b>5.8 (7)</b>
T. Max (°C)	<b>16.0 (7)</b>	<b>12.9 (7)</b>	<b>13.4 (7)</b>	<b>16.9 (7)</b>	<b>15.9 (7)</b>	<b>13.4 (7)</b>	-	<b>14.3 (7)</b>	<b>16.1 (7)</b>
T. Min. (°C)	<b>-0.5 (7)</b>	-3.3 (7)	-1.5 (7)	-0.7 (7)	-0.5 (7)	-0.1 (7)	-	-1.4 (7)	-1.7 (7)
Umidità (%)	<b>55.7 (7)</b>	<b>76.1 (7)</b>	<b>64.3 (7)</b>	<b>44.4 (7)</b>	<b>59.1 (7)</b>	<b>56.7 (7)</b>	-	<b>63.8 (7)</b>	<b>68.5 (7)</b>
Prec. (mm)	<b>5.6 (7)</b>	<b>14.6 (7)</b>	<b>6.2 (7)</b>	<b>8.2 (7)</b>	<b>3.4 (7)</b>	<b>9.4 (7)</b>	-	<b>9.0 (7)</b>	<b>11.2 (7)</b>
TT05* (°C)	-	-	-	-	<b>7.6 (7)</b>	-	-	-	<b>7.8 (7)</b>
	Maiolati (350 m)	Moie (183 m)	M. Schiavo (120 m)	Morro d'Alba (116 m)	Osimo (44 m)	S.M. Nuova (217 m)	Sassoferato (409 m)	Senigallia (25 m)	S. de' Conti (87 m)
T. Media (°C)	<b>5.2 (7)</b>	<b>5.5 (7)</b>	<b>5.2 (7)</b>	<b>6.8 (7)</b>	<b>5.2 (7)</b>	<b>5.5 (7)</b>	<b>2.8 (7)</b>	<b>6.1 (7)</b>	<b>4.7 (7)</b>
T. Max (°C)	<b>13.7 (7)</b>	<b>14.9 (7)</b>	<b>13.9 (7)</b>	<b>14.6 (7)</b>	<b>14.0 (7)</b>	<b>13.8 (7)</b>	<b>12.3 (7)</b>	<b>15.2 (7)</b>	<b>14.9 (7)</b>
T. Min. (°C)	<b>0.7 (7)</b>	<b>-0.5 (7)</b>	<b>-0.7 (7)</b>	<b>0.8 (7)</b>	<b>-2.7 (7)</b>	<b>-0.8 (7)</b>	<b>-3.9 (7)</b>	<b>-2.6 (7)</b>	<b>-3.2 (7)</b>
Umidità (%)	<b>58.7 (7)</b>	<b>67.0 (7)</b>	<b>70.1 (7)</b>	<b>62.4 (7)</b>	<b>72.4 (7)</b>	<b>51.4 (7)</b>	<b>56.9 (7)</b>	<b>71.1 (7)</b>	<b>57.9 (7)</b>
Prec. (mm)	<b>7.4 (7)</b>	<b>6.6 (7)</b>	<b>7.2 (7)</b>	<b>3.0 (7)</b>	<b>1.8 (7)</b>	<b>4.8 (7)</b>	<b>5.8 (7)</b>	<b>3.2 (7)</b>	<b>3.0 (7)</b>
TT05* (°C)	<b>7.1 (7)</b>	<b>6.9 (7)</b>	-	-	-	-	-	-	-

\* temperatura terreno a 5 cm

## SITUAZIONE METEOROLOGICA ED EVOLUZIONE

L'anticiclone partito dall'Atlantico è tornato a dominare sul comparto centro-occidentale europeo, Italia compresa, costringendo la massa d'aria fredda orientale a decentrarsi ancora più a est. Sulla nostra penisola quindi splende diffusamente il sole accompagnato da un graduale recupero dei valori termici dai quadranti nord-occidentali. A differenza delle occasioni precedenti, il prossimo nucleo depressionario sganciato dalla depressione artico-siberiana non riuscirà a giungere sull'Italia perché sul suo cammino troverà la barriera anticyclonica che ne impedirà l'ingresso. E così, mentre la figura depressionaria continuerà a roteare tra il Mar Nero e il Mediterraneo orientale, la nostra penisola vivrà giorni di diffuso e prevalente bel tempo. Rovesci e temporali saranno comunque possibili nel pomeriggio di venerdì, sulla dorsale appenninica, innescati dallo scivolamento lungo il Tirreno di un piccolo nucleo instabile. Altri marginali fenomeni potranno manifestarsi al nord tra sabato e domenica per una compressione dell'alta pressione ad opera della rinnovata depressione islandese. Atteso un generale recupero delle temperature anche se, sul basso versante adriatico e settore ionico, si avverrà ancora la vicinanza con la massa d'aria fredda orientale.

## PREVISIONE DEL TEMPO SULLE MARCHE

**giovedì 25** Cielo sereno al mattino; velature in espansione da nord-ovest e addensamenti sull'Appennino nella seconda parte della giornata. Precipitazioni assenti. Venti quasi impercettibili flussi sud-occidentali al mattino; temporanei rinforzi dai quadranti est sud-est nel pomeriggio. Temperature in recupero specie le massime. Altri fenomeni: brinate e gelate mattutine soprattutto sui fondovalle appenninici.

**venerdì 26** Cielo al mattino sereno o poco coperto per la presenza di velature in movimento da ovest; nel pomeriggio, cumuli e stratocumuli in formazione ed estensione dalla fascia appenninica. Precipitazioni sparse, nel pomeriggio sull'area appenninica, anche a carattere di rovescio o temporale. Venti meridionali, deboli con possibili tratti moderati di scirocco sulle coste nel pomeriggio. Temperature in aumento.

**sabato 27** Cielo generale presenza di copertura a quote medie e medio-alte con ulteriori ispessimenti sull'Appennino tra le ore centrali e pomeridiane; dissolvenimenti da nord-ovest nell'ultima parte del giorno.

Precipitazioni ad oggi non se escludono ancora di pomeridiane e fino al carattere di rovescio, sull'entroterra specie appenninico. Venti sud-occidentali sulle zone interne, fino a moderati su quelle appenniniche e settentrionali; meno intensi e con contributi da sud-est sulle coste. Temperature ancora in crescita, più marcata per le minime.

**domenica 28** Cielo poco coperto in genere da nuvolosità alta e poco spessa in mattinata; atteso un aumento della stratificazione sulle zone montuose nel pomeriggio. Precipitazioni possibilità di locali piovaschi e rovesci sull'Appennino nelle ore pomeridiane. Venti a soffiare con debole o moderata intensità dai quadranti sud-orientali nel corso delle ore centrali e pomeridiane. Temperature in lieve rialzo.

**Qui per le previsioni aggiornate quotidianamente:** <http://meteo.regione.marche.it/previsioni.aspx>

Nel sito <http://www.meteo.marche.it/pil/> è attivo un **Servizio di Supporto per l'Applicazione delle Tecniche di Produzione Integrata e Biologica** dove è possibile la consultazione dei Disciplinari di Produzione e di Difesa Integrata suddivisi per schede culturali. Sono inoltre presenti link che consentono di collegarsi alle principali Banche dati per i prodotti ammessi in Agricoltura Biologica.

Il risultato completo dell'intera **attività di monitoraggio** (meteorologico, fenologico e fitopatologico) effettuato dal Servizio Agrometeorologico è consultabile all'indirizzo:

[http://meteo.regione.marche.it/calmonitoraggio/an\\_home.aspx](http://meteo.regione.marche.it/calmonitoraggio/an_home.aspx)

Per la consultazione dei prodotti commerciali disponibili sul mercato contenenti i principi attivi indicati nel presente notiziario è possibile fare riferimento alla banca dati disponibile su **SIAN** (Sistema Informativo Agricolo Nazionale).

[Banca Dati](#)



[Fitofarmaci](#)

[Banca Dati](#)



[Bio](#)

Tutti i principi attivi indicati nel Notiziario sono previsti nelle **Linee Guida per la Produzione Integrata delle Colture, Difesa Fitosanitaria e Controllo delle Infestanti** della Regione Marche - 2020. Ciascuno con le rispettive **limitazioni d'uso** e pertanto il loro utilizzo risulta **conforme con i principi della difesa integrata volontaria**.  
[http://www.meteo.marche.it/news/LineeGuidaPI\\_DifesaFito\\_2021.pdf](http://www.meteo.marche.it/news/LineeGuidaPI_DifesaFito_2021.pdf)

I prodotti contrassegnati con il simbolo (♣) sono ammessi anche in **agricoltura biologica**. Le aziende che applicano soltanto la **difesa integrata obbligatoria**, non sono tenute al rispetto delle limitazioni d'uso dei prodotti fitosanitari previste nelle Linee Guida di cui sopra, per cui possono **utilizzare tutti gli agrofarmaci regolarmente in commercio**, nei **limiti di quanto previsto in etichetta**, applicando comunque i **principi generali di difesa integrata**, di cui all'**allegato III del D.Lgs 150/2012**, e decidendo quali misure di controllo applicare sulla base della conoscenza dei risultati dei monitoraggi e delle informazioni previste al paragrafo A.7.2.3. del PAN (DM 12 febbraio 2014).

**È TEMPO DI AGRICOLTURA**



Unione Europea / Regione Marche  
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020  
FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE - LEADER, INVESTIRE NELLE ZONE RURALI



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE  
ALIMENTARI E FORESTALI  
Bandiera europea



**Notiziario curato dal Centro Agrometeo Locale di Ancona - Per info: Dr. Giovanni Abate 071/808242**

Prossimo notiziario: **mercoledì 31 marzo 2021**