




Centro Agrometeo Locale - Via dell'Industria, 1 – Osimo St. Tel. 071/808242 –+ Fax. 071/85979  
e-mail: calan@regione.marche.it Sito Internet: [www.meteo.marche.it](http://www.meteo.marche.it)

## NOTE AGROMETEOROLOGICHE

Stazione di Santa Maria Nuova - 217 m.s.l.m.



In quest'ultima settimana le condizioni meteo hanno mostrato un tipico volto invernale, con le temperature scese su valori medi normali per questo periodo, gelate frequenti e diffuse, e scarse precipitazioni.

## CEREALI AUTUNNO VERNINI

Come anticipato la scorsa settimana, la **situazione fenologica** risulta **estremamente disomogenea**, con alcuni (pochi) appezzamenti seminati a fine ottobre – inizio novembre in fase di accestimento BBCH 21 – 22, mentre la restante parte seminata nell'ultimo mese, tra prima e terza foglia BBCH 11 - 13.

Qui il [link](#) per i siti di rilevamento delle fasi fenologiche e fitopatologiche.

La maggior parte degli appezzamenti seminati evidenzia uno **sviluppo regolare ed uniforme**, ma si iniziano a notare **alcuni ingiallimenti e disseccamenti degli apici fogliari, del tutto transitori**, probabilmente dovuti ad iniziali carenze di azoto (soprattutto negli appezzamenti in fase più avanzata) ed a gelate ripetute.

### • Concimazione azotata

Nelle indicazioni sottostanti sono evidenziate in giallo gli obblighi previsti dal disciplinare di produzione agronomica approvato dalla Regione Marche con DGR 787 del 28 giugno 2021, che individua standard obbligatori per le aziende che aderiscono ad accordi agroambientali ai sensi del PSR Marche, al marchio Qm, al marchio SQNPI.

In giallo sono evidenziate le parti che costituiscono un obbligo ai sensi del disciplinare di produzione.

Si ritiene quindi utile fornire le indicazioni per la concimazione azotata in copertura da effettuarsi appena sarà possibile in corrispondenza del raggiungimento della fase fenologica di pieno accestimento.

Il nutriente chiave nel periodo di fine inverno-inizio primavera per il frumento è l'azoto: la disponibilità di azoto infatti è fra le variabili che maggiormente influenzano la quantità e la qualità della granella e fondamentale è

la modalità della distribuzione intesa come momento dell'applicazione, quantità utilizzata e tipo di fertilizzante impiegato.

Per l'individuazione della corretta quantità di fertilizzante da distribuire è necessario effettuare il calcolo del bilancio azotato facendo riferimento alle indicazioni riportate sul [Notiziario n. 41 del 27 ottobre 2021](#), e alla tabella riportata a lato, tratta dal *Disciplinare di Tecniche Agronomiche di Produzione Integrata Regione Marche 2021*, che evidenzia le unità di azoto assorbite per produrre un quintale di granella, compresa la paglia e le parti che rimangono in campo.

Per una ottimale gestione dell'azoto è necessario considerare che tutte le forme azotate presenti nel terreno o apportate con la concimazione vengono trasformate in forma nitrica, che è disponibile per le piante ma, non essendo trattenuta dal suolo, è soggetta a dilavamento e quindi può originare perdita di unità fertilizzanti ed inquinamento delle falde. La concimazione deve tenere in particolare conto di questo aspetto ed assecondare quindi gli effettivi asporti del momento di intervento: in termini pratici ne consegue che si dovrebbe frazionare il più possibile gli apporti azotati, compatibilmente con la sostenibilità "agronomica" ed economica.

Per una corretta gestione della nutrizione azotata rivestono importanza fondamentale **l'epoca e la modalità di distribuzione**.

Prima dell'accestimento la coltura necessita di quantità di azoto molto limitate viste le ridotte dimensioni della pianta e lo sviluppo vegetativo rallentato; a partire dalla fase di accestimento la disponibilità di azoto risulta molto più importante, in quanto incide direttamente sul numero di culmi e quindi di spighe, pertanto i fabbisogni tendono ad aumentare. La fase di massimo assorbimento si ha in corrispondenza della levata.

Per mantenere una buona copertura del fabbisogno azotato nel tempo se si riducono il numero dei passaggi, è possibile utilizzare fertilizzanti a lenta cessione, molto meno esposti al rischio di dilavamento e perché rendono disponibile l'azoto in modo progressivo, assecondando i flussi di assorbimento delle colture.

Un'utile indicazione per gestire le quantità di fertilizzante da apportare in accestimento è la valutazione dell'indice **TermoPluviometrico ITP** del periodo ottobre-dicembre che deriva dalla combinazione dei dati di precipitazione e temperatura media.

Si considerano **valori normali quelli compresi tra 25-35**, **valori inferiori a 25** si verificano nel caso di basse precipitazioni e temperature miti e quindi condizioni di buon sviluppo vegetativo, scarso dilavamento e minor volatilizzazione dell'azoto. All'opposto **valori elevati superiori a 40** indicano precipitazioni troppo abbondanti e/o temperature sotto la media per lungo tempo: in queste condizioni il dilavamento dei nutrienti e la denitrificazione sono maggiori.

**Negli areali cerealicoli della provincia di Ancona il valore dell'ITP (calcolato su 2 stazioni della provincia rappresentative dell'areale cerealicolo per i mesi ottobre-dicembre 2021) è risultato pari a 34,4 rispetto ad uno storico (20 anni sulle medesime stazioni) pari a 21,3; ciò sta ad indicare un dilavamento dell'azoto superiore alla media delle nostre zone, ma comunque contenuto in termini assoluti.**

Nel mese di gennaio le precipitazioni cadute sino ad oggi sono inferiori alla media storica, per cui ci si può ragionevolmente attendere che tale valore sia destinato a diminuire.

**Si ribadisce pertanto che in corrispondenza del raggiungimento della fase fenologica di pieno accestimento si consiglia comunque di procedere con la prima concimazione azotata, tenendo comunque conto che il dilavamento dell'azoto è comunque contenuto.**

Al fine di ottimizzare gli obiettivi quanti-qualitativi e limitare le perdite di azoto, si consiglia di frazionare la distribuzione dell'intero fabbisogno in copertura in tre interventi, distribuendolo come segue:

1. in corrispondenza della fase di accestimento circa il 20-30% dell'intero fabbisogno,
2. in corrispondenza della fase di inizio levata un ulteriore 50-60%,
3. completamento dell'apporto azotato nella fase di botticella (quest'ultima distribuzione di azoto risulta particolarmente importante quando l'obiettivo produttivo prevede un elevato tenore proteico).

Nel caso di utilizzo di concimi minerali il quantitativo da distribuire per singola concimazione non deve superare i 100 Kg/ha di azoto (limite valido da *Disciplinare di Tecniche Agronomiche di Produzione Integrata Regione Marche 2021* per le colture erbacee ed orticole)

Nel caso di strategie aziendali che prevedono l'impiego di **concimi a lenta cessione di origine minerale oppure organica**, nella fase di accestimento può essere distribuita l'intera dose.

Coltura (pianta intera)	Unità di Azoto assorbite, Kg per q.le di prodotto
Grano duro	2.94
Grano tenero	2.59
Grano tenero biscottiero	2.30
Grano tenero Frumenti di Forza/Frumenti Panificabili Superiori	2.96
Orzo	2.24
Farro	2.70
Avena	2.12
Segale	2.78

**Si ricorda che nelle zone ZVN la concimazione azotata dei cereali è vietata fino al 31 gennaio. A partire dal 1° febbraio riprenderà la pubblicazione del [Bollettino Nitriti](#) con le indicazioni dei giorni in cui è possibile lo spandimento/distribuzione delle matrici azotate e dei giorni in cui è vietato, fino al completo esaurimento del divieto previsto dalla DGR1282/2019.**

Si ritiene utile fornire alcune indicazioni sulle caratteristiche dei concimi azotati più diffusi al fine di una scelta più appropriata in relazione alle esigenze aziendali:

**Nitrato ammonico:** presenta una % di azoto per quintale di concime di 26/27 oppure di 33/34 è un fertilizzante che presenta sia una parte di azoto in forma nitrica prontamente assimilabile sia una frazione di azoto ammoniacale che è meno soggetto a lisciviazione ed ha necessità di alcuni giorni per essere trasformato in azoto nitrico, questo tipo di concime risulta particolarmente adatto nella concimazione della coltura in fase di accestimento.

**Solfato ammonico:** titolo di azoto 20/21%, la forma ammoniacale dell'azoto e l'azione dello zolfo rendono l'elemento lentamente disponibile, con basse temperature risulta ulteriormente rallentata la trasformazione in azoto nitrico, consigliato su una coltura in buono stato vegetativo.

**Urea:** 46 % di azoto, concime con una forma azotata non prontamente assimilabile, necessita di un processo di nitrificazione che avviene con temperature sopra i 5°C, in considerazione dell'elevato titolo di azoto ha un costo per unità solitamente più basso rispetto gli altri fertilizzanti azotati.

**Concimi a lento rilascio** (ricoperti e/o pellicolati): varie % di azoto, questi concimi hanno membrane o pellicole che avvolgono l'azoto, la lenta degradazione dell'elemento di protezione fa sì che anche l'azoto risulti lentamente disponibile, sono indicati per colture in buono stato vegetativo e quando il piano di concimazione non consente di intervenire in maniera tempestiva e con l'opportuno frazionamento del concime azotato.

**Concimi con inibitori** (DMPP, NBPT, N-GUARD, ecc.): varie % di azoto, questi concimi possono avere inibitori della nitrificazione nel suo complesso (DMPP), oppure inibire la trasformazione di urea in ammoniaca (NBPT), o inibire la trasformazione di ammoniaca in nitriti (N-GUARD), non presentano particolare resistenza al dilavamento, andrebbero usati preferibilmente nelle concimazioni più tardive, a fine accestimento-inizio levata.

**Concimi liquidi:** varie % di azoto, sono fertilizzanti che solitamente vengono spruzzati sulla coltura e vengono assorbiti per via fogliare, spesso impiegati in miscela con il trattamento fungicida, con questi fertilizzanti occorre fare attenzione alla concentrazione, se troppo elevata può risultare fitotossica e alla compatibilità con eventuali altri prodotti impiegati in miscela.

### Aziende a conduzione biologica

Nelle aziende a conduzione biologica la concimazione azotata di copertura viene effettuata per completare e/o integrare la dotazione del terreno o la frazione organica apportata in presemina, solitamente la quantità distribuita in copertura è piuttosto limitata e va effettuata interamente non oltre l'accestimento con concimi ammessi in agricoltura biologica e con tipologie a medio-rapido rilascio dell'elemento azotato. **La concimazione dovrà essere effettuata tenendo conto che la scelta del fertilizzante deve avvenire nell'ambito dei concimi organici specificatamente autorizzati per l'agricoltura biologica**, facilmente riconoscibili in quanto debbono riportare sulla confezione la dicitura "**consentito in agricoltura biologica**".

La tabella sotto riportata fornisce delle indicazioni di massima sulla velocità di rilascio dell'azoto, in funzione della matrice di provenienza del concime organico.

CONCIMI ORGANICI AD ELEVATA VELOCITA' DI MINERALIZZAZIONE
<b>Borlanda - Guano - Farina di pesce - Letame - Pollina - Sangue essiccato</b>
CONCIMI ORGANICI A MEDIA VELOCITA' DI MINERALIZZAZIONE
<b>Panelli - Farina di carne - Cuoio terrefatto</b>
CONCIMI ORGANICI A LENTA VELOCITA' DI MINERALIZZAZIONE
<b>Cascami di lana - Cuoiattoli - Farina d'ossa - Pellicino</b>
CONCIMI ORGANICI A LENTISSIMA VELOCITA' DI MINERALIZZAZIONE
<b>Cornunghia - Pennone</b>

- **Limiti e divieti in zone ZVN**

Per quanto riguarda l'aspetto normativo è importante sottolineare che in materia di effluenti zootecnici, acque reflue e digestato il quadro regionale è il seguente:

- nelle Zone Ordinarie risulta attualmente in vigore il DM 5076 del 25/02/2016
- nelle Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN) è in vigore la DGR 1282 del 22 ottobre 2019, il nuovo programma di azione, che abroga il precedente 1448/2007

**Le aziende che ricadono all'interno delle zone ZVN sono obbligate al rispetto dei seguenti limiti massimi di concimazione:**

- **rispetto del limite massimo standard di apporto di azoto efficiente per ogni coltura calcolato, come riportato nella tabella a fianco (espressi in kg di azoto per ettaro), sulla base di quanto previsto all'allegato X del DM 5046 del 25/02/2016. Tale apporto massimo può essere superato qualora l'azienda giustifichi, sulla base di opportuna documentazione, che il livello produttivo raggiunto negli ultimi 3 anni supera quello della resa di riferimento tabellare.**

- **rispetto del limite di 170 Kg di azoto per ettaro e per anno, inteso come media aziendale, derivante da soli effluenti di allevamento.**

Per tali aziende vi è l'obbligo dell'annotazione delle fertilizzazioni effettuate all'interno del **"Registro dei trattamenti e fertilizzanti"**.

**Ricordiamo inoltre che in conformità con quanto stabilito dal Programma d'Azione della Regione Marche le aziende con allevamento che ricadono all'interno delle ZVN sono tenute al rispetto degli obblighi in materia di stoccaggio degli effluenti zootecnici e dei massimali di distribuzione previsti nel Piano di Utilizzazione Agronomico aziendale.**

Alla luce di quanto sopra, in funzione del combinato disposto di quanto previsto nel DM 5046 del 25.02.2016 e nella DGR 1282/2019, le aziende che utilizzano effluenti zootecnici sono obbligate al rispetto dei seguenti obblighi:

<b>Criteri generali, validi tutte le zone agricole classificate <u>VULNERABILI DA NITRATI (ZVN)</u></b>
---

<b>Divieti di utilizzazione dei letami e dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75:</b>
---

- sulle superfici non interessate dall'attività agricola;
- nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
- sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la somersione;
- in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto volti a prevenire il contagio di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.
- entro 5 m. di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali non significativi;
- entro 10 m. di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali significativi;
- entro 25 m. di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, marino-costiere e di transizione, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;
- nel periodo temporale compreso fra il 15 dicembre - 15 gennaio per il solo letame bovino, ovi caprino ed equino, quando utilizzato su pascoli e prati permanenti o avvicendati ed in presemina di colture orticole;
- nel periodo temporale compreso fra il 1 dicembre ed il 15 gennaio in pianura irrigua in presenza di colture ortofloricole e vivaistiche (protette o in pieno campo)
- per un periodo di 90 giorni di cui 62 fissi a partire dal 1 dicembre al 31 gennaio ed i 28 rimanenti nei mesi di novembre e febbraio, determinati sulla base delle indicazioni riportate nel Notiziario Agrometeorologico – Bollettino Nitrati, ad eccezione del letame bovino, ovi caprino ed equino, quando utilizzato su pascoli e prati permanenti o avvicendati ed in presemina di colture orticole (**vedi sopra**) e dell'ammendante compostato verde e dell'ammendante compostato misto con tenore di azoto inferiore a 2,5% sul secco (di cui non più del 20% in forma ammoniacale)
- nel periodo dal 1 novembre al 28 febbraio per le deiezioni degli avicunicoli essicate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiore al 65%

<b>Divieto di utilizzazione agronomica dei liquami e dei materiali ad essi assimilati:</b>
--

- sulle superfici non interessate dall'attività agricola;
- nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;

- sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
- in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto volti a prevenire il contagio di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici;
- in prossimità di strade e di centri abitati, a meno che i liquami siano distribuiti con tecniche atte a limitare l'emissione di odori sgradevoli o vengano immediatamente interrati;
- nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
- in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
- dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;
- su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;
- nelle aree carsiche non soggette a coltivazione;
- entro 10 m. di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- entro 30 m. di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, marino-costiere e di transizione, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;
- su terreni con pendenza media superiore al 10%, che può essere incrementata fino al 20% massimo in presenza di adeguate sistemazioni idrauliche-agrarie e con l'applicazione delle migliori tecniche di spandimento volte ad evitare ruscellamento ed erosione
- sui terreni con falda idrica presente ad una profondità inferiore a 1,50 metri dal piano di campagna;
- per un periodo di 90 giorni di cui 62 fissi a partire dal 1 dicembre al 31 gennaio ed i 28 rimanenti nei mesi di novembre e febbraio, determinati sulla base delle indicazioni riportate nel Notiziario Agrometeorologico – Bollettino Nitrati quando utilizzati su terreni con prati, ivi compresi i medicai, cereali autunno-vernini, colture ortive, arboree con inerbimento permanente o con residui culturali ed in preparazione dei terreni per la semina primaverile anticipata;
- nel periodo dal 1 novembre al 28 febbraio in tutti i terreni destinati a colture diverse rispetto a quelle indicate al paragrafo precedente

#### **Criteri generali, validi in tutte le zone agricole classificate *NORMALI***

##### **Divieto di utilizzazione del letame:**

- sulle superfici non interessate dall'attività agricola;
- nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
- entro 5 metri di distanza dalle sponde di corsi d'acqua superficiali;
- per le acque marino-costiere e quelle lacuali entro 5 metri di distanza dall'inizio dell'arenile, previo accertamento che non sussistono rischi per la salute o di contaminazione delle acque;
- sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
- in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto volti a prevenire il contagio di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.

##### **Divieto di utilizzazione agronomica dei liquami e dei materiali ad essi assimilati:**

- sulle superfici non interessate dall'attività agricola;
- nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
- sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
- in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto volti a prevenire il contagio di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici;
- su terreni con pendenza media superiore al 10 per cento, che può essere incrementata fino al 20% massimo in presenza di adeguate sistemazioni idrauliche-agrarie e con l'applicazione delle migliori tecniche di spandimento volte ad evitare ruscellamento ed erosione;
- entro 10 metri dalle sponde dei corsi d'acqua;
- per le acque marino-costiere e quelle lacuali entro 10 metri di distanza dall'inizio dell'arenile;
- in prossimità di strade e di centri abitati, a meno che i liquami siano distribuiti con tecniche atte a limitare l'emissione di odori sgradevoli o vengano immediatamente interrati;
- nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
- in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
- dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;

- o su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento.
- o nel periodo temporale compreso fra il 15 dicembre ed il 28 febbraio di ogni anno (in ottemperanza a quanto previsto nelle NTA del Piano di Tutela delle Acque della Regione Marche).

## ANDAMENTO METEOROLOGICO DAL 19/01/2022 AL 25/01/2022

	Agugliano (140 m)	Apilo (270 m)	Arcevia (295 m)	Barbara (196 m)	Camerano (120 m)	Castelplanio (330 m)	Corinaldo (160 m)	Cingoli (362 m)	Jesi (96 m)
T. Media (°C)	<b>4.7 (7)</b>	<b>3.4 (7)</b>	<b>4.7 (7)</b>	<b>5.2 (7)</b>	<b>5.1 (7)</b>	<b>4.7 (7)</b>	-	<b>4.3 (7)</b>	<b>3.2 (7)</b>
T. Max (°C)	<b>12.3 (7)</b>	<b>13.7 (7)</b>	<b>12.5 (7)</b>	<b>13.7 (7)</b>	<b>15.6 (7)</b>	<b>10.9 (7)</b>	-	<b>12.6 (7)</b>	<b>13.5 (7)</b>
T. Min. (°C)	<b>-0.1 (7)</b>	<b>-4.7 (7)</b>	<b>-1.0 (7)</b>	<b>-1.6 (7)</b>	<b>-0.6 (7)</b>	<b>0.1 (7)</b>	-	<b>-0.9 (7)</b>	<b>-3.5 (7)</b>
Umidità (%)	<b>76.5 (7)</b>	<b>88.3 (7)</b>	<b>64.8 (7)</b>	<b>61.0 (7)</b>	<b>84.2 (7)</b>	<b>68.1 (7)</b>	-	<b>71.0 (7)</b>	<b>80.7 (7)</b>
Prec. (mm)	<b>2.0 (7)</b>	<b>2.8 (7)</b>	<b>1.2 (7)</b>	<b>2.0 (7)</b>	<b>2.2 (7)</b>	<b>0.8 (7)</b>	-	<b>1.6 (7)</b>	<b>2.8 (7)</b>
	Maiolati (350 m)	Moie (183 m)	M. Schiavo (120 m)	Morro d'Alba (116 m)	Osimo (44 m)	S.M. Nuova (217 m)	Sassoferato (409 m)	Senigallia (25 m)	S. de' Conti (87 m)
T. Media (°C)	<b>5.2 (7)</b>	<b>4.3 (7)</b>	<b>3.5 (7)</b>	<b>5.0 (7)</b>	<b>2.6 (7)</b>	<b>4.5 (7)</b>	<b>3.0 (7)</b>	<b>2.5 (5)</b>	<b>2.7 (7)</b>
T. Max (°C)	<b>12.6 (7)</b>	<b>12.9 (7)</b>	<b>11.8 (7)</b>	<b>13.9 (7)</b>	<b>12.4 (7)</b>	<b>11.4 (7)</b>	<b>11.7 (7)</b>	<b>11.9 (5)</b>	<b>12.2 (7)</b>
T. Min. (°C)	<b>0.8 (7)</b>	<b>-1.7 (7)</b>	<b>-1.9 (7)</b>	<b>0.1 (7)</b>	<b>-5.1 (7)</b>	<b>-1.0 (7)</b>	<b>-4.4 (7)</b>	<b>-4.8 (5)</b>	<b>-5.5 (7)</b>
Umidità (%)	<b>71.6 (7)</b>	<b>87.5 (7)</b>	<b>93.3 (7)</b>	<b>83.3 (7)</b>	<b>88.5 (7)</b>	<b>69.8 (7)</b>	<b>66.6 (7)</b>	<b>82.4 (7)</b>	<b>78.5 (7)</b>
Prec. (mm)	<b>1.2 (7)</b>	<b>1.4 (7)</b>	<b>2.2 (7)</b>	<b>1.6 (7)</b>	<b>4.2 (7)</b>	<b>2.4 (7)</b>	<b>1.8 (7)</b>	<b>2.2 (7)</b>	<b>1.6 (7)</b>

## APPUNTAMENTI E COMUNICAZIONI

### Bilancio Fitosanitario Olivo, giovedì 27 gennaio, ore 10

**Giovedì 27 gennaio** si conclude il ciclo dei Bilanci Fitosanitari delle principali colture, i cosiddetti "Giovedì dell'AIPP", tenutisi a partire da settembre, con il Bilancio Fitosanitario dell'olivo. A partire dalle 10 per la prima sessione e dalle 13 per la seconda, ci saranno referenti dei Servizi Fitosanitari Regionali che riporteranno la situazione relativa alle avversità dell'olivo negli ultimi due anni, con relazioni trasversali sulla mosca al Centro-Nord, al Sud e nel bacino del Mediterraneo.

Il Bilancio si potrà seguire al link:

[https://zoom.us/meeting/register/tJYqdO-trz8pGtF2QAQ\\_QJwQJOteRqZe3cdJ](https://zoom.us/meeting/register/tJYqdO-trz8pGtF2QAQ_QJwQJOteRqZe3cdJ)

e sulla pagina Facebook [\(3\) AIPP Associazione Italiana Protezione Piante | Facebook](#)

**Bollettino nitrati:** Sulla base di quanto previsto dalla DGR Marche 1282/2019 "Programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola" e successive modifiche ed integrazioni, fino al 31 gennaio p.v. è in vigore il divieto di distribuzione di fertilizzanti azotati. Si precisa che il rispetto di tale calendario di distribuzione è vincolante soltanto per le aziende che ricadono in Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN) e solo per i seguenti materiali:

- Concimi azotati ed ammendanti organici di cui al Decreto Legislativo 29 aprile 2010 n.75, ad eccezione dell'ammendante compostato verde e dell'ammendante compostato misto con tenore di azoto < 2,5% sul secco (di questo non più del 20% in forma ammoniacale)
- I letami, ad eccezione del letame bovino, ovicaprino e di equidi, quando utilizzato su pascoli e prati permanenti o avvicendati ed in pre-impianto di colture orticole;
- I materiali assimilati al letame;
- Liquami, materiali ad essi assimilati ed acque reflue nei terreni con prati, ivi compresi i medicai, cereali autunno-vernnini, colture ortive, arboree con inerbimento permanente o con residui culturali ed in preparazione dei terreni per la semina primaverile anticipata .

A partire al 1° di febbraio riprenderà la pubblicazione del Notiziario Agrometeorologico - Bollettino Nitrati per la determinazione dei giorni in cui è vietato lo spandimento. Il Bollettino verrà aggiornato con cadenza bisettimanale il lunedì (con indicazioni per i giorni di martedì, mercoledì e giovedì) ed il giovedì (con indicazione per il venerdì, sabato, domenica e lunedì). Il Bollettino potrà essere consultato al link <http://www.meteo.marche.it/nitrati.aspx>

Considerato il successo dei primi 18 anni di Rassegna Nazionale degli oli monovarietali, che ha visto un sempre maggior coinvolgimento di produttori interessati alla caratterizzazione e valorizzazione della biodiversità olivicola nazionale, l'Assam avvia la prima fase della **19° Rassegna Nazionale degli oli monovarietali**. Le valutazioni sensoriali saranno effettuate dal Panel ASSAM – Marche, le analisi chimiche dal Centro Agrochimico Regionale dell'ASSAM. Tutti i dati saranno elaborati statisticamente da IBE-CNR di Bologna, per aggiornare la banca dati del sito [www.olimonovarietali.it](http://www.olimonovarietali.it)

I campioni possono essere inviati al Centro Agrochimico regionale:

- dal 14 al 28 gennaio 2022

Quota di partecipazione: 90 euro pacchetto Rassegna, 120 euro pacchetto qualità.

È prevista, senza costi aggiuntivi, la valutazione della **Shelf life** (stato di conservazione degli oli a quasi un anno dalla produzione) ad opera del Panel ASSAM.

**Modalità di partecipazione e scheda di adesione** possono essere scaricate dal sito [www.assam.marche.it](http://www.assam.marche.it) e [www.olimonovarietali.it](http://www.olimonovarietali.it)

## SITUAZIONE METEOROLOGICA ED EVOLUZIONE

Sebbene visibilmente più schiacciato verso i Pirenei, il disco altopressionario francese sta opponendo una resistenza più che buona al tentativo di affondo della saccatura collocata sul Mare del Nord. In sostanza è riuscito a deviare verso levante le infiltrazioni nordiche potenzialmente destabilizzanti, aiutato in questo dalla frapposizione dello scudo alpino. Pertanto l'Italia continua a godere di una generale stabilità, placidamente supportata dalla scarsità di ventilazione la quale, insieme alla dispersione termica notturna, favorisce nebbie in Val Padana e pianure, e brinate in altura. In ogni caso anche le temperature, specie nei livelli massimi, appaiono in risalita visto che il vortice depressionario orientale ha perso diverse posizioni. Per domani il massimo barico transalpino si sfilaccerà ancora consentendo qualche modesta infiltrazione umido-instabile sul Mar Tirreno, ma roba di poco conto perché per il resto la tranquillità meteo continuerà ad accompagnare lo Stivale fino a giovedì. Nel frattempo però i modelli fisico-matematici pregustano la discesa a ridosso delle Alpi della perturbazione nordica premiando così i suoi precedenti e continui tentativi. E' nella seconda frazione della giornata di venerdì che si concretizzeranno con fenomeni incidenti al centro e poi fino a sabato a sud. Il nord resterà invece protetto dall'ombra orografica costituita dall'alto arco montuoso. Temperature in risalita sino a giovedì, quindi in ribasso e infine in ripresa tra sabato e domenica.

## PREVISIONE DEL TEMPO SULLE MARCHE

**giovedì 27** Cielo parzialmente o a tratti prevalentemente coperto da nuvolosità a quote alte, con aggiunta di quella a quote basse sulle coste e lungo la dorsale appenninica soprattutto nelle ore centro-pomeridiane. Precipitazioni assenti. Venti da deboli a moderati occidentali. Temperature in recupero le minime, stabili le massime. Altri fenomeni foschie mattutine e serali sulla fascia costiera.

**venerdì 28** Cielo in mattinata prevalentemente coperto, concentrazione poi della nuvolosità al centro-sud sino a ritirarsi per lasciare spazio ad assottigliamenti e dissolvimenti da nord per l'ultima frazione della giornata. Precipitazioni possibilità di deboli precipitazioni sparse o isolate sulle province centro-meridionali nelle ore centrali, eventuali nevicate a quote alte, in abbassamento fino ai 1200-1300 metri nel pomeriggio. Venti a divenire moderati da nord-nord-ovest. Temperature senza particolari oscillazioni, semmai in leggero rialzo le minime, in lieve calo le massime. Altri fenomeni foschie mattutine sulla fascia costiera.

**sabato 29** Cielo sereno o poco nuvoloso in genere; possibilità di coprirsi parzialmente e temporaneamente da nord nella fascia oraria centrale. Precipitazioni assenti. Venti tenui dai quadranti occidentali. Temperature in flessione le minime, sostanzialmente stabili le massime. Altri fenomeni brinate e locali gelate mattutine sulla fascia appenninica.

**domenica 30** Cielo al mattino sereno o poco nuvoloso sulla fascia costiero-collinare, un po' più coperto lungo la dorsale appenninica; ulteriori rasserenamenti nel proseguo delle ore. Precipitazioni assenti. Venti ancora deboli dai quadranti occidentali. Temperature in flessione le minime, in recupero le massime. Altri fenomeni brinate e locali gelate mattutine sulla fascia appenninica, foschie mattutine e serali su quella costiera.

**Qui per le previsioni aggiornate quotidianamente:** <http://meteo.regione.marche.it/previsioni.aspx>

Nel sito <http://www.meteo.marche.it/pi/> è attivo un **Servizio di Supporto per l'Applicazione delle Tecniche di Produzione Integrata e Biologica** dove è possibile la consultazione dei Disciplinari di Produzione e di Difesa Integrata suddivisi per schede culturali. Sono inoltre presenti link che consentono di collegarsi alle principali Banche dati per i prodotti ammessi in Agricoltura Biologica.

Il risultato completo dell'intera **attività di monitoraggio** (meteorologico, fenologico e fitopatologico) effettuato dal Servizio Agrometeorologico è consultabile all'indirizzo:

[http://meteo.regione.marche.it/calmonitoraggio/an\\_home.aspx](http://meteo.regione.marche.it/calmonitoraggio/an_home.aspx)

Per la consultazione dei prodotti commerciali disponibili sul mercato contenenti i principi attivi indicati nel presente notiziario è possibile fare riferimento alla banca dati disponibile su **SIAN** (Sistema Informativo Agricolo Nazionale).

[Banca Dati](#)



[Fitofarmaci](#)

[Banca Dati](#)



[Bio](#)

**Tutti i principi attivi indicati nel Notiziario sono previsti nelle Linee Guida per la Produzione Integrata delle Colture, Difesa Fitosanitaria e Controllo delle Infestanti" della Regione Marche - 2021. Ciascuno con le rispettive limitazioni d'uso e pertanto il loro utilizzo risulta conforme con i principi della difesa integrata volontaria.**  
[http://www.meteo.marche.it/news/LineeGuidaPI\\_DifesaFito\\_2021.pdf](http://www.meteo.marche.it/news/LineeGuidaPI_DifesaFito_2021.pdf)

I prodotti contrassegnati con il simbolo (♣) sono ammessi anche in **agricoltura biologica**. Le aziende che applicano soltanto la **difesa integrata obbligatoria**, non sono tenute al rispetto delle limitazioni d'uso dei prodotti fitosanitari previste nelle Linee Guida di cui sopra, per cui possono **utilizzare tutti gli agrofarmaci regolarmente in commercio**, nei **limiti di quanto previsto in etichetta**, applicando comunque **i principi generali di difesa integrata**, di cui all'**allegato III del D.Lgs 150/2012**, e decidendo quali misure di controllo applicare sulla base della conoscenza dei risultati dei monitoraggi e delle informazioni previste al paragrafo A.7.2.3. del PAN (DM 12 febbraio 2014).



Unione Europea / Regione Marche  
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020  
FONDI EUROPEI PER L'AGRICOLTURA E L'AGROINDUSTRIA INVESTITI NELLE ZONE RURALI



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE  
ALIMENTARI E FORESTALI  
REPUBBLICA ITALIANA



**Notiziario curato dal Centro Agrometeo Locale di Ancona - Per info: Dr. Giovanni Abate 071/808242**

Prossimo notiziario: **mercoledì 2 febbraio 2022**