

# Notiziario AGROMETEOROLOGICO


di PRODUZIONE INTEGRATA per la provincia di Ancona

Centro Agrometeo Locale - Via dell'Industria, 1 – Osimo St. Tel. 071/808242 –+ Fax. 071/85979  
e-mail: [calan@regione.marche.it](mailto:calan@regione.marche.it) Sito Internet: [www.meteo.marche.it](http://www.meteo.marche.it)

22 febbraio 2023

**07**

## NOTE AGROMETEOROLOGICHE



Ultimo aggiornamento (2023-02-20): +27.0 mm (+14.7 %) rispetto alla media

**Linea blu:** precipitazione giornaliera cumulata anno attuale (mm). **Linea grigia:** precipitazione giornaliera cumulata di riferimento 1981-2010 (mm). Le bande blu indicano **periodi più piovosi** con cumuli di precipitazione superiori alla media 1981-2010. Allo stesso modo, le bande rosse indicano **periodi più secchi** con precipitazioni al di sotto della norma.

Come si evince facilmente del grafico sopra riportato riguardante il cumulo precipitativo dall'inizio dell'inverno (1 dicembre), nonostante quest'ultimo mese molto avaro di precipitazioni, ci troviamo ancora al di sopra delle medie storiche.

## GIRASOLE

### • Scelta varietale 2023

Per cercare di facilitare il compito degli agricoltori, alle prese con la sempre più difficile situazione economica che pone, come condizione imprescindibile per il successo nella propria attività, la necessità assoluta di non commettere errori nella coltivazione dell'oleaginosa, dal 2000 l'ASSOEMENTI - Sezione Colture Industriali finanzia, nell'ambito del Progetto "Qualità girasole", una rete di prove di valutazione di ibridi commerciali, ponendo a confronto novità varietali con costituzioni già affermate e collaudate, per sfruttare al meglio le loro caratteristiche in funzione dell'ambiente.

La rete di prove allestita nel 2022 in sei località fra le più importanti regioni elianticolle italiane ha permesso di raccogliere informazioni e accertamenti utili per una valutazione di tipo globale di una gamma di varietà di girasole proposte per il mercato italiano in grado di supportare gli agricoltori che devono orientarsi per scegliere quella più adatta al loro areale di coltivazione. L'informazione risulta indispensabile, considerato che il margine economico nella coltivazione del girasole è sempre più ristretto e l'agricoltore non può permettersi errori nella scelta della varietà più idonea per il proprio areale di coltivazione.

La sperimentazione del 2022 ha previsto la valutazione di tredici ibridi, dei quali undici ad alto contenuto di acido oleico, proposti da tre ditte sementiere (Mas Seeds, Lidea e KWS): sette di essi al primo anno di valutazione, tre al secondo, uno al terzo e due in prova da più anni; questi sono stati posti a confronto con tre ibridi commerciali, uno convenzionale (Testimone 1, fornito dalla ditta Syngenta), due di tipologia alto

oleica (Testimone 2, Syngenta e Testimone 3, fornito dalla Pioneer), scelti fra i più produttivi presenti sul mercato.

La sperimentazione, coordinata dall'Azienda sperimentale del CREA-Cerealicoltura e Colture industriali di Osimo, ha coinvolto cinque unità operative (Tabella 1) in sei località appartenenti a cinque regioni italiane (Marche, Toscana, Umbria, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia), rappresentative di tipici ambienti elianticolici dove si concentra la quasi totalità della produzione nazionale.

Certamente l'annata 2022 è risultata particolarmente anomala ed ha evidenziato una spiccata variabilità di comportamento fra località, tanto che difficilmente si è potuta riscontrare una univocità di comportamento degli ibridi fra località e ridotto è stato il numero di quelli che si sono presentati più frequentemente al vertice nelle graduatorie di merito dei vari ambienti.

Comunque, pur denotando una spiccata variabilità di comportamento fra località, un discreto numero di ibridi ha riportato risultati apprezzabili.

L'esperienza del 2022 ha evidenziato fra le migliori costituzioni alcune in sperimentazione ormai da diversi anni, come MAS 98K e MAS830OL ed altre di introduzione più recente, come DELICIO HO CL e MAS910OL, al secondo anno di prova, oltre a MAS908HOCP, di nuova introduzione, per il quale sono necessarie e dovere conferme in successive sperimentazioni.

Caratteristiche produttive degli ibridi nella media delle località di prova.

Varietà	Produzione acheni 9%	Olio s.s.:	
		contenuto	produzione
	t ha <sup>-1</sup>	%	t ha <sup>-1</sup>

<b>Testimone 2</b>	3,56 a	47,0 bc	1,53 a
MAS 910OL <sup>2</sup>	3,47 ab	44,7 g	1,42 b
<b>MAS 98K</b>	3,42 ac	44,9 fg	1,40 bc
<b>Testimone 1</b>	3,36 bd	45,3 eg	1,39 bd
<b>MAS 908HOCP<sup>1</sup></b>	3,32 be	46,0 cf	1,39 bd
<b>MAS 830.OL<sup>3</sup></b>	3,24 cf	45,9 df	1,35 bd
<b>DELICIO HO CL<sup>2</sup></b>	3,22 cg	45,4 eg	1,33 bd
<b>MAS 86.OL</b>	3,19 dg	45,4 eg	1,32 bd
<b>BILOBA CLP</b>	3,18 dh	47,5 b	1,37 bd
<b>Testimone 3</b>	3,15 eh	44,8 g	1,29 de
<b>ES AROMATIC HO SU<sup>1</sup></b>	3,12 eh	46,2 ce	1,31 cd
<b>ARGENTIC HOSU<sup>1</sup></b>	3,11 eh	48,8 a	1,38 bd
<b>EMERIC HOCP<sup>2</sup></b>	3,04 fh	46,7 bd	1,30 ce
<b>ESH20052 CL<sup>1</sup></b>	3,02 gh	43,5 h	1,19 e
<b>ES ARTISTIC HO<sup>1</sup></b>	3,01 gh	48,7 a	1,33 bd
<b>ESH20046 HO<sup>1</sup></b>	2,96 h	44,7 g	1,21 e
<b>Medie</b>	<b>3,21</b>	<b>46,0</b>	<b>1,34</b>
<b>C.V. %</b>	<b>8,69</b>	<b>3,2</b>	<b>9,95</b>

In grassetto gli ibridi alto oleico

In azzurro le varietà testimoni

1: ibridi al primo anno di prova

2: ibridi al secondo anno di prova

3: ibridi al terzo anno di prova

Senza indice: ibridi in prova da più di tre anni

Per ulteriori informazioni: Dr. Andrea Del Gatto CREA-CI Azienda sperimentale di Osimo [andrea.delgatto@crea.gov.it](mailto:andrea.delgatto@crea.gov.it)

## DIFESA DEI FRUTTIFERI

Si riportano di seguito i trattamenti consigliati in pre fioritura.

Si ricorda che per effetto della L.R. 33/12 Art 8 comma 1: "Durante il periodo di fioritura sono vietati i trattamenti con prodotti fitosanitari.

ALBICOCCO - bottoni rossi BBCH 55			
Avversità	Note	Principi attivi*	
		Difesa integrata	Difesa biologica
Monilia	Intervenire solo sulle cultivar non ancora in fioritura. Mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo delle piante attraverso il contenimento della concimazione azotata e dell'irrigazione ed impedire il ristagno idrico nel terreno.	<i>Bacillus subtilis</i> (♣), <i>Bicarbonato di K</i> (♣), <i>Saccharomyces cerevisiae</i> (♣), <i>Cyprodinil</i> , <i>Fludioxonil</i> , <i>Fenexamide</i> ,	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Bicarbonato di K</i> , <i>Saccharomyces cerevisiae</i> .

	<p>Limitare gli interventi in pre-raccolta sulle cultivar ad elevata suscettibilità e in condizioni climatiche favorevoli all'infezione.</p> <p>Contro questa avversità sono consentiti al massimo 3 trattamenti all'anno.</p>	<i>Fenpyrazamine,</i> <i>Penthiopyrad.</i> <i>Isofetamid</i>	
--	--	--	--

#### CILIEGIO - fase fenologica gemme dormienti e rigonfiamento gemme BBCH 00-01

Avversità	Note	Principi attivi*	
		Difesa integrata	Difesa biologica
Monilia	<p>I trattamenti vanno posizionati in pre-fioritura e a caduta petali in funzione dell'andamento climatico caratterizzato da eventuali piogge.</p> <p>In caso di pioggia e/o elevata umidità intervenire anche in prossimità della raccolta. Per il contenimento del patogeno mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo delle piante attraverso il contenimento degli apporti di azoto e di acqua di irrigazione, impedire i ristagni idrici nel terreno.</p> <p>Contro questa avversità sono consentiti al massimo 3 trattamenti all'anno.</p>	<i>Bacillus subtilis</i> (♣), <i>Bicarbonato di K</i> (♣), <i>Cyprodinil</i> , <i>Fenexamide</i> , <i>Fenpyrazamine</i> , <i>Fludioxonil</i> , <i>Isofetamid</i> .	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Bicarbonato di K</i> .

#### SUSINO- fase fenologica rigonfiamento gemme –bottoni bianchi BBCH 01-57

Avversità	Note	Principi attivi*	
		Difesa integrata	Difesa biologica
Monilia	<p>Mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo delle piante attraverso il contenimento della concimazione azotata e dell'irrigazione ed impedire il ristagno idrico nel terreno.</p> <p>Limitare gli interventi in pre-raccolta sulle cultivar ad elevata suscettibilità e in condizioni climatiche favorevoli all'infezione.</p> <p>Contro questa avversità sono consentiti al massimo 3 trattamenti all'anno. ammessi 4 trattamenti su cultivar raccolte dal 15 agosto in poi</p>	<i>Bacillus subtilis</i> (♣), <i>Bicarbonato di K</i> (♣) <i>Saccharomyces cerevisiae</i> (♣), <i>Cyprodinil</i> , <i>Fenexamide</i> , <i>Fenpyrazamine</i> , <i>Fludioxonil</i> .	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Bicarbonato di K</i> <i>Saccharomyces cerevisiae</i>
Tripide	<p>Soglia: presenza sulle varietà sensibili</p> <p><b>Massimo 1 trattamento all'anno contro questa avversità</b></p>	<i>Sali potassici degli acidi grassi</i> (♣), <i>Beauveria Bassiana</i> (♣) <i>Lambdaclorotrina</i> , <i>Acrinatrina</i> .	<i>Sali potassici degli acidi grassi</i> , <i>Beauveria Bassiana</i>
Afide farinoso	<p>Soglia: presenza</p> <p>Intervenire preferibilmente in maniera localizzata sulle piante infestate</p>	<i>Sali potassici degli acidi grassi</i> (♣), <i>Acetamiprid</i> , <i>Flonicamid</i> .	<i>Sali potassici degli acidi grassi</i>
Tentredini	<p>Eseguire il monitoraggio con trappole cromotropiche di colore bianco nel periodo compreso fra pre-fioritura e allegagione. Soglia: 50 catture/trappola.</p> <p><b>Contro questa avversità massimo 1 intervento all'anno.</b></p>	<i>Deltametrina</i>	

**PESCO:- rigonfiamento gemme e bottone rosa BBCH 01-57**

Avversità	Note	Principi attivi*	
		Difesa integrata	Difesa biologica
Monilia	<p>Limitare gli interventi in pre-raccolta sulle cultivar ad elevata suscettibilità e in condizioni climatiche favorevoli all'infezione.</p> <p>Contro questa avversità sono consentiti al massimo 3 trattamenti all'anno- ammessi 4 trattamenti su cultivar raccolte dal 15 agosto in poi.</p> <p>Ridurre le concimazioni azotate, eseguire potature equilibrate, limitare le irrigazioni, raccogliere e distruggere i frutti mummificati ed i rami colpiti.</p>	<i>Bacillus subtilis</i> (♣), <i>Bicarbonato di K</i> (♣) <i>Saccharomyces cerevisiae</i> (♣), <i>Cyprodinil</i> , <i>Fludioxonil</i> , <i>Fenexamide</i> , <i>Fenpyrazamine</i> , <i>Penthiopyrad</i> .	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Bicarbonato di K</i> <i>Saccharomyces cerevisiae</i>
Bolla	<p>Al termine della fioritura, in condizioni di elevata umidità atmosferica e prolungata bagnatura della vegetazione, intervenire per il controllo del patogeno con i principi attivi riportati a fianco.</p>	<i>Rame</i> (1) (♣), <i>Captano</i> , <i>Dodina</i> , <i>Ziram</i>	<i>Rame</i> (1)

(1) Non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo applicato di 4 kg di rame per ettaro all'anno (al raggiungimento di tale limite concorrono anche gli apporti di rame metallo impiegati per la fertilizzazione).

Afide verde, Afide sigaraio, Afide farinoso	<p>Soglia: nella fase di bottone rosa presenza di fondatrici, in post-fioritura 3% di germogli infestati per le nectarine e 10% per pesche e percoche.</p> <p>Per l'Afide farinoso la soglia è la presenza, intervenire preferibilmente in maniera localizzata sulle piante infestate.</p>	<i>Sali potassici degli acidi grassi</i> (♣), <i>Beauveria bassiana</i> (♣) (non ammessa per afide farinoso), <i>Flonicamid</i> (non ammesso contro Afide sigaraio), <i>Acetamiprid</i> , <i>Spirotetramat</i> (non ammesso contro Afide sigaraio), <i>Fluvalinate</i> (solo trattamento prefiorale e non consentito su afide farinoso).	<i>Sali potassici degli acidi grassi</i> , <i>Beauveria bassiana</i> (non ammessa per afide farinoso)
Tripidi	<p>Eseguire i campionamenti su varietà nectarine, maggiormente suscettibili a questi parassiti.</p> <p>Soglia: presenza.</p> <p>Nel periodo primaverile sono ammessi al massimo 2 trattamenti da effettuarsi in concomitanza delle fasi fenologiche di pre e post-fioritura.</p>	<i>Deltametrina</i> , (ammessa solo in prefioritura) <i>Fluvalinate</i> , <i>Etofenprox</i> , <i>Acrinatrina</i> , <i>Spinosad</i> (♣), <i>Sali potassici di acidi grassi</i> (♣), <i>Beauveria bassiana</i> (♣), <i>Formetanate</i> , <i>Spinetoram</i> .	<i>Spinosad</i> , <i>Sali potassici di acidi grassi</i> , <i>Beauveria bassiana</i>

**Acrinatrina:** revocata dal 01/01/2022, è possibile l'utilizzo delle eventuali scorte aziendali fino al 29 giugno 2023.

(1) Non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo applicato di 4 kg di rame per ettaro all'anno (al raggiungimento di tale limite concorrono anche gli apporti di rame metallo impiegati per la fertilizzazione)

**Si raccomanda di verificare attentamente nel disciplinare le note d'uso e le limitazioni dei singoli principi attivi. Si ricorda che in ogni caso dovranno obbligatoriamente essere rispettate le indicazioni riportate nell'etichetta di ciascun formulato impiegato.**

**Con il simbolo (♣) vengono indicati i principi attivi ammessi in agricoltura biologica**

**Le sostanze attive riportate sono quelli presenti nelle: "Linee Guida per la Produzione Integrata delle colture, Difesa Fitosanitaria e Controllo delle Infestanti" della Regione Marche 2022 [http://www.meteo.marche.it/news/LG\\_difesa\\_integrata\\_marche\\_2022.pdf](http://www.meteo.marche.it/news/LG_difesa_integrata_marche_2022.pdf) (Ultima versione approvata).**

Per la consultazione puntuale delle singole schede si rimanda al seguente [link](#).

**E' in fase di redazione la versione per il 2023. Appena approvata verranno pubblicati gli aggiornamenti.**

**Si ricorda che, durante il periodo della fioritura (periodo che va dalla schiusura dei fiori alla caduta dei petali), ai sensi della L.R. 33/12 in materia apistica, sono vietati tutti i trattamenti con prodotti fitosanitari ed erbicidi su vegetazione spontanea, su colture erbacee, arboree e ornamentali.**

L.R. 33/12 Art 8 comma 1: "Durante il periodo di fioritura sono vietati i trattamenti con prodotti fitosanitari ed erbicidi su vegetazione spontanea, su colture erbacee, arboree e ornamentali. I trattamenti fitosanitari sono altresì vietati in presenza di fioritura delle vegetazioni sottostanti le coltivazioni. In tale caso il trattamento può essere eseguito solo se è stata preventivamente effettuata la trincatura o lo sfalcio di tali vegetazioni con asportazione totale delle loro masse, o nel caso in cui i fiori di tali essenze risultano completamente essiccati in modo da non attirare più le api."

## ANDAMENTO METEOROLOGICO DAL 15/02/2023 AL 21/02/2023

	Agugliano (140 m)	Aapiro (270 m)	Arcevia (295 m)	Barbara (196 m)	Camerano (120 m)	Castelplanio (330 m)	Corinaldo (160 m)	Cingoli (362 m)	Jesi (96 m)
T. Media (°C)	<b>10.8 (7)</b>	<b>8.5 (7)</b>	<b>11.1 (7)</b>	<b>11.0 (7)</b>	<b>9.5 (7)</b>	<b>10.7 (7)</b>	-	<b>10.5 (7)</b>	<b>8.4 (7)</b>
T. Max (°C)	<b>20.0 (7)</b>	<b>18.2 (7)</b>	<b>19.0 (7)</b>	<b>20.1 (7)</b>	<b>20.0 (7)</b>	<b>17.8 (7)</b>	-	<b>18.5 (7)</b>	<b>20.6 (7)</b>
T. Min. (°C)	<b>3.7 (7)</b>	<b>-3.0 (7)</b>	<b>5.1 (7)</b>	<b>4.7 (7)</b>	<b>2.6 (7)</b>	<b>5.8 (7)</b>	-	<b>5.0 (7)</b>	<b>-0.6 (7)</b>
Umidità (%)	<b>67.6 (7)</b>	<b>77.2 (7)</b>	<b>52.1 (7)</b>	<b>53.8 (7)</b>	<b>85.9 (7)</b>	<b>58.7 (7)</b>	-	<b>60.5 (7)</b>	<b>73.5 (7)</b>
Prec. (mm)	<b>0.0 (7)</b>	<b>0.2 (7)</b>	<b>0.0 (7)</b>	<b>0.0 (7)</b>	<b>0.0 (7)</b>	<b>0.0 (7)</b>	-	<b>0.2 (7)</b>	<b>0.0 (7)</b>
	Maiolati (350 m)	Moie (183 m)	M. Schiavo (120 m)	Morro d'Alba (116 m)	Osimo (44 m)	S.M. Nuova (217 m)	Sassoferato (409 m)	Senigallia (25 m)	S. de' Conti (87 m)
T. Media (°C)	<b>11.8 (7)</b>	<b>10.6 (7)</b>	<b>9.4 (7)</b>	<b>10.8 (7)</b>	<b>6.8 (7)</b>	<b>10.2 (7)</b>	<b>9.1 (7)</b>	<b>7.9 (7)</b>	<b>9.2 (7)</b>
T. Max (°C)	<b>18.8 (7)</b>	<b>19.5 (7)</b>	<b>16.8 (7)</b>	<b>18.3 (7)</b>	<b>19.5 (7)</b>	<b>18.1 (7)</b>	<b>18.8 (7)</b>	<b>21.3 (7)</b>	<b>18.9 (7)</b>
T. Min. (°C)	<b>6.1 (7)</b>	<b>3.6 (7)</b>	<b>2.0 (7)</b>	<b>5.1 (7)</b>	<b>-3.0 (7)</b>	<b>3.3 (7)</b>	<b>-2.4 (7)</b>	<b>-2.3 (7)</b>	<b>-3.4 (7)</b>
Umidità (%)	<b>57.3 (7)</b>	<b>70.2 (7)</b>	<b>76.1 (7)</b>	<b>63.7 (7)</b>	<b>76.5 (7)</b>	<b>59.3 (7)</b>	<b>58.0 (7)</b>	<b>76.6 (7)</b>	<b>59.3 (7)</b>
Prec. (mm)	<b>0.0 (7)</b>	<b>0.2 (7)</b>	<b>0.0 (7)</b>	<b>0.0 (7)</b>	<b>0.4 (7)</b>	<b>0.2 (7)</b>	<b>0.0 (7)</b>	<b>0.2 (7)</b>	<b>0.0 (7)</b>

## APPUNTAMENTI E COMUNICAZIONI

L'AIOMA Soc. Coop. Agr. in collaborazione con Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, UNIVPM, organizza per i giorni **28 febbraio e 2 marzo 2023** un **Corso Base di Potatura dell'olivo**, con prove pratiche ed esercitazioni in campo.

Il costo del corso è di 150 euro (IVA INCLUSA).

Le lezioni teoriche si svolgeranno c/o **Eco Service di Traini – Via Ancaranese, snc – Ascoli Piceno**. Per informazioni scrivere a: [aioma@aioma.it](mailto:aioma@aioma.it) oppure telefonare al n. 071-2073196.

**N.B.: il corso verrà attivato al raggiungimento di almeno 20 partecipanti**

Le lezioni pratiche in oliveto si svolgeranno in aziende agricole della zona. **DOMANDA DI ADESIONE:** <https://www.aioma.it/media//ADESIONE%20CORSO%20BASE%20POTATURA%20TRAINI%20ECO%20SERVICE%202023.pdf>

**PROGRAMMA:** <https://www.aioma.it/media//PROGRAMMA%20ECO%20SERVICE%202023.pdf>

L'AIOMA Soc. Coop. Agr. con il Patrocinio della Città di Vallefoglia (PU), organizza per i giorni **6-7 Aprile 2023** un **Corso Base di Potatura dell'olivo**, con prove pratiche ed esercitazioni in campo. Il costo del corso è di 150 euro (IVA INCLUSA). Le lezioni teoriche si svolgeranno c/o **Ex Sala Consiglio Comunale Colbordolo**. Le lezioni pratiche in oliveto si svolgeranno in aziende agricole della zona.

**Docenti:** Prof. Franco Famiani Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali – Università degli Studi di Perugia; Dott. Tonino Cioccolanti, (Agronomo – esperto olivicolo); Per informazioni scrivere a: [aioma@aioma.it](mailto:aioma@aioma.it) oppure telefonare al n. 071-2073196.

**N.B.: il corso verrà attivato al raggiungimento di almeno 20 partecipanti**

**DOMANDA DI ADESIONE e PROGRAMMA:** [www.aioma.it](http://www.aioma.it) sezione “iniziativa”

## SITUAZIONE METEOROLOGICA ED EVOLUZIONE

*Le minime variazioni bariche che le mappe bariche ci mostrano rispetto ai giorni scorsi sono riassumibili con un lieve aumento degli impulsi umidi occidentali verso la nostra penisola. A consentirli è il rafforzamento della circolazione ciclonica attiva sulla Spagna, propaggine della saccatura ben più strutturata in discesa dall'Islanda sull'Atlantico e ora in rapido movimento verso il Mare del Nord. Per ora gli effetti saranno visibili essenzialmente con un incremento della nuvolosità in viaggio sopra il Mediterraneo Occidentale e il Tirreno e in espansione dal nostro settore medio-alto di ponente. Grazie a questi flussi miti le temperature si mantengono ben sopra le norme del periodo su gran parte del Vecchio Continente, Polonia e Scandinavia*

escluse, investite queste ultime dalla depressione artico-siberiana. Per domani continuerà la fase preparatoria per un mutamento più radicale atteso per il weekend. Proseguirà l'afflusso di aria temperata e umida richiamata dal vortice spagnolo-marocchino sempre più in salute; al contempo la grande depressione artica inizierà ad approfondirsi sull'Europa Centrale alle medie latitudini. Per sabato andrà a cozzare con la barriera alpina e da qui, scivolando sul lato orientale inaugurerà un fertile connubio di umidità marina mediterranea e impulsi freddi balcanici. Il mix causerà instabilità soprattutto al centro-sud e un forte calo termico soprattutto sul versante adriatico tra domenica e lunedì con la ricomparsa delle nevicate.

## PREVISIONE DEL TEMPO SULLE MARCHE

**giovedì 23** Cielo alla nuvolosità medio-alta del primo mattino seguiranno ampi dissolvenimenti già in mattinata; accorpamenti maggiori anche se temporanei sulle province meridionali nel pomeriggio. Precipitazioni al mattino isolate essenzialmente sul pesarese, nel pomeriggio sempre isolate o al più sparse a sud, comunque di modesta durata, semmai a carattere nevoso sulle cime dei Sibillini. Venti in prevalenza sud-occidentali, fino a moderati sul settore appenninico e settentrionale, deboli altrove. Temperature minime in calo; poche variazioni per le massime. Altri fenomeni: foschie mattutine sulla fascia costiera.

**venerdì 24** Cielo prevalente presenza di altostrati e velature ad alta quota in mattinata; assottigliamenti nel pomeriggio. Precipitazioni assenti. Venti deboli o a tratti moderati provenienti dai quadranti sud. Temperature di nuovo in crescita, specie le massime.

**sabato 25** Cielo al mattino parzialmente o prevalentemente nuvoloso, nella seconda frazione copertura ancor più uniforme. Precipitazioni ad oggi attese a carattere locale, anche intenso, nottetempo e in mattinata sul pesarese e anconetano; su quest'ultima area andranno a contrarsi e scemare prima di scomparire. Venti al più moderati da meridione al mattino; contributi dai quadranti est nel pomeriggio. Temperature minime in rialzo.

**domenica 26** Cielo nuvoloso o molto nuvoloso. Precipitazioni a carattere diffuso e duraturo, intense specialmente fino alle ore centrali; quota neve in abbassamento molto rapido nel corso della giornata addirittura sino ai 200 metri sulle province settentrionali nella seconda parte, più elevate a sud. Venti fino a forti di tramontana (da nord). Temperature in crollo nei valori massimi.

**Qui per le previsioni aggiornate quotidianamente:** <http://meteo.regione.marche.it/previsioni.aspx>

Nel sito <http://www.meteo.marche.it/pi/> è attivo un **Servizio di Supporto per l'Applicazione delle Tecniche di Produzione Integrata e Biologica** dove è possibile la consultazione dei Disciplinari di Produzione e di Difesa Integrata suddivisi per schede colturali. Sono inoltre presenti link che consentono di collegarsi alle principali Banche dati per i prodotti ammessi in Agricoltura Biologica.

Il risultato completo dell'intera **attività di monitoraggio** (meteorologico, fenologico e fitopatologico) effettuato dal Servizio Agrometeorologico è consultabile all'indirizzo:

[http://meteo.regione.marche.it/calmonitoraggio/an\\_home.aspx](http://meteo.regione.marche.it/calmonitoraggio/an_home.aspx)

Per la consultazione dei prodotti commerciali disponibili sul mercato contenenti i principi attivi indicati nel presente notiziario è possibile fare riferimento alla banca dati disponibile su **SIAN** (Sistema Informativo Agricolo Nazionale). **Banca Dati Fitofarmaci** **Banca Dati Bio**



Tutti i principi attivi indicati nel Notiziario sono previsti nelle **Linee Guida per la Produzione Integrata delle Colture, Difesa Fitosanitaria e Controllo delle Infestanti** della Regione Marche - 2022. Ciascuno con le rispettive limitazioni d'uso e pertanto il loro utilizzo risulta **conforme con i principi della difesa integrata volontaria**.

I prodotti contrassegnati con il simbolo (♣) sono ammessi anche in agricoltura biologica. Le aziende che applicano soltanto la **difesa integrata obbligatoria**, non sono tenute al rispetto delle limitazioni d'uso dei prodotti fitosanitari previste nelle Linee Guida di cui sopra, per cui possono **utilizzare tutti gli agrofarmaci regolarmente in commercio**, nei **limiti di quanto previsto in etichetta**, applicando comunque i **principi generali di difesa integrata**, di cui all'**allegato III del D.Lgs 150/2012**, e decidendo quali misure di controllo applicare sulla base della conoscenza dei risultati dei monitoraggi e delle informazioni previste al paragrafo A.7.2.3. del PAN (DM 12 febbraio 2014).



Unione Europea / Regione Marche  
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020  
FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE - LEADER, INVESTI NELLE ZONE RURALI



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE  
ALIMENTARI E FORESTALI  
REPUBBLICA ITALIANA



**Notiziario curato dal Centro Agrometeo Locale di Ancona - Per info: Dr. Giovanni Abate 071/808242**

Prossimo notiziario: **mercoledì 1 marzo 2023**