



Notiziario AGROMETEOROLOGICO Di Produzione Integrata per le province di Ascoli Piceno e Fermo

6


13 Febbraio
2019

Centro Agrometeo Locale Via Indipendenza 2-4, Ascoli Piceno Tel. 0736/336443 Fax. 0736/344240
e-mail:calap@regione.marche.it Sito Internet: <http://meteo.marche.it/assam>

NOTE AGROMETEOROLOGICHE

Inizio settimana perturbato, poi la situazione atmosferica si è stabilizzata con giornate soleggiate ed escursioni termiche tra il giorno e la notte.

Nel seguente link si possono consultare i grafici orari dell'andamento meteo, aggiornati giornalmente:
http://meteo.regione.marche.it/calmonitoraggio/ap_home.aspx



DIFESA DEI FRUTTIFERI

Le condizioni meteorologiche dell'ultimo periodo hanno rallentato la ripresa dello sviluppo vegetativo dei fruttiferi che attualmente si trovano, nella quasi totalità dei casi, fra la fase vegetativa di riposo e quella di inizio ingrossamento gemme **BBCH 00-01**.
Si ritiene pertanto opportuno riportare le indicazioni per i trattamenti preventivi contro alcune patologie funginee e insetti parassiti da effettuarsi nella fase compresa fra ingrossamento gemme e prefioritura per ridurne l'inoculo e limitare gli attacchi in particolare sul fiore.

ALBICOCCO: fase fenologica BBCH 00-01

Avversità	Note	Principi attivi
Corineo	Asportare con le operazioni di potatura sul secco e sul verde i rami infetti o disseccati e razionalizzare le concimazioni azotate. Intervenire nella fase di ingrossamento gemme.	Prodotti rameici (♣)(1), Tiram..
Batteriosi	Intervenire in presenza di infezioni sui rami e danni riscontrati sui frutti nell'annata precedente. Trattare nella fase di ingrossamento gemme.	Prodotti rameici (♣)(1).
Cocciniglie Cocciniglia di S. Josè (<i>C. perniciosa</i>) e C. bianca (<i>P. pentagona</i>)	Soglia: presenza di infestazione sui rami e danni sui frutti nell'annata precedente. Con la potatura rimuovere i rami infestati. Intervenire nella fase di ingrossamento delle gemme e bagnare uniformemente tutte le parti legnose.	Olio minerale paraffinico (♣), Pyriproxyfen (un solo intervento in prefioritura),

CILIEGIO: fase fenologica BBCH 00

Avversità	Note	Principi attivi
Corineo	Eliminare con la potatura i rami infetti o disseccati. Limitare le concimazioni azotate. Intervenire nella fase di ingrossamento gemme.	Prodotti rameici (♣)(1), Tiram o Ziram (ammesso un solo intervento da effettuarsi entro la fase di scamiciatura).
Batteriosi	Soglia: presenza di infezioni sui rami e danni riscontrati sui frutti nell'annata precedente. Trattare nella fase di ingrossamento gemme.	Prodotti rameici (♣)(1)
Cocciniglie Cocciniglia bianca, (<i>P. pentagona</i>), Cocciniglia di San Josè (<i>C. perniciosa</i>) Cocciniglia a virgola (<i>L. ulmi</i>)	Soglia: presenza di infestazione sui rami e danni sui frutti nell'annata precedente. Con la potatura rimuovere i rami infestati. Intervenire nella fase di ingrossamento delle gemme.	Olio minerale paraffinico (♣), Pyriproxyfen o Spirotetramat (non ammessi su cocciniglia a virgola),

Note: (1) ammessi anche in vegetazione per un massimo di 4 interventi all'anno, massimo 6 Kg di s.a. all'anno verificare ma credo che dal 1 febbraio 2019 entra in vigore nuovo regolamento 28 kg in 7 anni

SUSINO: fase fenologica BBCH 00-01

Avversità	Note	Principi attivi
Corineo	Su varietà sensibili (cino-giapponesi) si raccomanda di limitare le concimazioni azotate e di asportare e distruggere con il fuoco i rami infetti o disseccati. Intervenire nella fase di ingrossamento gemme.	Prodotti rameici (♣)(1), Tiram , Ziram (non impiegabile oltre la fase di fine fioritura, da utilizzare in alternativa a Tiram).
Batteriosi Cancro batterico (<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>Pruni</i>)		Prodotti rameici (♣)(1)
Cocciniglia di S. Josè (<i>Comstockaspis perniciosa</i>) Cocciniglia bianca (<i>Diaspis pentagona</i>)	Soglia: presenza diffusa della Cocciniglia bianca sulle branche principali e della Cocciniglia di S. Josè sui frutti dell'annata precedente.	Olio minerale paraffinico (♣), Pyriproxyfen (solo in prefioritura),

PESCO: fase fenologica BBCH 00-01

Avversità	Note	Principi attivi
Bolla del pesco	Intervenire a fine dell'inverno nella fase della rottura delle gemme e successivamente in funzione dell'andamento climatico.	Prodotti rameici (♣)(1), Dodina , Tiram , Ziram (impiegabile fino a fine fioritura).

Corineo	Asportare in fase di potatura i rami infetti e razionalizzare le concimazioni azotate. Gli interventi eseguiti contro la bolla sono solitamente sufficienti per combattere la malattia	Prodotti rameici (♣)(1), Dodina, Tiram, Ziram (impiegabile fino a fine fioritura).
Cocciniglia di S. Josè (C. perniciosa) Cocciniglia bianca (P. pentagona)	Soglia: presenza. Intervenire sulle forme svernanti ed in presenza di forti infestazioni sulle neanidi estive. Con la potatura eliminare i rami infestati. Massimo due interventi all'anno contro questa avversità	Olio minerale paraffinico(♣), Pyriproxyfen ,
Monilia (<i>Monilia laxa</i> , <i>Monilia fructigena</i> , <i>Monilia fructicola</i>)	Ridurre le concimazioni azotate, eseguire potature equilibrate, limitare le irrigazioni, raccogliere e distruggere i frutti mummificati ed i rami colpiti. Intervenire con un trattamento cautelativo nella fase di pre-fioritura e successivamente alla caduta dei petali in condizione di elevata umidità relativa atmosferica. Limitare gli interventi in pre-raccolta sulle cultivar ad elevata suscettibilità e in condizioni climatiche favorevoli all'infezione. Contro questa avversità sono consentiti al massimo 3 trattamenti all'anno- ammessi 4 trattamenti su cultivar raccolte dal 15 agosto in poi	Cyprodinil o Fludioxonil (è ammesso un unico intervento all'anno impiegando la singola s.a. o la miscela delle due principi attivi), Fenexamide, Fenpyrazamine.
Cancri rameali (<i>Fusicoccum amygdali</i> , <i>Cytospora spp.</i>)	Limitare le concimazioni azotate, evitare i ristagni idrici, raccogliere e distruggere i rametti infetti. Intervenire alla caduta delle foglie e ripetere il trattamento nella fase di bottoni rosa BBCH 57.	Prodotti rameici(♣) (1), Tiofanate-metile

Note: (1) ammessi anche in vegetazione per un massimo di 4 interventi all'anno, massimo 6 Kg di s.a. all'anno verificare ma credo che dal 1 febbraio 2019 entra in vigore nuovo regolamento 28 kg in 7 anni

MELO e PERO: fase fenologica BBCH 00		
Avversità	Note	Principi attivi
Cancri e disseccamenti rameali (<i>Nectria galligena</i>)	Intervenire nella fase di ingrossamento gemme.	Prodotti rameici(♣) (1)
Cocciniglia di S. Josè (C. perniciosa)	Soglia: presenza.	Olio minerale paraffinico (♣) (impiegare nella fase di rottura gemme-orecchiette di topo), Pyriproxyfen,

Note: (1) ammessi anche in vegetazione per un massimo di 4 interventi all'anno, massimo 6 Kg di s.a. all'anno verificare ma credo che dal 1 febbraio 2019 entra in vigore nuovo regolamento 28 kg in 7 anni

NUOVI LIMITI PER L'UTILIZZO DEL RAME

Con l'approvazione del [Regolamento CE 2018/1981](#), la Commissione Europea ha sancito che il rame in agricoltura potrà essere impiegato per ulteriori 7 anni, accogliendo la proposta della commissione Paff (plants, animals, food and feed). Sempre in base a quanto stabilito nel Regolamento vengono fissati nuovi limiti di utilizzo del rame, corrispondenti ad un'applicazione non superiore a 28 kg/ha di rame nell'arco di sette anni (corrispondenti, in media, a 4 kg/ha/anno). Con [Comunicato del Ministero della Salute](#) del 31 gennaio 2019, è stato chiarito che il vincolo relativo all'utilizzo del rame è rappresentato dai 28 Kg in 7 anni, mentre i 4 kg/anno sono solo una raccomandazione. E' quindi possibile effettuare la compensazione dei quantitativi annui di rame distribuiti nel corso del settennio. Il Regolamento è applicativo dal 1° febbraio 2019.

CEREALI AUTUNNO-VERNINI

La coltura si trova fra la fase fenologica di 2°- 3° foglie vere e pieno accestimento **BBCH12-23**. Nella quasi totalità degli appezzamenti lo sviluppo vegetativo risulta regolare; si riscontrano soprattutto sui ristoppi, ingiallimenti non dovuti a problematiche fitosanitarie ma a fenomeni fisiologici legati alle condizioni meteorologiche dell'ultimo periodo, caratterizzato da forti venti ed escursioni termiche piuttosto accentuate.

Tutti i principi attivi indicati nel Notiziario sono previsti nelle Linee Guida per la Produzione Integrata delle Colture, Difesa Fitosanitaria e Controllo delle Infestanti della Regione Marche - 2018. ciascuno con le rispettive limitazioni d'uso (per la consultazione completa del documento http://www.meteo.marche.it/news/LineeGuidaPI_DifesaFito_2018.pdf) e pertanto il loro utilizzo risulta conforme con i principi della difesa integrata volontaria

Le aziende che applicano soltanto la difesa integrata obbligatoria, non sono tenute al rispetto delle limitazioni d'uso dei prodotti fitosanitari previste nelle Linee Guida di cui sopra, per cui possono utilizzare tutti gli agrofarmaci regolarmente in commercio, nei limiti di quanto previsto in etichetta, applicando comunque i principi generali di difesa integrata, di cui all'allegato III del D.Lgs 150/2012, e decidendo quali misure di controllo applicare sulla base della conoscenza dei risultati dei monitoraggi e delle informazioni previste al paragrafo A.7.2.3. del PAN (DM 12 febbraio 2014)

Nel sito www.meteo.marche.it è attivo un Servizio di Supporto per l'Applicazione delle Tecniche di Produzione Integrata e Biologica dove è possibile la consultazione dei Disciplinari di Produzione e di Difesa Integrata suddivisi per schede culturali. Sono inoltre presenti link che consentono di collegarsi alle principali Banche dati per i prodotti ammessi in Agricoltura Biologica.

Per la consultazione dei prodotti commerciali disponibili sul mercato contenenti i principi attivi indicati nel presente notiziario è possibile fare riferimento alla banca dati disponibile su SIAN

[Banca Dati Fitofarmaci](#)



[Banca Dati Bio](#)



ANDAMENTO METEOROLOGICO NEL PERIODO DAL 06.02.2019 AL 12.02.2019

	OFFIDA	MONTEDINOVE	CARASSAI	CUPRA MARITTIMA	MONTALTO MARCHE	RIPATRANSONE	CASTIGNANO	SPINETOLI	FERMO
Altit.(m)	215	390	143	260	334	218	415	114	38
T°C Med	8.7	7.8	6.4	8.9	7.2	7.6	8.7	9.1	7.7
T°C Max	16.9	17.6	16.9	16.6	15.2	14.6	16.4	16.0	18.6
T°C Min	3.6	2.3	-0.9	4.9	2.9	2.4	4.1	3.8	0.4
Umid. (%)	67.1	68.0	63.3	60.4	56.9	53.5	59.2	63.9	71.0
Prec.(mm)	0.2	1.2	0.0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.6	0.0
Etp	8.9	9.5	10.1	8.4	7.9	8.4	8.6	9.1	9.8

	MONSAMPOLO DEL TRONTO	MONTEFIORE DELL'ASO	CASTEL DI LAMA	COSSIGNANO	MONTEGIORGIO	MONTEFORTINO	SANT'ELPIDIO A MARE	MONTELPARO	M.RUBBIANO
Altit.(m)	43	58	200	290	208	772	80	258	92
T°C Med	Np	7.7	7.1	7.9	8.0	4.0	9.7	6.5	Np
T°C Max	Np	16.3	14.4	15.7	17.9	12.1	15.8	17.7	Np
T°C Min	Np	0.9	1.8	3.8	2.6	-1.8	4.0	-0.8	Np
Umid. (%)	Np	84.1	66.6	54.9	65.4	66.0	50.8	81.1	Np
Prec.(mm)	Np	0.0	1.0	0.2	1.2	2.4	0.2	0.6	Np
Etp	Np	9.8	8.2	8.5	9.9	7.8	8.8	10.2	Np

SITUAZIONE METEOROLOGICA ED EVOLUZIONE

La possente cupola altopressionaria africano-atlantica ha ormai inglobato, sotto il suo cappello protettivo, il comparto centro-occidentale europeo adagiando il suo massimo sull'Oltralpe. L'azione anticiclonica ha dirottato verso la Libia l'aria fredda artica e continentale che rifocilla ancora la saccatura mediterranea la cui vicinanza con il nostro settore meridionale e adriatico si avverte tramite valori termici mattutini decisamente frizzanti e con una residua instabilità sul versante ionico. Sul resto dell'Italia splende diffusamente il sole. L'Italia manterrà per diversi giorni i benefici garantiti dalla presenza e solidità della campana alto-pressionaria che andrà a radicarsi sull'Europa centrale. Ci attendono dunque giornate soleggiate e stabili specie al centro-nord. Qualche disturbo resterà attivo sul tacco d'Italia e sulle regioni meridionali, le aree più sguarnite di protezione anticiclonica e alpina quindi maggiormente soggette alle incursioni di aria fredda ed instabile dai Balcani particolarmente attive nella giornata di venerdì quando le temperature torneranno a scendere sul medio-basso versante adriatico.

PREVISIONI E TENDENZA DEL TEMPO SULLE MARCHE

Giovedì 14 Cielo sereno o poco nuvoloso, con qualche nuvola in più a sud e nel pomeriggio-sera. Precipitazioni assenti. Venti deboli o moderati settentrionali. Temperature massime in ascesa. Altri fenomeni brinate.

Venerdì 15 Cielo sereno o poco coperto al mattino; aumento di nuvolosità dall'Adriatico nel pomeriggio, più estesa e spessa sul settore appenninico e meridionale. Precipitazioni assenti. Venti moderati settentrionali. Temperature massime in lieve diminuzione. Altri fenomeni brinate.

Sabato 16 Cielo generalmente sereno. Precipitazioni assenti. Venti da deboli a moderati da nord-nord-ovest. Temperature minime in calo, massime in lieve recupero. Altri fenomeni brinate e locali gelate al mattino sull'area appenninica.

Domenica 17 Cielo prevalenti condizioni di sereno. Precipitazioni assenti. Venti generalmente deboli e nord-occidentali. Temperature massime ancora in lieve ascesa. Altri fenomeni brinate appenniniche.

Previsioni elaborate dal C. O. di AgroMeteorologia – ASSAM: www.meteo.marche.it



Notiziario curato dal Centro Agrometeo Locale di Ascoli Piceno

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche vi informiamo che i vostri dati personali comuni sono acquisiti e trattati nell'ambito e per le finalità della fornitura, dietro vostra richiesta, del presente servizio informativo, nonché per tutti gli adempimenti conseguenti. Il titolare del trattamento è: ASSAM - via dell'Industria, 1 Osimo Stazione, a cui potete rivolgervi per esercitare i vostri diritti di legge. L'eventuale revoca del consenso al trattamento comporterà, fra l'altro, la cessazione dell'erogazione del presente servizio.

Per informazioni: **Per. Agr. Dante Ripa 0736/336443-0734/655990**

Prossimo notiziario Mercoledì 20 Febbraio 2019