

Scelta dell'ambiente di coltivazione e vocazionalità	Nessun vincolo specifico fatto salvo quanto previsto nella "Parte generale"																																														
Mantenimento dell'agroecosistema naturale	Nessun vincolo specifico fatto salvo quanto previsto nella "Parte generale"																																														
Scelta varietale e materiale di moltiplicazione	⇒ Le piantine da utilizzare devono essere del tipo frigoconservate di tipo "A" o "A+" (calibro al colletto >14 mm), o, in mancanza di tale materiale, piante cime radicate																																														
Sistemazione e preparazione del suolo	Nessun vincolo specifico fatto salvo quanto previsto nella "Parte generale" ⇒ Non sono ammessi interventi di sterilizzazione chimica del suolo.																																														
Avvicendamento colturale	Si faccia riferimento alla parte generale ⇒ L'intervallo minimo tra due cicli per la coltivazione sullo stesso appezzamento è pari a 2 anni con altre colture non appartenenti alla famiglia delle rosacee ⇒ Non è ammesso coltivare la fragola in successione con una solanacea (patata, pomodoro) per i gravi problemi fitosanitari che può trasmettere (verticillium, phytophthora, ecc.), Si consiglia la coltura in successione a pisello e fagiolino, miglioratrici sia della struttura che della fertilità del terreno.																																														
Semina, trapianto, impianto	Nessun vincolo specifico fatto salvo quanto previsto nella "Parte generale" Si consiglia di effettuare l'impianto a file binate su telo pacciamante. Il periodo d'impianto varia a seconda del materiale utilizzato (piante fresche o frigoconservate). Sesti d'impianto ed epoche di piantagione. <table><tr><th rowspan="2">Tipo di coltura</th><th rowspan="2">Tipo di pianta</th><th rowspan="2">Epoca d'impianto</th><th colspan="2">Distanza (cm) *</th></tr><tr><th>Tra le file</th><th>Sulla fila</th></tr><tr><td>Tunnel</td><td>Frigoconservata</td><td>20/7 - 10/8</td><td>30 - 35</td><td>30 - 35</td></tr><tr><td rowspan="2">Pieno campo</td><td>Frigoconservata</td><td>27/7 - 5/8</td><td>30 - 35</td><td>35 - 40</td></tr><tr><td>Fresche</td><td>20 - 30/8</td><td>30 - 35</td><td>30 - 35</td></tr></table> (*) Le distanze maggiori sono consigliate per i terreni a elevata fertilità.	Tipo di coltura	Tipo di pianta	Epoca d'impianto	Distanza (cm) *		Tra le file	Sulla fila	Tunnel	Frigoconservata	20/7 - 10/8	30 - 35	30 - 35	Pieno campo	Frigoconservata	27/7 - 5/8	30 - 35	35 - 40	Fresche	20 - 30/8	30 - 35	30 - 35																									
Tipo di coltura	Tipo di pianta				Epoca d'impianto	Distanza (cm) *																																									
		Tra le file	Sulla fila																																												
Tunnel	Frigoconservata	20/7 - 10/8	30 - 35	30 - 35																																											
Pieno campo	Frigoconservata	27/7 - 5/8	30 - 35	35 - 40																																											
	Fresche	20 - 30/8	30 - 35	30 - 35																																											
Gestione del suolo e pratiche agronomiche per il controllo delle infestanti	Nessun vincolo specifico fatto salvo quanto previsto nella "Parte generale"																																														
Gestione della pianta e della fruttificazione	Si rimanda a quanto normato dal disciplinare per la produzione integrata delle colture parte difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti																																														
Irrigazione	Si rimanda alle indicazioni contenute nella Parte Generale. ⇒ Non è ammessa l'irrigazione per scorrimento ⇒ si deve rispettare per ciascun intervento irriguo il volume massimo previsto in funzione del tipo di terreno desunto dalla tabella seguente Restituzione idrica giornaliera (litri/metro di manichetta) e numero d'interventi irrigui settimanali <table><tr><th rowspan="2">Fase</th><th rowspan="2">Periodo</th><th colspan="2">cv a sviluppo vegetativo contenuto</th><th colspan="2">cv a sviluppo vegetativo espanso</th></tr><tr><th>Restituzione idrica giornaliera l/m manichetta</th><th>n. interventi irrigui per settimana</th><th>Restituzione idrica giornaliera l/m manichetta</th><th>n. interventi irrigui per settimana</th></tr><tr><td>1</td><td>Fino a 7 gg dopo il risveglio vegetativo</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>2</td><td>Fino ai primi fiori</td><td>2,4</td><td>1</td><td>3,0</td><td>1</td></tr><tr><td>3</td><td>Fino ai primi frutti bianchi</td><td>3,1</td><td>1</td><td>4,1</td><td>1</td></tr><tr><td>4</td><td>Fino alla 1ª raccolta</td><td>3,6</td><td>2</td><td>4,5</td><td>2</td></tr><tr><td>5</td><td>Durante la raccolta in aprile</td><td>3,7</td><td>2</td><td>4,8</td><td>2</td></tr><tr><td>6</td><td>Durante la raccolta in maggio</td><td>6,4</td><td>2</td><td>7,0</td><td>2</td></tr></table> Esempio: tunnel di m 70, 4 pacciamature, m 280 di manichetta. Cv. Idea, fase 3 (4,1 l/m). 280 x 4,1 = 1.148 l di irrigazione 1 volta alla settimana (più l'eventuale volume di riempimento linea).	Fase	Periodo	cv a sviluppo vegetativo contenuto		cv a sviluppo vegetativo espanso		Restituzione idrica giornaliera l/m manichetta	n. interventi irrigui per settimana	Restituzione idrica giornaliera l/m manichetta	n. interventi irrigui per settimana	1	Fino a 7 gg dopo il risveglio vegetativo	0	0	0	0	2	Fino ai primi fiori	2,4	1	3,0	1	3	Fino ai primi frutti bianchi	3,1	1	4,1	1	4	Fino alla 1ª raccolta	3,6	2	4,5	2	5	Durante la raccolta in aprile	3,7	2	4,8	2	6	Durante la raccolta in maggio	6,4	2	7,0	2
Fase	Periodo			cv a sviluppo vegetativo contenuto		cv a sviluppo vegetativo espanso																																									
		Restituzione idrica giornaliera l/m manichetta	n. interventi irrigui per settimana	Restituzione idrica giornaliera l/m manichetta	n. interventi irrigui per settimana																																										
1	Fino a 7 gg dopo il risveglio vegetativo	0	0	0	0																																										
2	Fino ai primi fiori	2,4	1	3,0	1																																										
3	Fino ai primi frutti bianchi	3,1	1	4,1	1																																										
4	Fino alla 1ª raccolta	3,6	2	4,5	2																																										
5	Durante la raccolta in aprile	3,7	2	4,8	2																																										
6	Durante la raccolta in maggio	6,4	2	7,0	2																																										
Fertilizzazione	Si faccia riferimento a quanto indicato nella "Parte generale". ⇒ Per ridurre al minimo le perdite dovute ai fenomeni di lisciviazione, non è ammesso in pre-trapianto un apporto di azoto superiore ai 60 kg/ha. ⇒ In copertura per apporti superiori ai 100 kg/ettaro si devono effettuare almeno due distribuzioni (consigliati interventi fertirrigui)																																														

	⇒ In caso di concimazione fosfatica l'elemento P deve essere fornito frazionato in pre-trapianto, in fertirrigazione estivo autunnale e in fertirrigazione primaverile e solo in caso di scarsa dotazione del terreno ⇒ In caso di concimazione fosfatica l'elemento K deve essere fornito frazionato in pre-trapianto, in fertirrigazione estivo autunnale e in fertirrigazione primaverile e solo in caso di scarsa dotazione del terreno
Uso del marchio SQNPI e/o del marchio QM	Si faccia riferimento a quanto indicato nella "Parte generale".
Raccolta e post - raccolta	Si faccia riferimento a quanto indicato nella "Parte generale". <u>La raccolta per il consumo fresco</u> ⇒ I frutti devono essere staccati con il calice (rosetta) ⇒ La selezione e il confezionamento avvengono direttamente alla raccolta, per evitare successive manipolazioni in magazzino <u>Prodotto per l'industria di trasformazione</u> ⇒ I frutti devono essere privi di calice e peduncolo: nel caso si utilizzino eccedenze di mercato l'asportazione può avvenire direttamente in magazzino manualmente o mediante delle macchine depicciolatrici <u>Trasporto in azienda - centrale di lavorazione</u> ⇒ I frutti devono essere conferiti al centro di lavorazione entro 8 ore dalla raccolta per la prerefrigerazione o lavorazione ⇒ Non è ammessa la sosta al sole dei mezzi caricati

FRAGOLA – CONCIMAZIONE AZOTO

Note decrementi Quantitativo di AZOTO da sottrarre (-) alla dose standard in funzione delle diverse condizioni: (barrare le opzioni adottate)	Apporto di AZOTO standard in situazione normale per una produzione di: 24-36 t/ha: DOSE STANDARD: 120 kg/ha di N;	Note incrementi Quantitativo di AZOTO che potrà essere aggiunto (+) alla dose standard in funzione delle diverse condizioni. Il quantitativo massimo che l'agricoltore potrà aggiungere alla dose standard anche al verificarsi di tutte le situazioni è di: 40 kg/ha: (barrare le opzioni adottate)
☐ 20 kg: se si prevedono produzioni inferiori a 24 t/ha; ☐ 20 kg: in caso di elevata dotazione di sostanza organica; ☐ 15 kg: in caso di successione a leguminose annuale; ☐ 60 kg: nel caso di successione a prati polifiti o a medicai diradati; ☐ 20 kg: in caso di apporto di ammendanti alla precessione.		☐ 20 kg: se si prevedono produzioni superiori a 36 t/ha; ☐ 20 kg: in caso di scarsa dotazione di sostanza organica; ☐ 15 kg: in caso di forte lisciviazione dovuta a surplus pluviometrico in specifici periodi dell'anno (es. pioggia superiore a 300 mm nel periodo dal 1 ottobre al 28 febbraio); ☐ 50 kg: in caso di produzione sia autunnale che primaverile (indipendentemente dal vincolo massimo di 40 Kg/ha).

FRAGOLA – CONCIMAZIONE FOSFORO

Note decrementi Quantitativo di P₂O₅ da sottrarre (-) alla dose standard: (barrare le opzioni adottate)	Apporto di P₂O₅ standard in situazione normale per una produzione di: 24-36 t/ha: DOSE STANDARD	Note incrementi Quantitativo di P₂O₅ che potrà essere aggiunto (+) alla dose standard: (barrare le opzioni adottate)
☐ 20 kg: se si prevedono produzioni inferiori a 24 t/ha.	80 kg/ha: in caso di terreni con dotazione normale; 100 kg/ha: in caso di terreni con dotazione scarsa; 30 kg/ha: in caso di terreni con dotazione elevata.	☐ 20 kg: se si prevedono produzioni superiori a 36 t/ha; ☐ 10 kg: in caso di scarsa dotazione di sostanza organica (linee guida fertilizzazione); ☐ 40 kg: in caso di produzione sia autunnale che primaverile.

FRAGOLA – CONCIMAZIONE POTASSIO

Note decrementi Quantitativo di K₂O da sottrarre (-) alla dose standard: (barrare le opzioni adottate)	Apporto di K₂O standard in situazione normale per una produzione di: 24-36 t/ha: DOSE STANDARD	Note incrementi Quantitativo di K₂O che potrà essere aggiunto (+) alla dose standard: (barrare le opzioni adottate)
☐ 30 kg: se si prevedono produzioni inferiori a 24 t/ha;	130 kg/ha: in caso di terreni con dotazione normale; 200 kg/ha: in caso di terreni con dotazione scarsa; 50 kg/ha: in caso di terreni con dotazione elevata.	☐ 30 kg: se si prevedono produzioni superiori a 36 t/ha; ☐ 80 kg: in caso di produzione sia autunnale che primaverile.