

Scelta dell'ambiente di coltivazione e vocazionalità	Nessun vincolo specifico fatto salvo quanto previsto nella "Parte generale"																																				
Mantenimento dell'agroecosistema naturale	Nessun vincolo specifico fatto salvo quanto previsto nella "Parte generale"																																				
Scelta varietale e materiale di moltiplicazione	Nessun vincolo specifico fatto salvo quanto previsto nella "Parte generale" in particolare per il materiale di propagazione																																				
Sistemazione e preparazione del suolo	Nessun vincolo specifico fatto salvo quanto previsto nella "Parte generale"																																				
Avvicendamento colturale	Il reimpianto è sconsigliato ma ammesso alle condizioni citate nella "Parte generale"																																				
Semina, trapianto, impianto	Nessun vincolo specifico fatto salvo quanto previsto nella "Parte generale"																																				
Gestione del suolo e pratiche agronomiche per il controllo delle infestanti	⇒ Obbligo di inerbimento dell'interfila nel periodo autunno-invernale. Vincoli per le lavorazioni nei terreni in relazione alle pendenze così come indicato nella "Parte generale" ⇒ Negli impianti in produzione ed irrigui non è ammessa la lavorazione dell'interfilare, ad eccezione di interventi straordinari finalizzati alla ricostituzione dell'inerbimento																																				
Gestione della pianta e della fruttificazione	Per l'impiego di fitoregolatori si rimanda a quanto normato dal disciplinare per la produzione integrata delle colture parte difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti																																				
Fertilizzazione	Si rimanda a quanto indicato nella "Parte generale" in particolare per le analisi del terreno, piano di concimazine completo o il ricorso alle schede a dose standard. Il riscontro delle operazioni di concimazione deve essere riportato nel quaderno di campagna come "Registrazione degli interventi". ⇒ In fase di pre-impianto non sono ammesse concimazioni minerali azotate ⇒ In fase di allevamento (1° e 2° anno) sono ammessi apporti azotati solo localizzati con dose massima prevista ridotta rispetto alla fase di produzione (kg/Ha) ⇒ Non sono ammesse distribuzioni di azoto minerale prima della fase fenologica di "bottoni rosa"																																				
Irrigazione	⇒ Non è ammessa l'irrigazione per scorrimento nei nuovi impianti. L'azienda, escluse le situazioni in cui utilizza impianti di micro-portata (a goccia, a spruzzo, con ali gocciolanti o con manichette a bassa portata), deve adottare il metodo base rispettando il volume massimo per ogni intervento irriguo indicato o in alternativa, uno dei metodi di gestione irrigua descritti nella "Parte generale" Evaporazione media giornaliera espressa in millimetri/giorno: è la quantità d'acqua necessaria giornalmente per un ottimale sviluppo della pianta. <table><tr><th>Fase Fenologica</th><th>Evaporazione media giornaliera (*) mm/giorno</th><th>Irrigazione</th></tr><tr><td>Comparsa mazzetti fiorali: inizio fase (0 – 5%)</td><td>2</td><td>non ammessa</td></tr><tr><td>Mazzetti divaricati: fase piena (>50%)</td><td>3</td><td>non ammessa salvo espressa indicazione dei bollettini</td></tr><tr><td>Allegagione: fase piena (>50%)</td><td>5</td><td>ammessa</td></tr><tr><td>Ingrossamento dei frutti: fase piena (>50%)</td><td>6</td><td>ammessa</td></tr><tr><td>Frutti completamente sviluppati: inizio fase (0 -5%)</td><td>5</td><td>ammessa</td></tr><tr><td>Frutti completamente sviluppati: fase piena (>50%)</td><td>4,5</td><td>ammessa</td></tr><tr><td>Frutti maturi: fase piena (>50%)</td><td>3</td><td>ammessa</td></tr></table> * Si intende il quantitativo di acqua da restituire alla coltura in base al suo fabbisogno idrico. In presenza di pioggia, devono essere considerate nulle le piogge inferiori al consumo giornaliero; allo stesso modo sono nulli i mm di pioggia eccedenti il volume di adacquamento prescelto. Es. Fase fenologica "Allegagione": 1. pioggia 3,5 mm < 5,0 mm (la pioggia è considerata nulla); 2. terreno sciolto e pioggia 40 mm > 35 mm (40 - 35 = 5 mm andati perduti). Note generali: - Impianti in allevamento: fino al terzo anno ridurre il consumo del 20%. - Con impianto a goccia è preferibile non superare per ogni intervento i 6 - 7 mm. Volumi di adacquata massimi <table><tr><th>tipo di terreno</th><th>millimetri</th><th>metri cubi ad ettaro</th></tr><tr><td>terreno sciolto</td><td>35</td><td>350</td></tr><tr><td>terreno medio impasto</td><td>45</td><td>450</td></tr><tr><td>terreno argilloso</td><td>55</td><td>550</td></tr></table>	Fase Fenologica	Evaporazione media giornaliera (*) mm/giorno	Irrigazione	Comparsa mazzetti fiorali: inizio fase (0 – 5%)	2	non ammessa	Mazzetti divaricati: fase piena (>50%)	3	non ammessa salvo espressa indicazione dei bollettini	Allegagione: fase piena (>50%)	5	ammessa	Ingrossamento dei frutti: fase piena (>50%)	6	ammessa	Frutti completamente sviluppati: inizio fase (0 -5%)	5	ammessa	Frutti completamente sviluppati: fase piena (>50%)	4,5	ammessa	Frutti maturi: fase piena (>50%)	3	ammessa	tipo di terreno	millimetri	metri cubi ad ettaro	terreno sciolto	35	350	terreno medio impasto	45	450	terreno argilloso	55	550
Fase Fenologica	Evaporazione media giornaliera (*) mm/giorno	Irrigazione																																			
Comparsa mazzetti fiorali: inizio fase (0 – 5%)	2	non ammessa																																			
Mazzetti divaricati: fase piena (>50%)	3	non ammessa salvo espressa indicazione dei bollettini																																			
Allegagione: fase piena (>50%)	5	ammessa																																			
Ingrossamento dei frutti: fase piena (>50%)	6	ammessa																																			
Frutti completamente sviluppati: inizio fase (0 -5%)	5	ammessa																																			
Frutti completamente sviluppati: fase piena (>50%)	4,5	ammessa																																			
Frutti maturi: fase piena (>50%)	3	ammessa																																			
tipo di terreno	millimetri	metri cubi ad ettaro																																			
terreno sciolto	35	350																																			
terreno medio impasto	45	450																																			
terreno argilloso	55	550																																			

**Uso del marchio SQNPI
e/o del marchio QM**

I prodotti devono essere sempre identificati al fine di permetterne la rintracciabilità, in modo da renderli facilmente distinguibili rispetto ad altri ottenuti con modalità produttive diverse

MELO – CONCIMAZIONE AZOTO

Note decrementi		Note incrementi
Quantitativo di AZOTO da sottrarre (-) alla dose standard in funzione delle diverse condizioni: (barrare le opzioni adottate)	Apporto di AZOTO standard in situazione normale per una produzione di: 32-48 t/ha: DOSE STANDARD: 80 kg/ha di N;	Quantitativo di AZOTO che potrà essere aggiunto (+) alla dose standard in funzione delle diverse condizioni. Il quantitativo massimo che l'agricoltore potrà aggiungere alla dose standard anche al verificarsi di tutte le situazioni è di: 60 kg/ha: (barrare le opzioni adottate)
☐ 30 kg: se si prevedono produzioni inferiori a 32 t/ha;		☐ 30 kg: se si prevedono produzioni superiori a 48 t/ha;
☐ 20 kg: in caso di elevata dotazione di sostanza organica (linee guida fertilizzazione);		☐ 20 kg: in caso di scarsa dotazione di sostanza organica (linee guida fertilizzazione);
☐ 20 kg: nel caso di apporto di ammendanti nell'anno precedente;		☐ 20 kg: in caso di scarsa attività vegetativa;
☐ 20 kg: in caso di eccessiva attività vegetativa.		☐ 15 kg: in caso di forte lisciviazione dovuta a surplus pluviometrico in specifici periodi dell'anno (es. pioggia superiore a 300 mm nel periodo dal 1 ottobre al 28 febbraio).
Concimazione Azoto in allevamento		
1° anno: 40 kg/ha; 2° anno: 60 kg/ha (elevabile a 80 kg/ha in caso di inizio produzione)		

MELO – CONCIMAZIONE FOSFORO

Note decrementi		Note incrementi
Quantitativo di P ₂ O ₅ da sottrarre (-) alla dose standard: (barrare le opzioni adottate)	Apporto di P ₂ O ₅ standard in situazione normale per una produzione di: 32-48 t/ha: DOSE STANDARD	Quantitativo di P ₂ O ₅ che potrà essere aggiunto (+) alla dose standard: (barrare le opzioni adottate)
☐ 10 kg: se si prevedono produzioni inferiori a 32 t/ha.	40 kg/ha: in caso di terreni con dotazione normale; 55 kg/ha: in caso di terreni con dotazione scarsa; 35 kg/ha: in situazione di elevata dotazione del terreno.	☐ 10 kg: se si prevedono produzioni superiori a 48 t/ha;
		☐ 10 kg: in caso di scarsa dotazione di sostanza organica (linee guida fertilizzazione);
		☐ 20 kg: in caso di terreni ad elevato tenore di calcare attivo.
Concimazione Fosforo in allevamento: 1° anno: 15 kg/ha; 2° anno: 25 kg/ha (elevabile a 40 kg/ha in caso di inizio produzione);		

MELO – CONCIMAZIONE POTASSIO

Note decrementi		Note incrementi
Quantitativo di K ₂ O da sottrarre (-) alla dose standard: (barrare le opzioni adottate)	Apporto di K ₂ O standard in situazione normale per una produzione di: 32-48 t/ha: DOSE STANDARD	Quantitativo di K ₂ O che potrà essere aggiunto (+) alla dose standard: (barrare le opzioni adottate)
☐ 35 kg: se si prevedono produzioni inferiori a 32 t/ha;	90 kg/ha: in caso di terreni con dotazione normale; 150 kg/ha: in caso di terreni con dotazione scarsa;	☐ 35 kg: se si prevedono produzioni superiori a 48 t/ha.
☐ 30 kg: con apporto di ammendanti nell'anno precedente.	50 kg/ha: in situazione di elevata dotazione del terreno.	
Concimazione Potassio in allevamento: 1° anno: 20 kg/ha; 2° anno: 40 kg/ha (elevabile a 90 kg/ha in caso di inizio produzione).		