

Scelta dell'ambiente di coltivazione e vocazionalità	Nessun vincolo specifico fatto salvo quanto previsto nella "Parte generale"																																										
Mantenimento dell'agroecosistema naturale	Nessun vincolo specifico fatto salvo quanto previsto nella "Parte generale"																																										
Scelta varietale e materiale di moltiplicazione	Nessun vincolo specifico fatto salvo quanto previsto nella "Parte generale" in particolare per il materiale di propagazione																																										
Sistemazione e preparazione del suolo	Nessun vincolo specifico fatto salvo quanto previsto nella "Parte generale"																																										
Avvicendamento colturale	Il reimpianto è sconsigliato ma ammesso alle condizioni citate nella "Parte generale"																																										
Semina, trapianto, impianto	Nessun vincolo specifico fatto salvo quanto previsto nella "Parte generale"																																										
Gestione del suolo e pratiche agronomiche per il controllo delle infestanti	⇒ Obbligo di inerbimento dell'interfila nel periodo autunno-invernale. Vincoli per le lavorazioni nei terreni in relazione alle pendenze così come indicato nella "Parte generale" ⇒ Negli impianti in produzione ed irrigui non è ammessa la lavorazione dell'interfilare, ad eccezione di interventi straordinari finalizzati alla ricostituzione dell'inerbimento																																										
Gestione della pianta e della fruttificazione	Per l'impiego di fitoregolatori si rimanda a quanto normato dal disciplinare per la produzione integrata delle colture parte difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti Potatura: <u>Potatura verde in pre-raccolta:</u> Si consiglia di eseguire alcuni interventi di potatura verde preferibilmente in maggio – giugno per favorire una razionale intercettazione dell'energia radiante in tutta la chioma e una migliore lignificazione dei rami. <u>Potatura verde in post-raccolta:</u> si consiglia di eseguire interventi di potatura (fine luglio–inizio agosto) con taglio di ritorno e di sfoltimento.																																										
Fertilizzazione	Si rimanda a quanto indicato nella "Parte generale" in particolare per le analisi del terreno, piano di concimazine completo o il ricorso alle schede a dose standard. Il riscontro delle operazioni di concimazione deve essere riportato nel quaderno di campagna come "Registrazione degli interventi". ⇒ In fase di pre-impianto non sono ammesse concimazioni minerali azotate ⇒ In fase di allevamento (1° e 2° anno) sono ammessi apporti azotati solo localizzati con dose massima prevista ridotta rispetto alla fase di produzione ⇒ Non sono ammesse distribuzioni di azoto minerale prima della fase fenologica di "inizio fioritura"																																										
Irrigazione	⇒ Non è ammessa l'irrigazione per scorrimento nei nuovi impianti. L'azienda, escluse le situazioni in cui utilizza impianti di micro-portata (a goccia, a spruzzo, con ali gocciolanti o con manichette a bassa portata), deve adottare il metodo base rispettando il volume massimo per ogni intervento irriguo indicato o in alternativa, uno dei metodi di gestione irrigua descritti nella "Parte generale" Evaporazione media giornaliera espressa in millimetri/giorno: è la quantità d'acqua necessaria giornalmente per un ottimale sviluppo della pianta. <table><tr><th>Fase Fenologica</th><th>Evaporazione media giornaliera (*) mm/giorno</th><th>Irrigazione</th></tr><tr><td>Gemme in riposo invernale</td><td>1,5</td><td>non ammessa</td></tr><tr><td>Fioritura: fase piena (>50%)</td><td>3,5</td><td>non ammessa salvo espressa indicazione dei bollettini</td></tr><tr><td>Scamicatura: fase piena (> 50%)</td><td>4,5</td><td>ammessa</td></tr><tr><td>Indurimento del nocciolo: fase piena (> 50%)</td><td>6</td><td>ammessa</td></tr><tr><td>Accrescimento frutti 2° fase: inizio fase (0 - 5%)</td><td>6,5</td><td>ammessa</td></tr><tr><td>Frutti maturi: inizio fase (0 - 5%)</td><td>6</td><td>ammessa</td></tr><tr><td>Frutti maturi: fase piena (>50%)</td><td>4,5</td><td>ammessa</td></tr><tr><td>Caduta foglie: inizio fase (0 - 5%)</td><td>3</td><td>non ammessa</td></tr><tr><td>Caduta foglie: fase piena (> 50%)</td><td>1</td><td>non ammessa</td></tr></table> * Si intende il quantitativo di acqua da restituire alla coltura in base al suo fabbisogno idrico. In presenza di pioggia, devono essere considerate nulle le piogge inferiori al consumo giornaliero; allo stesso modo sono nulli i mm di pioggia eccedenti il volume di adacquamento prescelto. Es. Fase "Accrescimento frutti 2° fase": 1. pioggia 3,5 mm < 6,5 mm (la pioggia è considerata nulla); 2. terreno sciolto e pioggia 40 mm > 35 mm (40 - 35 = 5 mm andati perduti). Note generali: • Impianti in allevamento: fino al terzo anno ridurre il consumo del 20%. • Con impianto a goccia è preferibile non superare per ogni intervento i 6 - 7 mm. Volumi di adacquata massimi <table><tr><th>tipo di terreno</th><th>millimetri</th><th>metri cubi ad ettaro</th></tr><tr><td>terreno sciolto</td><td>35</td><td>350</td></tr><tr><td>terreno medio impasto</td><td>45</td><td>450</td></tr><tr><td>terreno argilloso</td><td>55</td><td>550</td></tr></table>	Fase Fenologica	Evaporazione media giornaliera (*) mm/giorno	Irrigazione	Gemme in riposo invernale	1,5	non ammessa	Fioritura: fase piena (>50%)	3,5	non ammessa salvo espressa indicazione dei bollettini	Scamicatura: fase piena (> 50%)	4,5	ammessa	Indurimento del nocciolo: fase piena (> 50%)	6	ammessa	Accrescimento frutti 2° fase: inizio fase (0 - 5%)	6,5	ammessa	Frutti maturi: inizio fase (0 - 5%)	6	ammessa	Frutti maturi: fase piena (>50%)	4,5	ammessa	Caduta foglie: inizio fase (0 - 5%)	3	non ammessa	Caduta foglie: fase piena (> 50%)	1	non ammessa	tipo di terreno	millimetri	metri cubi ad ettaro	terreno sciolto	35	350	terreno medio impasto	45	450	terreno argilloso	55	550
Fase Fenologica	Evaporazione media giornaliera (*) mm/giorno	Irrigazione																																									
Gemme in riposo invernale	1,5	non ammessa																																									
Fioritura: fase piena (>50%)	3,5	non ammessa salvo espressa indicazione dei bollettini																																									
Scamicatura: fase piena (> 50%)	4,5	ammessa																																									
Indurimento del nocciolo: fase piena (> 50%)	6	ammessa																																									
Accrescimento frutti 2° fase: inizio fase (0 - 5%)	6,5	ammessa																																									
Frutti maturi: inizio fase (0 - 5%)	6	ammessa																																									
Frutti maturi: fase piena (>50%)	4,5	ammessa																																									
Caduta foglie: inizio fase (0 - 5%)	3	non ammessa																																									
Caduta foglie: fase piena (> 50%)	1	non ammessa																																									
tipo di terreno	millimetri	metri cubi ad ettaro																																									
terreno sciolto	35	350																																									
terreno medio impasto	45	450																																									
terreno argilloso	55	550																																									

Uso del marchio SQNPI e/o del marchio QM	I prodotti devono essere sempre identificati al fine di permetterne la rintracciabilità, in modo da renderli facilmente distinguibili rispetto ad altri ottenuti con modalità produttive diverse
---	--

SUSINO – CONCIMAZIONE AZOTO

Note decrementi		Note incrementi
Quantitativo di AZOTO da sottrarre (-) alla dose standard in funzione delle diverse condizioni: (barrare le opzioni adottate)	Apporto di AZOTO standard in situazione normale per una produzione di: 20-30 t/ha : DOSE STANDARD: 90 kg/ha di N;	Quantitativo di AZOTO che potrà essere aggiunto (+) alla dose standard in funzione delle diverse condizioni. Il quantitativo massimo che l'agricoltore potrà aggiungere alla dose standard anche al verificarsi di tutte le situazioni è di: 50 kg/ha : (barrare le opzioni adottate)
☐ 25 kg : se si prevedono produzioni inferiori a 20 t/ha; ☐ 20 kg : in caso di elevata dotazione di sostanza organica; ☐ 20 kg : nel caso di apporto di ammendanti nell'anno precedente; ☐ 20 kg : in caso di eccessiva attività vegetativa.		☐ 25 kg : se si prevedono produzioni superiori a 30 t/ha; ☐ 20 kg : in caso di scarsa dotazione di sostanza organica; ☐ 20 kg : in caso di scarsa attività vegetativa; ☐ 15 kg : in caso di forte lisciviazione dovuta a surplus pluviometrico in specifici periodi dell'anno (es. pioggia superiore a 300 mm nel periodo dal 1 ottobre al 28 febbraio); ☐ 20 kg : in caso di cultivar medio-tardive e tardive.
Concimazione Azoto in allevamento: 1° anno: 40 kg/ha; 2° anno: 60 kg/ha.		

SUSINO – CONCIMAZIONE FOSFORO

Note decrementi		Note incrementi
Quantitativo di P₂O₅ da sottrarre (-) alla dose standard: (barrare le opzioni adottate)	Apporto di P₂O₅ standard in situazione normale per una produzione di: 20-30 t/ha : DOSE STANDARD	Quantitativo di P₂O₅ che potrà essere aggiunto (+) alla dose standard: (barrare le opzioni adottate)
☐ 10 kg : se si prevedono produzioni inferiori a 20 t/ha.	40 kg/ha : in caso di terreni con dotazione normale; 60 kg/ha : in caso di terreni con dotazione scarsa; 20 kg/ha : in situazione di elevata dotazione del terreno.	☐ 10 kg : se si prevedono produzioni superiori a 30 t/ha; ☐ 10 kg : in caso di scarsa dotazione di sostanza organica (linee guida fertilizzazione); ☐ 20 kg : in caso di terreni ad elevato tenore di calcare attivo.
Concimazione Fosforo in allevamento: 1° anno: 15 kg/ha; 2° anno: 25 kg/ha.		

SUSINO – CONCIMAZIONE POTASSIO

Note decrementi		Note incrementi
Quantitativo di K₂O da sottrarre (-) alla dose standard: (barrare le opzioni adottate)	Apporto di K₂O standard in situazione normale per una produzione di: 20-30 t/ha : DOSE STANDARD	Quantitativo di K₂O che potrà essere aggiunto (+) alla dose standard: (barrare le opzioni adottate)
☐ 20 kg : se si prevedono produzioni inferiori a 20 t/ha; ☐ 30 kg : con apporto di ammendanti nell'anno precedente.	100 kg/ha : in caso di terreni con dotazione normale; 150 kg/ha : in caso di terreni con dotazione scarsa; 50 kg/ha : in situazione di elevata dotazione del terreno.	☐ 20 kg : se si prevedono produzioni superiori a 30 t/ha.
Concimazione Potassio in allevamento: 1° anno: 20 kg/ha; 2° anno: 40 kg/ha;		