

Scelta dell'ambiente di coltivazione e vocazionalità	Nessun vincolo specifico fatto salvo quanto previsto nella "Parte generale"
Mantenimento dell'agroecosistema naturale	Nessun vincolo specifico fatto salvo quanto previsto nella "Parte generale"
Scelta varietale e materiale di moltiplicazione	Nessun vincolo specifico fatto salvo quanto previsto nella "Parte generale" in particolare per il materiale di propagazione
Sistemazione e preparazione del suolo	Nessun vincolo specifico fatto salvo quanto previsto nella "Parte generale"
Avvicendamento culturale	Il reimpianto è sconsigliato ma ammesso alle condizioni citate nella "Parte generale"
Semina, trapianto, impianto	Nessun vincolo specifico fatto salvo quanto previsto nella "Parte generale"
Gestione del suolo e pratiche agronomiche per il controllo delle infestanti	⇒ Obbligo di inerbimento dell'interfila nel periodo autunno-invernale. Vincoli per le lavorazioni nei terreni in relazione alle pendenze così come indicato nella "Parte generale"
Gestione della pianta e della fruttificazione	Per l'impiego di fitoregolatori si rimanda a quanto normato dal disciplinare per la produzione integrata delle colture parte difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti
Fertilizzazione	Si rimanda a quanto indicato nella "Parte generale" in particolare per le analisi del terreno, piano di concimazione completo o il ricorso alle schede a dose standard. Il riscontro delle operazioni di concimazione deve essere riportato nel quaderno di campagna come "Registrazione degli interventi". Concimazione di fondo: nei nuovi impianti, la concimazione pre-impianto non dovrà comprendere azoto, salvo l'apporto dato da fertilizzanti organici; per P_2O_5 e K_2O in terreni con dotazioni scarse, normali e nei terreni ricchi in cui l'esubero di detti elementi non è particolarmente consistente, è possibile anticipare parte delle asportazioni future da parte della coltura, senza superare i limiti indicati al paragrafo <i>Concimazione di fondo</i>. Concimazione d'allevamento (1° e 2° anno): sono ammessi solo apporti localizzati di fertilizzanti e le quantità distribuite devono essere ridotte rispetto alla quota ammessa in fase di produzione; i limiti da non superare sono riportati nella Scheda a Dose Standard. Concimazione in fase di produzione: la distribuzione di concimi azotati minerali deve essere frazionata per apporti superiori a 60 kg/ha e non è consentita nel periodo che va dalla fine caduta foglie alla fine di febbraio. Parimenti non è consentita in terreni prossimi alla saturazione idrica.
Irrigazione	⇒ Non è ammessa l'irrigazione per scorrimento L'azienda, escluse le situazioni in cui utilizza impianti di micro-portata (a goccia, a spruzzo, con ali gocciolanti o con manichette a bassa portata), deve adottare il metodo base rispettando il volume massimo per ogni intervento irriguo indicato o in alternativa, uno dei metodi di gestione irrigua descritti nella "Parte generale"
Uso del marchio SQNPI e/o del marchio QM	I prodotti devono essere sempre identificati al fine di permetterne la rintracciabilità, in modo da renderli facilmente distinguibili rispetto ad altri ottenuti con modalità produttive diverse

CONCIMAZIONE AZOTO

Note decrementi		Note incrementi
Quantitativo di AZOTO da sottrarre (-) alla dose standard in funzione delle diverse condizioni: (barrare le opzioni adottate)	Apporto di AZOTO standard in situazione normale per una produzione di: 20-30 t/ha : DOSE STANDARD: 90 kg/ha di N₂	Quantitativo di AZOTO che potrà essere aggiunto (+) alla dose standard in funzione delle diverse condizioni. Il quantitativo massimo che l'agricoltore potrà aggiungere alla dose standard anche al verificarsi di tutte le situazioni è di: 50 kg/ha : (barrare le opzioni adottate)
☐ 40 kg : se si prevedono produzioni inferiori a 20 t/ha; ☐ 20 kg : in caso di elevata dotazione di sostanza organica (linee guida fertilizzazione); ☐ 20 kg : nel caso di apporto di ammendante nell'anno precedente; ☐ 20 kg : in caso di eccessiva attività vegetativa.		☐ 40 kg : se si prevedono produzioni superiori a 30 t/ha; ☐ 20 kg : in caso di scarsa dotazione di sostanza organica (linee guida fertilizzazione); ☐ 20 kg : in caso di scarsa attività vegetativa; ☐ 15 kg : in caso di forte lisciviazione dovuta a surplus pluviometrico in specifici periodi dell'anno (es. pioggia superiore a 300 mm nel periodo ottobre-febbraio); ☐ 20 kg : in presenza di inerbimento permanente.
Concimazione Azoto in allevamento:		
1° anno: 40 kg/ha; 2° anno: 60 kg/ha.		

CONCIMAZIONE FOSFORO

Note decrementi		Note incrementi
Quantitativo di P₂O₅ da sottrarre (-) alla dose standard: (barrare le opzioni adottate)	Apporto di P₂O₅ standard in situazione normale per una produzione di: 20-30 t/ha : DOSE STANDARD	Quantitativo di P₂O₅ che potrà essere aggiunto (+) alla dose standard: (barrare le opzioni adottate)
☐ 10 kg : se si prevedono produzioni inferiori a 20 t/ha; ☐ 10 kg : con apporto di ammendanti.	☐ 80 kg/ha : in caso di terreni con dotazione normale; ☐ 120 kg/ha : in caso di terreni con dotazione scarsa; ☐ 160 kg/ha : in caso di terreni con dotazione scarsissima; ☐ 40 kg/ha : in caso di terreni con dotazione elevata.	☐ 10 kg : se si prevedono produzioni superiori a 30 t/ha; ☐ 10 kg : in caso di scarsa dotazione di sostanza organica (linee guida fertilizzazione); ☐ 20 kg : in caso di terreni ad elevato tenore di calcare attivo.
Concimazione Fosforo in allevamento: 1° anno: 15 kg/ha; 2° anno: 25 kg/ha.		

CONCIMAZIONE POTASSIO

Note decrementi		Note incrementi
Quantitativo di K₂O da sottrarre (-) alla dose standard: (barrare le opzioni adottate)	Apporto di K₂O standard in situazione normale per una produzione di: 20-30 t/ha : DOSE STANDARD	Quantitativo di K₂O che potrà essere aggiunto (+) alla dose standard: (barrare le opzioni adottate)
☐ 35 kg : se si prevedono produzioni inferiori a 20 t/ha; ☐ 30 kg : con apporto di ammendanti.	☐ 130 kg/ha : in caso di terreni con dotazione normale; ☐ 160 kg/ha : in caso di terreni con dotazione scarsa; ☐ 60 kg/ha : in caso di terreni con dotazione elevata.	☐ 35 kg : se si prevedono produzioni superiori a 30 t/ha.
Concimazione Potassio in allevamento: 1° anno: 20 kg/ha; 2° anno: 40 kg/ha.		

Scelta dell'ambiente di coltivazione e vocazionalità	Si rimanda a quanto previsto nella "Parte generale" ⇒ Non sono ammessi nuovi impianti in aree soggette a movimenti franosi in atto o potenziali														
Mantenimento dell'agroecosistema naturale	Nessun vincolo specifico fatto salvo quanto previsto nella "Parte generale"														
Scelta varietale e materiale di moltiplicazione	Si rimanda a quanto previsto nella "Parte generale" ⇒ Per la scelta varietale si deve far riferimento all'elenco delle varietà di vite per la produzione di vino della Regione Marche dove sono evidenziate le varietà idonee alla coltivazione, le varietà di vite in osservazione, quelle cancellate e/o quelle che non hanno superato le prove attitudinali alla coltivazione (consultabili alla sezione decreti del link https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/OCM/OCM-Vitivinicolo#23269_2025)														
Sistemazione e preparazione del suolo	Nessun vincolo specifico fatto salvo quanto previsto nella "Parte generale"														
Avvicendamento colturale	Il reimpianto è sconsigliato ma ammesso alle condizioni citate nella "Parte generale"														
Semina, trapianto, impianto	Nessun vincolo specifico fatto salvo quanto previsto nella "Parte generale"														
Gestione del suolo e pratiche agronomiche per il controllo delle infestanti	⇒ Obbligo di inerbimento dell'interfila nel periodo autunno-invernale. Vincoli per le lavorazioni nei terreni in relazione alle pendenze così come indicato nella "Parte generale"														
Gestione della pianta e della fruttificazione	Per l'impiego di fitoregolatori si rimanda a quanto normato dal disciplinare per la produzione integrata delle colture parte difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti ⇒ Buona parte della viticoltura marchigiana è da considerarsi in eccesso di vigore, per cui occorre scegliere forme di allevamento, portainnesti e densità di impianto capaci di limitare questo fenomeno a favore dell'ottenimento di un equilibrio vegeto produttivo.														
Fertilizzazione	Si rimanda a quanto indicato nella "Parte generale" in particolare per le analisi del terreno, piano di concimazione completo o il ricorso alle schede a dose standard. Il riscontro delle operazioni di concimazione deve essere riportato nel quaderno di campagna come "Registrazione degli interventi". In viticoltura la definizione dei piani di concimazione dovrebbe essere effettuata in base ai fabbisogni nutrizionali della coltura, che variano con l'età e le dimensioni della pianta, con le fasi fenologiche e con la produttività. La stima di tali necessità può essere effettuata ricorrendo a varie metodiche tra loro complementari, che vanno dalla diagnostica fogliare alla restituzione delle asportazioni avvenute per vegetazione e produzione. La somministrazione dei concimi va poi frazionata nel corso dell'anno, secondo le fasi fenologiche e l'andamento climatico. In generale si rimanda alla tabella seguente che evidenzia due direttive di intervento in relazione alle caratteristiche del terreno. <table border="1"> <tr> <th colspan="2">Concimazione di impianto</th></tr> <tr> <th><i>Tipo di terreno</i></th><th><i>Apporto</i></th></tr> <tr> <td>Sciolti</td><td>Sostanza organica</td></tr> <tr> <td>Compatto</td><td>Sostanza organica Fosforo Potassio</td></tr> <tr> <th colspan="2">Concimazione di produzione</th></tr> <tr> <td>Sciolti</td><td>Sostanza organica Azoto Fosforo Potassio</td></tr> <tr> <td>Compatto</td><td>Sostanza organica Azoto Fosforo</td></tr> </table>	Concimazione di impianto		<i>Tipo di terreno</i>	<i>Apporto</i>	Sciolti	Sostanza organica	Compatto	Sostanza organica Fosforo Potassio	Concimazione di produzione		Sciolti	Sostanza organica Azoto Fosforo Potassio	Compatto	Sostanza organica Azoto Fosforo
Concimazione di impianto															
<i>Tipo di terreno</i>	<i>Apporto</i>														
Sciolti	Sostanza organica														
Compatto	Sostanza organica Fosforo Potassio														
Concimazione di produzione															
Sciolti	Sostanza organica Azoto Fosforo Potassio														
Compatto	Sostanza organica Azoto Fosforo														

	Potassio																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	⇒ Non sono ammessi apporti azotati in fase di pre-impianto del vigneto																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Irrigazione	⇒ Non è ammessa l'irrigazione per scorrimento L'azienda, escluse le situazioni in cui utilizza impianti di micro-portata (a goccia, a spruzzo, con ali gocciolanti o con manichette a bassa portata), deve adottare il metodo base rispettando il volume massimo per ogni intervento irriguo indicato o in alternativa, uno dei metodi di gestione irrigua descritti nella "Parte generale" ⇒ Non è ammesso l'uso di impianti per aspersione soprachioma o microirrigui a spruzzo Relativamente alla microirrigazione si fornisce una tabella che riporta il turno irriguo in giorni (restituzione idrica giornaliera espressa in millimetri/giorno ovvero quantità d'acqua necessaria giornalmente per un ottimale sviluppo della pianta) Restituzione idrica giornaliera espressa in millimetri/giorno: è la quantità d'acqua necessaria giornalmente per un ottimale sviluppo della pianta <table><tr><th rowspan="2">Fase fenologica</th><th rowspan="2">Epoca</th><th colspan="2">Restituzione idrica giornaliera (mm)</th><th rowspan="2">Irrigazione</th></tr><tr><th>Inerbito</th><th>Lavorato</th></tr><tr><td>1. Pre-chiusura grappolo</td><td>1ª decade luglio - 1ª decade agosto</td><td>3,8</td><td>2,8</td><td>Ammessa</td></tr><tr><td>2. Inizio invecchiatura</td><td>3ª decade luglio - 2ª decade agosto</td><td>-</td><td>-</td><td>Non ammessa salvo espressa indicazione dei bollettini</td></tr></table> Pioggie: indicativamente sono da considerarsi nulle le piogge inferiori ai 5 mm.; le piogge superiori ai 5 mm vanno divise per il valore della restituzione idrica della fenofase per ottenere il numero di giorni da aggiungere al turno riportato in tabella. Eventi temporaleschi con intensità di pioggia oraria maggiore di 15 mm (lettura al pluviometro/durata del temporale in ore) sono da ritenersi utili al 50%. Volume di irrigazione (mm) <table><tr><th></th><th></th><th colspan="14">A R G I L L A %</th></tr><tr><th></th><th></th><th>10</th><th>15</th><th>20</th><th>25</th><th>30</th><th>35</th><th>40</th><th>45</th><th>50</th><th>55</th><th>60</th><th>65</th><th>70</th><th></th></tr><tr><td rowspan="2">S</td><td>0</td><td>53</td><td>53</td><td>52</td><td>52</td><td>51</td><td>51</td><td>51</td><td>50</td><td>50</td><td>49</td><td>48</td><td>48</td><td>47</td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>52</td><td>51</td><td>51</td><td>51</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>49</td><td>49</td><td>48</td><td>48</td><td>47</td><td>47</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">A</td><td>10</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>49</td><td>49</td><td>49</td><td>48</td><td>48</td><td>48</td><td>47</td><td>47</td><td>46</td><td>46</td><td></td></tr><tr><td>15</td><td>49</td><td>48</td><td>48</td><td>48</td><td>48</td><td>48</td><td>47</td><td>47</td><td>47</td><td>46</td><td>46</td><td>45</td><td>45</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">B</td><td>20</td><td>47</td><td>47</td><td>47</td><td>47</td><td>47</td><td>46</td><td>46</td><td>46</td><td>46</td><td>45</td><td>45</td><td>45</td><td>44</td><td></td></tr><tr><td>25</td><td>45</td><td>45</td><td>45</td><td>45</td><td>45</td><td>45</td><td>45</td><td>45</td><td>44</td><td>44</td><td>44</td><td>43</td><td>43</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">B</td><td>30</td><td>44</td><td>44</td><td>44</td><td>44</td><td>44</td><td>43</td><td>43</td><td>43</td><td>43</td><td>43</td><td>43</td><td>42</td><td>42</td><td></td></tr><tr><td>35</td><td>42</td><td>42</td><td>42</td><td>42</td><td>42</td><td>42</td><td>42</td><td>42</td><td>42</td><td>42</td><td>41</td><td>41</td><td>---</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">I</td><td>40</td><td>40</td><td>40</td><td>40</td><td>40</td><td>40</td><td>40</td><td>40</td><td>40</td><td>40</td><td>40</td><td>40</td><td>---</td><td>---</td><td></td></tr><tr><td>45</td><td>38</td><td>38</td><td>38</td><td>38</td><td>38</td><td>39</td><td>39</td><td>39</td><td>39</td><td>39</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">A</td><td>50</td><td>36</td><td>36</td><td>36</td><td>36</td><td>37</td><td>37</td><td>37</td><td>37</td><td>37</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td></td></tr><tr><td>55</td><td>33</td><td>34</td><td>34</td><td>34</td><td>35</td><td>35</td><td>35</td><td>35</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">%</td><td>60</td><td>31</td><td>32</td><td>32</td><td>32</td><td>33</td><td>33</td><td>33</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td></td></tr><tr><td>65</td><td>29</td><td>30</td><td>30</td><td>31</td><td>31</td><td>31</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td></td></tr><tr><td></td><td>70</td><td>26</td><td>27</td><td>27</td><td>28</td><td>28</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td></td></tr></table> Per determinare il numero di giorni intercorrenti tra due interventi irrigui (salvo pioggia) è sufficiente interpolare i valori percentuali di sabbia ed argilla derivanti dall'analisi del terreno.	Fase fenologica	Epoca	Restituzione idrica giornaliera (mm)		Irrigazione	Inerbito	Lavorato	1. Pre-chiusura grappolo	1ª decade luglio - 1ª decade agosto	3,8	2,8	Ammessa	2. Inizio invecchiatura	3ª decade luglio - 2ª decade agosto	-	-	Non ammessa salvo espressa indicazione dei bollettini			A R G I L L A %																10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70		S	0	53	53	52	52	51	51	51	50	50	49	48	48	47		5	52	51	51	51	50	50	50	49	49	48	48	47	47		A	10	50	50	50	49	49	49	48	48	48	47	47	46	46		15	49	48	48	48	48	48	47	47	47	46	46	45	45		B	20	47	47	47	47	47	46	46	46	46	45	45	45	44		25	45	45	45	45	45	45	45	45	44	44	44	43	43		B	30	44	44	44	44	44	43	43	43	43	43	43	42	42		35	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	41	41	---		I	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	---	---		45	38	38	38	38	38	39	39	39	39	39	---	---	---		A	50	36	36	36	36	37	37	37	37	37	---	---	---	---		55	33	34	34	34	35	35	35	35	---	---	---	---	---		%	60	31	32	32	32	33	33	33	---	---	---	---	---	---		65	29	30	30	31	31	31	---	---	---	---	---	---	---			70	26	27	27	28	28	---	---	---	---	---	---	---	---	
Fase fenologica	Epoca			Restituzione idrica giornaliera (mm)			Irrigazione																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		Inerbito	Lavorato																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1. Pre-chiusura grappolo	1ª decade luglio - 1ª decade agosto	3,8	2,8	Ammessa																																																																																																																																																																																																																																																																																							
2. Inizio invecchiatura	3ª decade luglio - 2ª decade agosto	-	-	Non ammessa salvo espressa indicazione dei bollettini																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		A R G I L L A %																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70																																																																																																																																																																																																																																																																													
S	0	53	53	52	52	51	51	51	50	50	49	48	48	47																																																																																																																																																																																																																																																																													
	5	52	51	51	51	50	50	50	49	49	48	48	47	47																																																																																																																																																																																																																																																																													
A	10	50	50	50	49	49	49	48	48	48	47	47	46	46																																																																																																																																																																																																																																																																													
	15	49	48	48	48	48	48	47	47	47	46	46	45	45																																																																																																																																																																																																																																																																													
B	20	47	47	47	47	47	46	46	46	46	45	45	45	44																																																																																																																																																																																																																																																																													
	25	45	45	45	45	45	45	45	45	44	44	44	43	43																																																																																																																																																																																																																																																																													
B	30	44	44	44	44	44	43	43	43	43	43	43	42	42																																																																																																																																																																																																																																																																													
	35	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	41	41	---																																																																																																																																																																																																																																																																													
I	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	---	---																																																																																																																																																																																																																																																																													
	45	38	38	38	38	38	39	39	39	39	39	---	---	---																																																																																																																																																																																																																																																																													
A	50	36	36	36	36	37	37	37	37	37	---	---	---	---																																																																																																																																																																																																																																																																													
	55	33	34	34	34	35	35	35	35	---	---	---	---	---																																																																																																																																																																																																																																																																													
%	60	31	32	32	32	33	33	33	---	---	---	---	---	---																																																																																																																																																																																																																																																																													
	65	29	30	30	31	31	31	---	---	---	---	---	---	---																																																																																																																																																																																																																																																																													
	70	26	27	27	28	28	---	---	---	---	---	---	---	---																																																																																																																																																																																																																																																																													
Raccolta	⇒ Nel caso della vendemmia meccanica le uve vanno consegnate in cantina entro 4 ore dall'inizio della vendemmia. ⇒ Nel caso di vendemmia manuale la consegna deve avvenire entro 12 ore dall'inizio della vendemmia ⇒ La raccolta in cassette è obbligatoria per la produzione di vino base spumante e vino novello																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Uso del marchio SQNPI e/o del marchio QM	I prodotti devono essere sempre identificati al fine di permetterne la rintracciabilità, in modo da renderli facilmente distinguibili rispetto ad altri ottenuti con modalità produttive diverse																																																																																																																																																																																																																																																																																										

VITE DA VINO Alta produzione – CONCIMAZIONE AZOTO

Note decrementi		Note incrementi
Quantitativo di AZOTO da sottrarre (-) alla dose standard in funzione delle diverse condizioni: (barrare le opzioni adottate)	Apporto di AZOTO standard in situazione normale per una produzione di: 16-24 t/ha: DOSE STANDARD: 80 kg/ha di N;	Quantitativo di AZOTO che potrà essere aggiunto (+) alla dose standard in funzione delle diverse condizioni. Il quantitativo massimo che l'agricoltore potrà aggiungere alla dose standard anche al verificarsi di tutte le situazioni è di: 30 kg/ha: (barrare le opzioni adottate)
☐ 25 kg: se si prevedono produzioni inferiori a 16 t/ha; ☐ 20 kg: in caso di elevata dotazione di sostanza organica; ☐ 20 kg: nel caso di apporto di ammendanti nell'anno precedente; ☐ 20 kg: in caso di eccessiva attività vegetativa.		☐ 25 kg: se si prevedono produzioni superiori a 24 t/ha; ☐ 20 kg: in caso di scarsa dotazione di sostanza organica; ☐ 20 kg: in caso di scarsa attività vegetativa; ☐ 15 kg: in caso di forte lisciviazione dovuta a surplus pluviometrico in specifici periodi dell'anno (es. pioggia superiore a 300 mm nel periodo dal 1 ottobre al 28 febbraio); ☐ 20 kg: in caso di cv ad elevata esigenza di N; ☐ 20 kg: in presenza di inerbimento permanente.
Concimazione Azoto in allevamento:		
1° anno: 40 kg/ha; 2° anno: 60 kg/ha.		

VITE DA VINO Alta produzione – CONCIMAZIONE FOSFORO

Note decrementi		Note incrementi
Quantitativo di P₂O₅ da sottrarre (-) alla dose standard: (barrare le opzioni adottate)	Apporto di P₂O₅ standard in situazione normale per una produzione di: 16-24 t/ha: DOSE STANDARD	Quantitativo di P₂O₅ che potrà essere aggiunto (+) alla dose standard: (barrare le opzioni adottate)
☐ 10 kg: se si prevedono produzioni inferiori a 16 t/ha; ☐ 10 kg: con apporto di ammendanti nell'anno precedente.	80 kg/ha: in caso di terreni con dotazione normale; 100 kg/ha: in caso di terreni con dotazione scarsa; 160 kg/ha: in caso di terreni con dotazione scarsissima; 40 kg/ha: in situazione di elevata dotazione del terreno.	☐ 10 kg: se si prevedono produzioni superiori a 24 t/ha; ☐ 10 kg: in caso di scarsa dotazione di sostanza organica (linee guida fertilizzazione); ☐ 20 kg: in caso di terreni ad elevato tenore di calcare attivo.
Concimazione Fosforo in allevamento: 1° anno: 15 kg/ha; 2° anno: 25 kg/ha.		

VITE Alta produzione – CONCIMAZIONE POTASSIO

Note decrementi		Note incrementi
Quantitativo di K₂O da sottrarre (-) alla dose standard: (barrare le opzioni adottate)	Apporto di K₂O standard in situazione normale per una produzione di: 16-24 t/ha: DOSE STANDARD	Quantitativo di K₂O che potrà essere aggiunto (+) alla dose standard: (barrare le opzioni adottate)
☐ 50 kg: se si prevedono produzioni inferiori a 16 t/ha; ☐ 30 kg: con apporto di ammendanti nell'anno precedente.	120 kg/ha: in caso di terreni con dotazione normale; 180 kg/ha: in caso di terreni con dotazione scarsa. 70 kg/ha: in situazione di elevata dotazione del terreno.	☐ 50 kg: se si prevedono produzioni superiori a 24 t/ha.
Concimazione Potassio in allevamento: 1° anno: 20 kg/ha; 2° anno: 40 kg/ha.		

VITE DA VINO Medio-bassa produzione – CONCIMAZIONE AZOTO

Note decrementi Quantitativo di AZOTO da sottrarre (-) alla dose standard in funzione delle diverse condizioni: (barrare le opzioni adottate)	Apporto di AZOTO standard in situazione normale per una produzione di: 8-12 t/ha: DOSE STANDARD: 50 kg/ha di N;	Note incrementi Quantitativo di AZOTO che potrà essere aggiunto (+) alla dose standard in funzione delle diverse condizioni. Il quantitativo massimo che l'agricoltore potrà aggiungere alla dose standard anche al verificarsi di tutte le situazioni è di: 40 kg/ha: (barrare le opzioni adottate)
☐ 20 kg: se si prevedono produzioni inferiori a 8 t/ha; ☐ 20 kg: in caso di elevata dotazione di sostanza organica; ☐ 20 kg: nel caso di apporto di ammendanti nell'anno precedente; ☐ 20 kg: in caso di eccessiva attività vegetativa.		☐ 20 kg: se si prevedono produzioni superiori a 12 t/ha; ☐ 20 kg: in caso di scarsa dotazione di sostanza organica; ☐ 20 kg: in caso di scarsa attività vegetativa; ☐ 20 kg: in caso di forte lisciviazione dovuta a surplus pluviometrico in specifici periodi dell'anno (es. pioggia superiore a 300 mm nel periodo dal 1 ottobre al 28 febbraio).
Concimazione Azoto in allevamento: 1° anno: 30 kg/ha; 2° anno: 50 kg/ha.		

VITE DA VINO Medio-bassa produzione – CONCIMAZIONE FOSFORO

Note decrementi Quantitativo di P₂O₅ da sottrarre (-) alla dose standard: (barrare le opzioni adottate)	Apporto di P₂O₅ standard in situazione normale per una produzione di: 8-12 t/ha: DOSE STANDARD	Note incrementi Quantitativo di P₂O₅ che potrà essere aggiunto (+) alla dose standard: (barrare le opzioni adottate)
☐ 10 kg: se si prevedono produzioni inferiori a 8 t/ha; ☐ 10 kg: con apporto di ammendanti nell'anno precedente.	40 kg/ha: in caso di terreni con dotazione normale; 60 kg/ha: in caso di terreni con dotazione scarsa; 100 kg/ha: in caso di terreni con dotazione scarsissima; 20 kg/ha: in situazione di elevata dotazione del terreno.	☐ 10 kg: se si prevedono produzioni superiori a 12 t/ha; ☐ 10 kg: in caso di scarsa dotazione di sostanza organica (linee guida fertilizzazione); ☐ 20 kg: in caso di terreni ad elevato tenore di calcare attivo.
Concimazione Fosforo in allevamento: 1° anno: 15 kg/ha; 2° anno: 25 kg/ha.		

VITE DA VINO Medio-bassa produzione – CONCIMAZIONE POTASSIO

Note decrementi Quantitativo di K₂O da sottrarre (-) alla dose standard: (barrare le opzioni adottate)	Apporto di K₂O standard in situazione normale per una produzione di: 8-12 t/ha: DOSE STANDARD	Note incrementi Quantitativo di K₂O che potrà essere aggiunto (+) alla dose standard: (barrare le opzioni adottate)
☐ 30 kg: se si prevedono produzioni inferiori a 8 t/ha; ☐ 30 kg: con apporto di ammendanti nell'anno precedente.	80 kg/ha: in caso di terreni con dotazione normale; 150 kg/ha: in caso di terreni con dotazione scarsa. 40 kg/ha: in situazione di elevata dotazione del terreno.	☐ 30 kg: se si prevedono produzioni superiori a 12 t/ha.
Concimazione Potassio in allevamento: 1° anno: 20 kg/ha; 2° anno: 40 kg/ha.		