

Scelta dell'ambiente di coltivazione e vocazionalità	Nessun vincolo specifico fatto salvo quanto previsto nella “Parte generale”														
Mantenimento dell'agroecosistem a naturale	Nessun vincolo specifico fatto salvo quanto previsto nella “Parte generale”														
Scelta varietale e materiale di moltiplicazione	Si faccia riferimento alla parte generale ⇒ Il seme deve essere obbligatoriamente certificato (certificazione ufficiale rilasciata dal Centro di sperimentazione e certificazione delle sementi CREA-SCS)														
	Le varietà consigliate in regione Marche: <table><tr><td>ARABESQUA KWS ARUM BALEAR BALI BAMBOU BARBATE BENIAMINA KWS BENVENUTA KWS BISON BTS 1740 BTS 1820 N BTS 2730 BTS 555 BTS 5950N BTS 6990</td><td>BTS 8840 BTS SMART 9145 N BTS SMART 9635 BTS SMART 9775 N CITRUS EINSTEIN ELISKA KWS ESSENZIA KWS FERRET FIAMMETTA KWS GIACOMINA KWS GREGORIA KWS HELSINKI KIPUNJI SMART MARINELLA KWS</td><td>MARSUPIAL SMART MELINDIA KWS MERADONNA KWS MOHICAN MOLIERE NINFEA OCTOPUS OTTAVIA KWS PORTAL PREZIOSA KWS RAISON RHINOCEROS SANDPIPER SMART SATIE' SEBASTIANA KWS</td><td>SMART KWS SMART KWS SMART KWS SMART BRIGA KWS SMART DJERBA KWS SMART IMOLA KWS SMART RENJA KWS SMART SEPHORA KWS SPIDER TESLA TONGA YUCATAN</td><td>ALAMEA BELAMIA KWS KWS KWS</td></tr></table>					ARABESQUA KWS ARUM BALEAR BALI BAMBOU BARBATE BENIAMINA KWS BENVENUTA KWS BISON BTS 1740 BTS 1820 N BTS 2730 BTS 555 BTS 5950N BTS 6990	BTS 8840 BTS SMART 9145 N BTS SMART 9635 BTS SMART 9775 N CITRUS EINSTEIN ELISKA KWS ESSENZIA KWS FERRET FIAMMETTA KWS GIACOMINA KWS GREGORIA KWS HELSINKI KIPUNJI SMART MARINELLA KWS	MARSUPIAL SMART MELINDIA KWS MERADONNA KWS MOHICAN MOLIERE NINFEA OCTOPUS OTTAVIA KWS PORTAL PREZIOSA KWS RAISON RHINOCEROS SANDPIPER SMART SATIE' SEBASTIANA KWS	SMART KWS SMART KWS SMART KWS SMART BRIGA KWS SMART DJERBA KWS SMART IMOLA KWS SMART RENJA KWS SMART SEPHORA KWS SPIDER TESLA TONGA YUCATAN	ALAMEA BELAMIA KWS KWS KWS					
ARABESQUA KWS ARUM BALEAR BALI BAMBOU BARBATE BENIAMINA KWS BENVENUTA KWS BISON BTS 1740 BTS 1820 N BTS 2730 BTS 555 BTS 5950N BTS 6990	BTS 8840 BTS SMART 9145 N BTS SMART 9635 BTS SMART 9775 N CITRUS EINSTEIN ELISKA KWS ESSENZIA KWS FERRET FIAMMETTA KWS GIACOMINA KWS GREGORIA KWS HELSINKI KIPUNJI SMART MARINELLA KWS	MARSUPIAL SMART MELINDIA KWS MERADONNA KWS MOHICAN MOLIERE NINFEA OCTOPUS OTTAVIA KWS PORTAL PREZIOSA KWS RAISON RHINOCEROS SANDPIPER SMART SATIE' SEBASTIANA KWS	SMART KWS SMART KWS SMART KWS SMART BRIGA KWS SMART DJERBA KWS SMART IMOLA KWS SMART RENJA KWS SMART SEPHORA KWS SPIDER TESLA TONGA YUCATAN	ALAMEA BELAMIA KWS KWS KWS											
Sistemazione e preparazione del suolo	Nessun vincolo specifico fatto salvo quanto previsto nella “Parte generale” ⇒ Non sono ammessi interventi di sterilizzazione chimica del suolo.														
Avvicendamento colturale	Si faccia riferimento alla parte generale ⇒ la coltura può tornare sullo stesso appezzamento dopo un intervallo di 3 anni ⇒ Le altre specie in precessione e successione non devono appartenere alla famiglia delle chenopodiacee e delle crucifere (ad esclusione di rafano, senape o altre crucifere se resitenti ai nematodi)														
Semina, trapianto, impianto	Nessun vincolo specifico fatto salvo quanto previsto nella “Parte generale” È importante scegliere il giusto investimento anche al fine di evitare stress idrico delle piante e comportare condizioni micro-climatiche più favorevoli allo sviluppo dei funghi tossigeni. Definita la densità che s’intende adottare, il quantitativo della semente da impiegare si calcola sulla base delle indicazioni seguenti: Sesti e profondità d’impianto, epoca consigliati per la barbabietola da zucchero <table><tr><td>Distanza tra le file (cm)</td><td>Distanza sulla fila (cm)</td><td>Densità d’impianto (n. semi/ha)</td><td>Profondità di impianto (cm) (*)</td><td>Epoca (decadi)</td></tr><tr><td>45 - 50</td><td>12,5 – 15,00</td><td>150.000 - 180.000</td><td>2 – 3 3 – 4</td><td>II – III febbraio I – II marzo</td></tr></table>					Distanza tra le file (cm)	Distanza sulla fila (cm)	Densità d’impianto (n. semi/ha)	Profondità di impianto (cm) (*)	Epoca (decadi)	45 - 50	12,5 – 15,00	150.000 - 180.000	2 – 3 3 – 4	II – III febbraio I – II marzo
Distanza tra le file (cm)	Distanza sulla fila (cm)	Densità d’impianto (n. semi/ha)	Profondità di impianto (cm) (*)	Epoca (decadi)											
45 - 50	12,5 – 15,00	150.000 - 180.000	2 – 3 3 – 4	II – III febbraio I – II marzo											
Gestione del suolo e pratiche agronomiche per il controllo delle infestanti	Nessun vincolo specifico fatto salvo quanto previsto nella “Parte generale”														
Gestione della pianta e della fruttificazione	Si rimanda a quanto normato dal disciplinare per la produzione integrata delle colture parte difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti														
Irrigazione	Si rimanda alle indicazioni contenute nella Parte Generale. ⇒ Non è ammessa l'irrigazione per scorrimento ⇒ Relativamente al momento d’intervento e ai volumi massimi ammessi occorre attenersi a quanto indicato di seguito														

Restituzione idrica giornaliera espressa in millimetri/giorno: è la quantità d'acqua necessaria giornalmente per un ottimale sviluppo della pianta.

Fenofase	Restituzione idrica giornaliera mm/giorno	Irrigazione
Semina	0,6	Non ammessa salvo espressa indicazione dei bollettini
6. ^a foglia	1,2	Non ammessa salvo espressa indicazione dei bollettini
8. ^a foglia	2,4	Ammessa
12. ^a foglia	4,1	Ammessa
16. ^a foglia	0,6	Non ammessa salvo espressa indicazione dei bollettini

Volumi massimi di intervento (mm)

		ARGILLA %													
		10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	
S A B B I A	0	54	55	56	56	57	57	58	58	58	59	59	60	60	
	5	53	53	54	55	56	57	57	58	59	60	61	61	62	
	10	50	51	52	53	53	54	55	56	57	57	58	59	60	
	15	48	49	49	50	51	52	53	54	54	55	56	57	58	
	20	46	46	47	48	49	50	50	51	52	53	54	54	55	
	25	43	44	45	46	46	47	48	49	50	50	51	52	53	
	30	41	42	42	43	44	45	46	46	47	48	49	50	50	
	35	38	39	40	41	42	42	43	44	45	46	47	47	-	
	40	36	37	38	39	39	40	41	42	43	43	44	-	-	
	45	34	35	35	36	37	38	39	39	40	41	-	-	-	
%	50	31	32	33	34	35	35	36	37	38	-	-	-	-	
	55	29	30	31	31	32	33	34	35	-	-	-	-	-	
	60	27	27	28	29	30	31	32	-	-	-	-	-	-	
	65	24	25	26	27	28	28	-	-	-	-	-	-	-	
	70	22	23	24	24	2	-	-	-	-	-	-	-	-	

Fertilizzazione

Si faccia riferimento a quanto indicato nella "Parte generale".

Uso del marchio SQNPI e/o del marchio QM

Si faccia riferimento a quanto indicato nella "Parte generale".

Raccolta e post - raccolta

Si faccia riferimento a quanto indicato nella "Parte generale".

⇒ La conservazione in cumulo deve essere la più breve possibile (massimo 2 giorni) da ridurre ulteriormente qualora i fittoni siano stati danneggiati nella fase di raccolta

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO – CONCIMAZIONE AZOTO

Note decrementi Quantitativo di AZOTO da sottrarre (-) alla dose standard in funzione delle diverse condizioni: (barrare le opzioni adottate)	Apporto di AZOTO standard in situazione normale per una produzione di: 60-80 t/ha: DOSE STANDARD: 120 kg/ha di N*	Note incrementi Quantitativo di AZOTO che potrà essere aggiunto (+) alla dose standard in funzione delle diverse condizioni. Il quantitativo massimo che l'agricoltore potrà aggiungere alla dose standard anche al verificarsi di tutte le situazioni è di: 40 kg/ha: (barrare le opzioni adottate)
☐ 30 kg: se si prevedono produzioni inferiori a 60 t/ha; ☐ 20 kg: in caso di elevata dotazione di sostanza organica (linee guida fertilizzazione); ☐ 80 kg: nel caso di successione a medica, prati > 5 anni; ☐ 40 kg: nei casi di precessione di prati a leguminose o misti; ☐ 20 kg: in caso di apporto di ammendante alla precessione.		☐ 30 kg: se si prevedono produzioni superiori a 80 t/ha; ☐ 20 kg: in caso di scarsa dotazione di sostanza organica (linee guida fertilizzazione); ☐ 30 kg: in caso di interrimento di paglie o stocchi della coltura precedente; ☐ 15 kg: in caso di forte lisciviazione dovuta a surplus pluviometrico in specifici periodi dell'anno (es. pioggia superiore a 300 mm nel periodo dal 1 ottobre al 28 febbraio).

(*): da distribuire al massimo un 40% in fase di semina e la restante quota in copertura, non oltre la 8° foglia.

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO – CONCIMAZIONE FOSFORO

Note decrementi Quantitativo di P₂O₅ da sottrarre (-) alla dose standard: (barrare le opzioni adottate)	Apporto di P₂O₅ standard in situazione normale per una produzione di: 60-80 t/ha: DOSE STANDARD	Note incrementi Quantitativo di P₂O₅ che potrà essere aggiunto (+) alla dose standard: (barrare le opzioni adottate)
☐ 20 kg: se si prevedono produzioni inferiori a 60 t/ha; ☐ 20 kg: con apporto di ammendanti nell'anno precedente.	70 kg/ha: in caso di terreni con dotazione normale; 90 kg/ha: in caso di terreni con dotazione scarsa; 100 kg/ha: in caso di terreni con dotazione scarsissima; 20 kg/ha: in caso di terreni con dotazione elevata.	☐ 20 kg: se si prevedono produzioni superiori a 80 t/ha; ☐ 20 kg: con basso tenore di sostanza organica nel terreno; ☐ 20 kg: in terreni con elevato calcare attivo.

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO – CONCIMAZIONE POTASSIO

Note decrementi Quantitativo di K₂O da sottrarre (-) alla dose standard: (barrare le opzioni adottate)	Apporto di K₂O standard in situazione normale per una produzione di: 60-80 t/ha: DOSE STANDARD	Note incrementi Quantitativo di K₂O che potrà essere aggiunto (+) alla dose standard: (barrare le opzioni adottate)
☐ 25 kg: se si prevedono produzioni inferiori a 60 t/ha; ☐ 20 kg: con apporto di ammendanti. nell'anno precedente.	130 kg/ha: in caso di terreni con dotazione normale; 210 kg/ha: in caso di terreni con dotazione scarsa; 300 kg/ha: in caso di terreni con dotazione scarsissima; 80 kg/ha: in caso di terreni con dotazione elevata.	☐ 25 kg: se si prevedono produzioni superiori a 80 t/ha.