

Scelta dell'ambiente di coltivazione e vocazionalità	Si rimanda a quanto previsto nella "Parte generale"								
Mantenimento dell'agroecosistema naturale	Nessun vincolo specifico fatto salvo quanto previsto nella "Parte generale"								
Scelta varietale e materiale di moltiplicazione	Nessun vincolo specifico fatto salvo quanto previsto nella "Parte generale" in particolare per il materiale di propagazione. Negli ambienti con clima temperato viene coltivata la varietà: <i>Coriandrum sativum</i> L. var <i>microcarpum</i> (D.C.) Hegi caratterizzata da frutti piccoli.								
Sistemazione e preparazione del suolo	Nessun vincolo specifico fatto salvo quanto previsto nella "Parte generale" ⇒ Non sono ammessi interventi di sterilizzazione chimica del suolo.								
Avvicendamento colturale	Il coriandolo è una pianta da rinnovo da porre in successione con i cereali autunno-vernini. ⇒ Non sono ammessi interventi di sterilizzazione chimica del suolo. ⇒ Non è ammesso il ristoppio. ⇒ L'intervallo minimo tra due cicli della coltura è di tre anni. ⇒ Non è ammesso l'inserimento nella rotazione di colture appartenenti alla famiglia delle ombrellifere								
Semina, trapianto, impianto	In Regione Marche, si consiglia di effettuare la semina diretta del coriandolo tra la fine del mese di marzo e quello di aprile, ad una profondità di 4-5 cm. Si rimanda alla tabella seguente per i consigli in merito alle distanze e alle densità d'impianto <table><tr><td rowspan="2">Epoca di semina</td><td colspan="2">Distanza (cm)</td></tr><tr><td>Tra le file</td><td>Sulla fila</td></tr><tr><td>Da fine Marzo a fine Aprile a pieno campo</td><td>20-30</td><td>2-4</td></tr></table> ⇒ Durante il ciclo colturale, data la fittezza degli investimenti, non sono ammesse lavorazioni meccaniche ma solo sfalci utili alla raccolta.	Epoca di semina	Distanza (cm)		Tra le file	Sulla fila	Da fine Marzo a fine Aprile a pieno campo	20-30	2-4
Epoca di semina	Distanza (cm)								
	Tra le file	Sulla fila							
Da fine Marzo a fine Aprile a pieno campo	20-30	2-4							
Gestione del suolo e pratiche agronomiche per il controllo delle infestanti	Nessun vincolo specifico fatto salvo quanto previsto nella "Parte generale"								
Gestione della pianta e della fruttificazione	Si rimanda a quanto normato dal disciplinare per la produzione integrata delle colture parte difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti								
Irrigazione	Si faccia riferimento a quanto indicato nella "Parte generale". ⇒ L'irrigazione per scorrimento è vietata								
Fertilizzazione	Si faccia riferimento a quanto indicato nella "Parte generale". ⇒ L'apporto di azoto deve essere frazionato in pre-semina con apporto massimo di 40 kg di N e la restante parte in copertura ⇒ Non si deve eccedere con la concimazione azotata per pericolo di allettamento ⇒ L'apporto dei concimi a base di P2O5 e K2O deve essere eseguito unicamente in pre-semina e solo quando l'analisi del terreno eseguita evidenzia la dotazione di tali elementi nutritivi corrispondente ai valori scarso o normale. Nel primo caso la quota di concime somministrata corrisponde alla dose di mantenimento e alla dose di arricchimento, nel secondo caso la quota fornita è pari alla dose di mantenimento. Quando la dotazione è elevata non sono ammesse concimazioni								
Uso del marchio SQNPI e/o del marchio QM	I prodotti devono essere sempre identificati al fine di permetterne la rintracciabilità, in modo da renderli facilmente distinguibili rispetto ad altri ottenuti con modalità produttive diverse								
Raccolta e post - raccolta	Nessun vincolo specifico								

CORIANDOLO (*Coriandrum sativum*) – CONCIMAZIONE AZOTO

Note decrementi		Note incrementi
Quantitativo di AZOTO da sottrarre (-) alla dose standard in funzione delle diverse condizioni: (barrare le opzioni adottate)	Apporto di AZOTO standard in situazione normale per una produzione di: 1,2 – 1,5 t/ha DOSE STANDARD: 50 kg/ha di N	Quantitativo di AZOTO che potrà essere aggiunto (+) alla dose standard in funzione delle diverse condizioni. Il quantitativo massimo che l'agricoltore potrà aggiungere alla dose standard anche al verificarsi di tutte le situazioni è di 30 Kg/ha : (barrare le opzioni adottate)
☐ 30 Kg : se si prevedono produzioni inferiori a 1,2 t/ha; ☐ 20 Kg : in caso di elevata dotazione di sostanza organica (linee guida fertilizzazione); ☐ 20 kg : in caso di apporto di ammendanti alla coltura in precessione.		☐ 20 Kg : se si prevedono produzioni superiori a 1,5 t/ha; ☐ 20 Kg : in caso di scarsa dotazione di sostanza organica (linee guida fertilizzazione); ☐ 30 Kg : in caso di successione ad un cereale con paglia interrata; ☐ 15 Kg : in caso di forte lisciviazione dovuta a surplus pluviometrico in specifici periodi dell'anno (es. pioggia superiore a 300 mm nel periodo dal 1 ottobre al 28 febbraio).

CORIANDOLO (*Coriandrum sativum*) – CONCIMAZIONE FOSFORO

Note decrementi		Note incrementi
Quantitativo di P₂O₅ da sottrarre (-) alla dose standard (barrare le opzioni adottate)	Apporto di P₂O₅ standard in situazione normale per una produzione di: 1,2 – 1,5 t/ha DOSE STANDARD	Quantitativo di P₂O₅ che potrà essere aggiunto (+) alla dose standard (barrare le opzioni adottate)
☐ 15 Kg : se si prevedono produzioni inferiori a 1,2 t/ha; ☐ 10 kg : in caso di apporto di ammendanti alla coltura in precessione.	☐ 60 Kg/ha : in caso di terreni con dotazione normale; ☐ 80 Kg/ha : in caso di terreni con dotazione scarsa; ☐ 30 Kg/ha : in caso di terreni con dotazione elevata.	☐ 15 Kg : se si prevedono produzioni superiori a 1,5 t/ha; ☐ 10 kg : in caso di basso tenore di sostanza organica nel suolo.

CORIANDOLO (*Coriandrum sativum*) – CONCIMAZIONE POTASSIO

Note decrementi		Note incrementi
Quantitativo di K₂O da sottrarre (-) alla dose standard (barrare le opzioni adottate)	Apporto di K₂O standard in situazione normale per una produzione di: 1,2 – 1,5 t/ha DOSE STANDARD	Quantitativo di K₂O che potrà essere aggiunto (+) alla dose standard (barrare le opzioni adottate)
☐ 20 Kg : se si prevedono produzioni inferiori a 1,2 t/ha.	☐ 40 Kg/ha : in caso di terreni con dotazione normale; ☐ 60 Kg/ha : in caso di terreni con dotazione scarsa; ☐ 0 Kg/ha : in caso di terreni con dotazione elevata.	☐ 20 Kg : se si prevedono produzioni superiori a 1,5 t/ha.

CORIANDOLO DA SEME – CONCIMAZIONE AZOTO

Note decrementi		Note incrementi
Quantitativo di AZOTO da sottrarre (-) alla dose standard in funzione delle diverse condizioni: (barrare le opzioni adottate)	Apporto di AZOTO standard in situazione normale. DOSE STANDARD: 70 kg/ha di N	Quantitativo di AZOTO che potrà essere aggiunto (+) alla dose standard in funzione delle diverse condizioni. Il quantitativo massimo che l'agricoltore potrà aggiungere alla dose standard anche al verificarsi di tutte le situazioni è di: 20 kg/ha: (barrare le opzioni adottate)
☐ 20 kg: in caso di apporto di ammendante alla precessione; ☐ 15 kg: in caso di elevata dotazione di sostanza organica; ☐ 80 kg: nel caso di successione a medica, prati > 5 anni; ☐ 15 kg: in caso di successione a leguminosa annuale.		☐ 15 kg: in caso di scarsa dotazione di sostanza organica; ☐ 20 kg: in caso di successione ad un cereale con paglia interrata; ☐ 15 kg: in caso di forte lisciviazione dovuta a surplus pluviometrico in specifici periodi dell'anno (es. pioggia superiore a 300 mm nel periodo dal 1 ottobre al 28 febbraio); ☐ 20 kg: in caso di forti escursioni termiche e precipitazioni anomale durante la coltivazione (dati bollettino).

CORIANDOLO DA SEME – CONCIMAZIONE FOSFORO

Note decrementi		Note incrementi
Quantitativo di P₂O₅ da sottrarre (-) alla dose standard: (barrare le opzioni adottate)	Apporto di P₂O₅ standard in situazione normale. DOSE STANDARD	Quantitativo di P₂O₅ che potrà essere aggiunto (+) alla dose standard: (barrare le opzioni adottate)
☐ 10 kg: in caso di apporto di ammendante alla precessione.	70 kg/ha: in caso di terreni con dotazione normale; 150 kg/ha: in caso di terreni con dotazione scarsa; 40 kg/ha: in caso di terreni con dotazione elevata.	☐ 10 kg: in caso di basso tenore di sostanza organica nel suolo.

CORIANDOLO DA SEME – CONCIMAZIONE POTASSIO

Note decrementi		Note incrementi
Quantitativo di K₂O da sottrarre (-) alla dose standard: (barrare le opzioni adottate)	Apporto di K₂O standard in situazione normale. DOSE STANDARD	Quantitativo di K₂O che potrà essere aggiunto (+) alla dose standard: (barrare le opzioni adottate)
☐ 10 kg: in caso di apporto di ammendante alla precessione.	50 kg/ha: in caso di terreni con dotazione normale; 120 kg/ha: in caso di terreni con dotazione scarsa; 0 kg/ha: in caso di terreni con dotazione elevata.	