

DIFESA Frumento 2026 v2								
Note cultura	Frumento Tenero e Frumento Duro E' ammesso un solo trattamento anticrittogamico all'anno, indipendentemente dall'avversità che necessita combattere. Sono ammesse al massimo 2 sostanze attive candidate alla sostituzione indipendentemente dall'avversità. Limite di 1 intervento insetticida sulla coltura E' consigliabile l'impiego di seme conciato							1/3
Avversità	Nome latino	Criteri di intervento: vincoli	Criteri di intervento: consigli	Sostanza attiva	(1) n. max. interv. per singola s.a. indip. dall'avv.	(2) n. max. interv. per gruppo di s.a. indip. dall'avv.	Limitazioni d'uso e note	Limitazioni d'uso per avversità
AFIDI	<i>Metopolophium dirhodum</i> ; <i>Sitobion avenae</i> ; <i>Rhopalosiphum padi</i>	Soglia di intervento: 80% di culmi infestati.		<i>Sali potassici di acidi grassi</i>				
				Tau-Fluvalinate				
				Piretrine				
CIMICI	<i>Eurygaster maura</i> ; <i>Aelia rostrata</i>	Soglia 5 individui/m ²		Tau-Fluvalinate				
COMPLESSO DELLA SEPTORIOSI FOGLIARE DEL FRUMENTO		Septoria: evidenti sintomi di septoriosi sulle ultime 2 foglie	Interventi agronomici: Evitare le semine troppo fitte - Effettuare concimazioni equilibrate - Seminare cv. Resistenti o tolleranti	<i>Bacillus subtilis</i>				
				<i>Pythium oligandrum</i>				
				<i>Laminarina</i>				
				Fenpicoxamid				
				Benzovindiflupyr		1		
				Fluxapyroxad				
				Spiroxamina			Ammesso solo in miscela con altre s.a.	
				Azoxystrobin		2		
				Pyraclostrobin				
				Trifloxystrobin			Ammesso solo in miscela	
				Difenoconazolo			Impiegabile esclusivamente in miscela con Tebuconazolo	
				Tebuconazolo				
				Mefentrifluconazolo			Ammesso solo in miscela con altre s.a.	
				Metconazolo				
				Protioconazolo				
				Tetraconazolo				
				Bromuconazolo				
				<i>Bicarbonato di potassio</i>				
				<i>Zolfo</i>				
				Prodotti rameici			Non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di Rame per ettaro nell'arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo applicato di 4 kg di Rame per ettaro all'anno (al raggiungimento di tale limite concorrono anche gli apporti di Rame metallo impiegati per la fertilizzazione)	
CARBONE	<i>Ustilago tritici</i>							Non sono ammessi interventi con sostanze di sintesi contro questa avversità

DIFESA Frumento 2026 v2								
Note cultura	Frumento Tenero e Frumento Duro E' ammesso un solo trattamento anticrittogamico all'anno, indipendentemente dall'avversità che necessita combattere. Sono ammesse al massimo 2 sostanze attive candidate alla sostituzione indipendentemente dall'avversità. Limite di 1 intervento insetticida sulla coltura E' consigliabile l'impiego di seme conciato							2/3
Avversità	Nome latino	Criteri di intervento: vincoli	Criteri di intervento: consigli	Sostanza attiva	(1) n. max. interv. per singola s.a. indep. dall'avv.	(2) n. max. interv. per gruppo di s.a. indep. dall'avv.	Limitazioni d'uso e note	Limitazioni d'uso per avversità
CARIE	<i>Tilletia spp.</i>							Non sono ammessi interventi con sostanze di sintesi contro questa avversità
MAL DEL PIEDE	<i>Fusarium spp.</i>							Non sono ammessi interventi con sostanze di sintesi contro questa avversità
OIDIO		Soglie: Oidio: 10-12 pustole sulle ultime due foglie	Interventi agronomici: Evitare le semine troppo fitte - Effettuare concimazioni equilibrate - Seminare cv. Resistenti o tolleranti.	<i>Bacillus subtilis</i>				
				<i>Laminarina</i>				
				<i>Zolfo</i>				
				Bixafen		1	Ammesso solo in miscela con altre s.a.	
				Fluxapyroxad				
				Spiroxamina			Ammesso solo in miscela con altre s.a.	
				Azoxystrobin		2		
				Pyraclostrobin				
				Trifloxystrobin			Ammesso solo in miscela	
				Tebuconazolo		2		
				Bromuconazolo				
				Tetraconazolo				
				Protioconazolo				
				Metconazolo				
				Mefentrifluconazolo			Ammesso solo in miscela con altre s.a.	
				Tetraconazolo				
FUSARIOSI DEI CEREALI	<i>Fusarium spp.</i>		Interventi agronomici: Evitare le semine troppo fitte; Effettuare concimazioni equilibrate; Seminare cv. tolleranti. Interventi fitosanitari: Intervenire al termine della spigatura/inizio fioritura.	<i>Pythium oligandrum</i>				
				<i>Bicarbonato di potassio</i>				
				<i>Laminarina</i>				
				<i>Bacillus subtilis</i>				
				Pyraclostrobin				
				Tebuconazolo		2		
				Protioconazolo				
				Bromuconazolo				
				Metconazolo				
				Difenoconazolo			Ammesso solo in miscela con Tebuconazolo	
				Mefentrifluconazolo				

DIFESA Frumento 2026 v2								
Note cultura	Frumento Tenero e Frumento Duro E' ammesso un solo trattamento anticrittogamico all'anno, indipendentemente dall'avversità che necessita combattere. Sono ammesse al massimo 2 sostanze attive candidate alla sostituzione indipendentemente dall'avversità. Limite di 1 intervento insetticida sulla coltura E' consigliabile l'impiego di seme conciato							3/3
Avversità	Nome latino	Criteri di intervento: vincoli	Criteri di intervento: consigli	Sostanza attiva	(1) n. max. interv. per singola s.a. indep. dall'avv.	(2) n. max. interv. per gruppo di s.a. indep. dall'avv.	Limitazioni d'uso e note	Limitazioni d'uso per avversità
RUGGINI	<i>Puccinia recondita;</i> <i>Puccinia striiformis;</i> <i>Puccinia graminis</i>	Ruggine: comparsa degli uredosori sulle ultime due foglie.	Interventi agronomici: Evitare le semine troppo fitte - Effettuare concimazioni equilibrate - Seminare cv. Resistenti o tolleranti	Benzovindiflupyr		1		Ammesso solo in miscela con altre s.a. Autorizzato contro Puccinia Recondita
				Bixafen				
				Fluxapyroxad				
				Fenpicoxamid		2	Non ammesso per Puccinia Graminis	
				Mefentrifluconazolo			Ammesso solo in miscela con altre s.a.	
				Bromuconazolo				
				Tetraconazolo				
				Tebuconazolo				
				Protioconazolo				
				Difenoconazolo			Impiegabile esclusivamente in miscela con Tebuconazolo	
				Metconazolo				
				Azoxystrobin		2		
				Pyraclostrobin				
				Trifloxystrobin			Ammesso solo in miscela	
				Spiroxamina	1		Impiegabile in miscela	
				Bicarbonato di potassio				
				Zolfo				