

DIFESA Cetriolo 2026 v2								
Note coltura								1/4
Avversità	Nome latino	Criteri di intervento: vincoli	Criteri di intervento: consigli	Sostanza attiva	(1) n. max. interv. per singola s.a. incip. dall'avv.	(2) n. max. interv. per gruppo di s.a. incip. dall'avv.	Limitazioni d'uso e note	Limitazioni d'uso per avversità
AFIDE DELLE CUCURBITACEE	<i>Aphis gossypii</i>	Soglia di intervento: 50% di piante infestate	In serra è consigliato il lancio degli ausiliari Chrisoperla carnea, Aphidius colemani	<i>Aphidius colemani</i>			Da preferire nei lanci primaverili	Massimo 2 trattamenti all'anno contro questa avversità
				<i>Lysiphlebus testaceipes</i>			Da preferire nei lanci estivi	
				<i>Chrysoperla carnea</i>				
				<i>Beauveria bassiana</i>				
				<i>Sali potassici di acidi grassi</i>		1		
				<i>Maltodestrina</i>				
				<i>Azadiractina A</i>				
				Acetamiprid				
				Sulfoxaflor		2	Impiegabile come da etichetta, fino ad un massimo di 400 ml ha/anno. Ammesso solo in serra	
				Flupyradifurone	1		In serra sono ammessi 2 trattamenti all'anno	
				Tau-Fluvalinate			Non ammesso in serra	
				Deltametrina				
				Lambda-cialotrina	1			
				Piretrine				
				Flonicamid				
TRIPIDE OCCIDENTALE DEI FIORI	<i>Frankliniella occidentalis</i>			<i>Amblyseius cucumeris</i>				
				Anthocoridae				
				<i>Beauveria bassiana</i>				
				<i>Paecilomyces spp.</i>				
				Olio essenziale di arancio				
				<i>Sali potassici di acidi grassi</i>				
				<i>Azadiractina A</i>				
				Spinosad	3	3		
ALEURODIDI	<i>Trialeurodes vaporariorum;</i> <i>Bemisia tabaci</i>	Soglia: presenza di almeno 10 stadi giovanili per foglia.	In serra è consigliato il lancio di Encarsia formosa, Amblyseius swirskii, A. cucumeris, Eretmoceris eremicus	<i>Encarsia formosa</i>			Impiegabile con elevata presenza di adulti	Massimo 1 trattamento all'anno contro questa avversità
				<i>Eretmoceris eremicus</i>				
				<i>Amblyseius swirskii</i>				
				<i>Paecilomyces spp.</i>			Ammesso solo in serra	
				<i>Beauveria bassiana</i>				
				<i>Sali potassici di acidi grassi</i>				
				Olio essenziale di arancio				
				<i>Azadiractina A</i>				
				<i>Maltodestrina</i>		2		
				Piretrine	2			
				Terpenoid blend grd 460			Ammesso solo in serra	
				Acetamiprid		1		
				Sulfoxaflor			Impiegabile come da etichetta, fino ad un massimo di 400 ml ha/anno. Ammesso solo in serra.	
				Flupyradifurone	1		Ammesso solo in serra. In serra sono ammessi 2 trattamenti all'anno	
				Pyriproxyfen	2		Ammesso solo in serra	
				Flonicamid				
				Cyantraniliprole	2		Ammesso solo in serra e solo su colture fuori suolo.	

DIFESA Cetriolo 2026 v2									
Note coltura								2/4	
Avversità	Nome latino	Criteri di intervento: vincoli	Criteri di intervento: consigli	Sostanza attiva	(1) n. max. interv. per singola s.a. indip. dall'avv.	(2) n. max. interv. per gruppo di s.a. indip. dall'avv.	Limitazioni d'uso e note	Limitazioni d'uso per avversità	
NOTTUE FOGLIARI	Autographa gamma; Mamestra brassicae; Helicoverpa armigera = Heliothis armigera; Phlyctaenia ferrugalis = Udea ferrugalis; Spodoptera exigua	Presenza generalizzata		Bacillus thuringiensis					
RAGNETTO ROSSO	Tetranychus urticae	Soglia: presenza di focolai di infestazione	Intervenire preferibilmente in modo localizzato. In serra è consigliato il lancio di Phytoseiulus persimilis, Amblyseius andersoni, Amblyseius californicus. Per Amblyseius andersoni: preventivamente lanciare 6 individui/m2	Acari predatori			Phytoseiulus persimilis	Massimo 2 trattamenti all'anno per questa avversità	
				Beauveria bassiana					
				Sali potassici di acidi grassi					
				Olio essenziale di arancio					
				Terpenoid blend qrd 460			Ammesso solo in serra		
				Exitiazox					
				Fenpiroximate					
				Pyridaben			Ammesso solo in serra		
				Fenazaquin	1		Ammesso solo in serra.		
				Milbemectina					
				Abamectina			Ammesso solo in serre permanenti.		
				Acequinocil			Ammesso solo in serra		
PERONOSPORA	Pseudoperonospora cubensis		Interventi agronomici in serra: Favorire l'arieggiamento ed effettuare l'irrigazione con manichetta. Interventi chimici: In pieno campo effettuare i trattamenti in corrispondenza di periodi umidi e piovosi e ripetere i trattamenti ogni 7-8 giorni per tutto il periodo in cui permangono le condizioni climatiche favorevoli allo sviluppo epidemiologico della malattia	Prodotti rameici			Non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di Rame per ettaro nell'arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo applicato di 4 kg di Rame per ettaro all'anno (al raggiungimento di tale limite concorrono anche gli apporti di Rame metallo impiegati per la fertilizzazione)		
				Metalaxil-M	2				
				Cyazofamid	2				
				Cymoxanil	1				
				Fluopicolide	1				
				Ametoctradina	2		Ammessa solo in serra		
				Zoxamide	3				
				Propamocarb	3		Ammesso solo in serra		
				Azoxystrobin		2	Tra Azoxystrobin, Pyroclostrobin e Trifloxystrobin massimo 2 trattamenti all'anno, indipendentemente dall'avversità		
				Pyraclostrobin					
				Fosetil Alluminio					
				Fosfonato di potassio			Ammessa solo in serra		

DIFESA Cetriolo 2026 v2								
Note coltura								3/4
Avversità	Nome latino	Criteri di intervento: vincoli	Criteri di intervento: consigli	Sostanza attiva	(1) n. max. interv. per singola s.a. indip. dall'avv.	(2) n. max. interv. per gruppo di s.a. indip. dall'avv.	Limitazioni d'uso e note	Limitazioni d'uso per avversità
SCLEROTINIA	Sclerotinia spp.		Interventi agronomici: Impedire i ristagni idrici nel terreno ed effettuare concimazioni equilibrate	Trichoderma asperellum				
				Trichoderma gamsii				
				Trichoderma atroviride				
				Coniothyrium minitans				
				Pythium oligandrum				
				Bacillus amyloliquefaciens				
				Penthiopyrad	1	2	Tra Penthiopyrad e Fluxapyroxad massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità.	
				Isofetamid			Ammesso solo in serra	
ODIO	Erysiphe cichoracearum; Sphaerotheca fuliginea		Interventi agronomici: Coltivare varietà resistenti. Interventi chimici: Quando compaiono i primi sintomi, evitando di impiegare il medesimo principio attivo nei trattamenti ripetuti	Ampelomyces quisqualis				
				Pythium oligandrum				
				Bicarbonato di potassio				
				Zolfo				
				Olio essenziale di arancio				
				Bacillus amyloliquefaciens			Solo in serra	
				Bacillus subtilis				
				COS-OGA	5			
				Cerevisane				
				Estratto acquoso dei semi germinati di Lupinus albus dolce				
				Eugenolo			Impiegabile solo formulati contenenti Eugenolo, Geraniolo e Timolo	
				Geraniolo				
				Timolo				
				Laminarina			Ammesso solo in serra	
				Bupirimate	2			
				Meptildinocap	2		Impiegabile fino al 30/09/2026.	
				Metrafenone	2			
				Difenoconazolo		2	Massimo 1 intervento all'anno tra i candidati alla sostituzione (Difenoconazolo, Tebuconazolo), indipendentemente dall'avversità	
				Penconazolo				
				Tebuconazolo				
				Tetraconazolo				
				Azoxystrobin		2	Tra Azoxystrobin e Trifloxystrobin massimo 2 trattamenti all'anno, indipendentemente dall'avversità	
				Trifloxystrobin				
				Fluxapyroxad		2	Tra Penthiopyrad e Fluxapyroxad massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità.	
				ANTRACNOSI DELLE CUCURBITACE	Colletotrichum lagenarium		Intervenire alla comparsa dei sintomi	

DIFESA Cetriolo 2026 v2								
Note coltura								4/4
Avversità	Nome latino	Criteri di intervento: vincoli	Criteri di intervento: consigli	Sostanza attiva	(1) n. max. interv. per singola s.a. incip. dall'avv.	(2) n. max. interv. per gruppo di s.a. incip. dall'avv.	Limitazioni d'uso e note	Limitazioni d'uso per avversità
CLADOSPORIOSI	<i>Cladosporium cucumerinum</i>		Intervenire alla comparsa dei sintomi	Prodotti rameici			Non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di Rame per ettaro nell'arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo applicato di 4 kg di Rame per ettaro all'anno (al raggiungimento di tale limite concorrono anche gli apporti di Rame metallo impiegati per la fertilizzazione)	
BOTRITE	<i>Botrytis cinerea</i>			<i>Pythium oligandrum</i>				
				<i>Bacillus amyloliquefaciens</i>	5			
				<i>Bacillus subtilis</i>				
				Estratto acquoso dei semi germinati di <i>Lupinus albus</i> dolce				
PYTHIUM SPP.				<i>Trichoderma asperellum</i>				
				<i>Trichoderma atroviride</i>				
MARCIUME BASALE E RIZOCTONIA	<i>Rhizoctonia solani</i>							
BATTERIOSI			Interventi agronomici: Impiego di seme sano, ampie rotazioni colturali. Interventi chimici: Dopo l'esecuzione delle operazioni colturali che possono produrre ferite sulla vegetazione	Prodotti rameici			Non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di Rame per ettaro nell'arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo applicato di 4 kg di Rame per ettaro all'anno (al raggiungimento di tale limite concorrono anche gli apporti di Rame metallo impiegati per la fertilizzazione)	
NEMATODI GALLIGENI				<i>Paecilomyces lilacinus</i> = <i>Purpureocillium lilacinum</i>			Interventi al terreno 14 gg prima del trapianto, da ripetere ogni 6 settimane alla dose di 4 kg/ha	
				Estratto di aglio				
				Geraniolo				
				Timolo				
				<i>Azadiractina A</i>				
LUMACHE, CHIOCCIOLE, LIMACCE				Fosfato ferrico				