DIFESA Cipolla 2026 v2								
Note coltura								1/2
Avversità	Nome latino	Criteri di intervento: vincoli	Criteri di intervento: consigli	Sostanza attiva	(1) n. max. interv. per singola s.a. indip. dall'avv.	(2) n. max. interv. per gruppo di s.a. indip. dall'avv.	Limitazioni d'uso e note	Limitazioni d'uso per avversità
MOSCA	*Delia antiqua ; Delia platura*		Soglia: Inizio infestazione	Deltametrina		2	Ammessi al massimo 2 trattamenti con piretroidi.	
				Etofenprox	1		Ammessi al massimo 2 trattamenti con piretroidi.	
				Cipermetrina	1		Ammessi al massimo 2 trattamenti con piretroidi.	
TRIPIDI	*Frankliniella occidentalis; Thrips tabaci*	Soglia: Inizio infestazione		*Beauveria bassiana*			Ammesso solo in pieno campo	Massimo 2 trattamenti all'anno contro questa avversità
				Azadiractina A				
				Sali potassici di acidi grassi				
				Olio essenziale di arancio				
				Lambda-cialotrina	1	3	Ammessi al massimo 2 trattamenti con piretroidi.	
				Spinosad	2			
AFIDI	*Myzus spp.*			*Sali potassici di acidi grassi*				
				Azadiractina A				
SPODOPTERA SPP.	*Spodoptera exigua*							
NOTTUE TERRICOLE		Interventi chimici: Presenza di infestazione diffusa		**Cipermetrina**			I trattamenti geodisinfestanti a base di piretroidi non sono da considerarsi nel limite numerico dei trattamenti fogliari con le stesse s.a.	Massimo 1 intervento all'anno contro questa avversità
MUFFA GRIGIA			Interventi chimici: Quando compaiono i primi sintomi di infezione	*Bacillus amyloliquefaciens*				Massimo 2 trattamenti all'anno contro questa avversità
				Pyrimethanil		2		
				Cyprodinil			Ammessa esclusivamente la miscela Cyprodinil + Fludioxonil	
				Fludioxonil				
				Boscalid			Ammessa esclusivamente la miscela Boscalid + Pyraclostrobin	
				Pyraclostrobin		2		
				Fenexamid	2		Solo in pieno campo	
PERONOSPORA DELLA CIPOLLA	*Peronospora spp.*		Interventi agronomici: Limitare le concimazioni azotate, assicurare un buon drenaggio del terreno, limitare l'uso dell'acqua irrigua, impiegare materiale di propagazione sano, raccogliere e distruggere le piante colpite. Interventi chimici: A seguito di piogge ripetute ed elevata umidità relativa.	***Prodotti rameici***			Non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di Rame per ettaro nell'arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo applicato di 4 kg di Rame per ettaro all'anno (al raggiungimento di tale limite concorrono anche gli apporti di Rame metallo impiegati per la fertilizzazione)	
				Metalaxil-M				
				Azoxystrobin		2		
				Pyraclostrobin			Ammesso solo in pieno campo	
				Valifenalate		3		
				Cymoxanil	3			
				Fluopicolide	1		Impiegabile esclusivamente la miscela Propamocarb + Fluopicolide e solo in pieno campo	
				Propamocarb	1			
				Cyazofamid	3			
				Zoxamide	4		Ammesso esclusivamente in miscela con altre s.a.	

DIFESA Cipolla 2026 v2								
Note coltura								2/2
Avversità	Nome latino	Criteri di intervento: vincoli	Criteri di intervento: consigli	Sostanza attiva	(1) n. max. interv. per singola s.a. indip. dall'avv.	(2) n. max. interv. per gruppo di s.a. indip. dall'avv.	Limitazioni d'uso e note	Limitazioni d'uso per avversità
FUSARIOSI								
RUGGINE				***Prodotti rameici***			Non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di Rame per ettaro nell'arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo applicato di 4 kg di Rame per ettaro all'anno (al raggiungimento di tale limite concorrono anche gli apporti di Rame metallo impiegati per la fertilizzazione)	
				Azoxystrobin				
				Difenoconazolo				
				Benzovindiflupyr			Impiegabile per il controllo di Puccinia allii e porri, in alternativa al Difenoconazolo	
ALTERNARIA	*Alternaria porri*			***Prodotti rameici***			Non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di Rame per ettaro nell'arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo applicato di 4 kg di Rame per ettaro all'anno (al raggiungimento di tale limite concorrono anche gli apporti di Rame metallo impiegati per la fertilizzazione)	
NEMATODI	*Ditylenchus dipsaci*							Impiegare per la semina bulbi non infestati; adottare rotazioni almeno quinquennali con piante non ospiti del parassita