DIFESA Melone 2026 v2								
Note coltura								1/4
Avversità	Nome latino	Criteri di intervento: vincoli	Criteri di intervento: consigli	Sostanza attiva	(1) n. max. interv. per singola s.a. indip. dall'avv.	(2) n. max. interv. per gruppo di s.a. indip. dall'avv.	Limitazioni d'uso e note	Limitazioni d'uso per avversità
AFIDE DELLE CUCURBITACEE	*Aphis gossypii*	Soglia: di intervento: 50% delle piante infestate.	In serra prediligere la lotta biologica mediante il lancio degli ausiliari Chrysoperla carnea, Aphidius colemani	*Aphidoletes aphidimyza*				Massimo 2 trattamenti all'anno contro questa avversità
				Aphidius colemani				
				Beauveria bassiana				
				Sali potassici di acidi grassi				
				Maltodestrina				
				Azadiractina A				
				Acetamiprid	1			
				Sulfoxaflor			Impiegabile come da etichetta, fino ad un massimo di 400 ml ha/anno. Ammesso solo in serra.	
				Tau-Fluvalinate		1	Non ammesso in serra	
				Flonicamid	1			
ALEURODIDI	*Trialeurodes vaporariorum; Bemisia tabaci*	Soglia: presenza di almeno 10 stadi giovanili per foglia	In serra prediligere la lotta biologica mediante il lancio degli ausiliari Encarsia formosa, Amblyseius swirskii, A. cucumeris, Eretmocerus eremicus	*Encarsia formosa*				Massimo 1 trattamento all'anno contro questa avversità
				Amblyseius swirskii				
				Eretmocerus eremicus				
				Beauveria bassiana				
				Paecilomyces spp.			Paecilomyces fumosoroseus	
				Azadiractina A				
				Maltodestrina				
				Olio essenziale di arancio				
				Sali potassici di acidi grassi				
				Acetamiprid	1			
				Sulfoxaflor			Impiegabile come da etichetta, fino ad un massimo di 400 ml ha/anno. Ammesso solo in serra.	
				Flonicamid	1			
				Terpenoid blend qrd 460			Ammesso solo in serra	
				Cyantraniliprole	2		Ammesso solo in serra e solo su colture fuori suolo.	
				Piretrine		1		
TRIPIDI	*Thrips tabaci*	Soglia: presenza.	In serra prediligere la lotta biologica mediante il lancio degli ausiliari Amblyseius swirskii, Orius spp	*Amblyseius cucumeris*				Massimo due trattamenti all'anno contro questa avversità.
				Anthocoridae			Orius spp.	
				Beauveria bassiana				
				Paecilomyces spp.			Ammesso solo in serra Paecilomyces fumosoroseus	
				Azadiractina A				
				Olio essenziale di arancio				
				Terpenoid blend qrd 460			Ammesso solo in serra	
				Spinosad	3	3		
				Cyantraniliprole	2		Ammesso solo in serra e solo su colture fuori suolo. Ammesso solo per Thrips tabaci.	

DIFESA Melone 2026 v2								
Note coltura								2/4
Avversità	Nome latino	Criteri di intervento: vincoli	Criteri di intervento: consigli	Sostanza attiva	(1) n. max. interv. per singola s.a. indip. dall'avv.	(2) n. max. interv. per gruppo di s.a. indip. dall'avv.	Limitazioni d'uso e note	Limitazioni d'uso per avversità
LIRIOMYZA	*Liriomyza spp.*			*Diglyphus Isaea*				
				Azadiractina A				
				Spinosad	3	3		
NOTTUE FOGLIARI	*Autographa gamma*			*Bacillus thuringiensis*				
				Azadiractina A				
				Spinosad	3	3		
RAGNETTO ROSSO	*Tetranychus urticae*	Soglia: presenza di focolai d'infezione.	In serra prediligere la lotta biologica mediante il lancio degli ausiliari Amblyseius andersoni, Amblyseius californicus, Phytoseiulus persimilis. Per Amblyseius andersoni: Preventivamente lanciare 6 individui/m2.	*Acari predatori*			Phytoseiulus persimilis	Massimo 1 trattamento all'anno contro questa avversità
				Beauveria bassiana				
				Sali potassici di acidi grassi				
				Olio essenziale di arancio				
				Maltodestrina				
				Tebufenpirad	1		Ammesso solo in serra	
				Terpenoid blend qrd 460			Ammesso solo in serra	
				Exitiazox				
				Fenazaquin	1		Ammesso solo in serra	
				Abamectina	1		Ammesso solo in serre permanenti.	
				Acequinocil			Ammesso solo in pieno campo	
PERONOSPORA	*Pseudoperonospora cubensis*		Interventi agronomici: In serra favorire l'arieggiamento ed effettuare l'irrigazione con manichetta. Interventi chimici: In pieno campo effettuare i trattamenti in corrispondenza di periodi umidi.	***Prodotti rameici***			Non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di Rame per ettaro nell'arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo applicato di 4 kg di Rame per ettaro all'anno (al raggiungimento di tale limite concorrono anche gli apporti di Rame metallo impiegati per la fertilizzazione)	
				Pythium oligandrum				
				Cymoxanil	2			
				Mandipropamid		2		
				Metalaxil-M	2			
				Azoxystrobin		2	Massimo 2 trattamenti all'anno tra Azoxystrobin, Pyraclostrobin e Trifloxystrobin, indipendentemente dall'avversità	
				Pyraclostrobin				
				Ametoctradina	2		Ammessa solo in pieno campo	
				Fluopicolide	1		Impiegabile esclusivamente in miscela con Propamocarb	
				Propamocarb	1		Quando impiegato da solo è ammesso per irrigazione a goccia e solo in serra	
				Zoxamide	3			
				Cyazofamid				
				Fosetil alluminio				
				Fosfonato di potassio			Ammesso solo in miscela Ammessa solo in pieno campo	

DIFESA Melone 2026 v2								
Note coltura								3/4
Avversità	Nome latino	Criteri di intervento: vincoli	Criteri di intervento: consigli	Sostanza attiva	(1) n. max. interv. per singola s.a. indip. dall'avv.	(2) n. max. interv. per gruppo di s.a. indip. dall'avv.	Limitazioni d'uso e note	Limitazioni d'uso per avversità
OIDIO	*Erysiphe cichoracearum; Sphaerotheca fuliginea*		Interventi agronomici: Coltivare varietà resistenti. Interventi chimici: Quando compaiono i primi sintomi.	*Ampelomyces quisqualis*				
				Bacillus amyloliquefaciens			Ammesso solo in serra	
				Zolfo				
				Bicarbonato di potassio				
				Cerevisane				
				COS-OGA	5			
				Eugenolo			Impiegabili sono nella miscela Eugenolo, Geraniolo e Timolo	
				Geraniolo				
				Timolo				
				Olio essenziale di arancio				
				Laminarina			Ammesso solo in serra	
				Azoxystrobin		2	Massimo 2 trattamenti all'anno tra Azoxystrobin, Pyraclostrobin e Trifloxystrobin, indipendentemente dall'avversità	
				Trifloxystrobin			Massimo 2 trattamenti all'anno tra Azoxystrobin, Pyraclostrobin e Trifloxystrobin, indipendentemente dall'avversità	
				Bupirimate	2			
				Penconazolo		3	Massimo 1 intervento all'anno tra i candidati alla sostituzione, indipendentemente dall'avversità	
				Tebuconazolo				
				Tetraconazolo				
				Difenoconazolo			Massimo 1 intervento all'anno tra i candidati alla sostituzione, indipendentemente dall'avversità. Ammesso su coltura da seme. Ammesso esclusivamente in miscela su coltura da consumo.	
				Cyflufenamid				
				Meptildinocap	1		Impiegabile fino al 30/09/2026.	
				Metrafenone	2			
				Fluxapyroxad	1	2		
SCLEROTINIA	*Sclerotinia spp.*		Interventi agronomici: Impedire i ristagni idrici nel terreno ed effettuare concimazioni equilibrate.	*Trichoderma asperellum*				
				Trichoderma gamsii				
				Trichoderma atroviride				
				Pythium oligandrum				
				Coniothyrium minitans				
ANTRACNOSI DELLE CUCURBITACE	*Colletotrichum lagenarium*		Interventi chimici: Intervenire quando compaiono i primi sintomi	***Prodotti rameici***			Non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di Rame per ettaro nell'arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo applicato di 4 kg di Rame per ettaro all'anno (al raggiungimento di tale limite concorrono anche gli apporti di Rame metallo impiegati per la fertilizzazione)	

DIFESA Melone 2026 v2								
Note coltura								4/4
Avversità	Nome latino	Criteri di intervento: vincoli	Criteri di intervento: consigli	Sostanza attiva	(1) n. max. interv. per singola s.a. indip. dall'avv.	(2) n. max. interv. per gruppo di s.a. indip. dall'avv.	Limitazioni d'uso e note	Limitazioni d'uso per avversità
CANCRO GOMMOSO	*Didymella bryoniae*		Interventi agronomici: Impiego di seme sano o conciato e di varietà resistenti o tolleranti	*Bacillus subtilis*				
				Azoxystrobin		2	Massimo 2 trattamenti all'anno tra Azoxystrobin, Pyraclostrobin e Trifloxystrobin, indipendentemente dall'avversità	
				Fluxapyroxad	1	2		
				Difenoconazolo	1	3	Massimo 1 intervento all'anno tra i candidati alla sostituzione indipendentemente dall'avversità. Impiegabile solo in miscela con altre S.A.	
CLADOSPORIOSI	*Cladosporium cucumerinum*		Interventi chimici: Intervenire quando compaiono i primi sintomi	***Prodotti rameici***			Non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di Rame per ettaro nell'arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo applicato di 4 kg di Rame per ettaro all'anno (al raggiungimento di tale limite concorrono anche gli apporti di Rame metallo impiegati per la fertilizzazione)	
BATTERIOSI			Interventi agronomici: Impiego di seme sano, ampie rotazioni colturali.	***Prodotti rameici***			Non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di Rame per ettaro nell'arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo applicato di 4 kg di Rame per ettaro all'anno (al raggiungimento di tale limite concorrono anche gli apporti di Rame metallo impiegati per la fertilizzazione)	
NEMATODE GALLIGENO				*Paecilomyces lilacinus=Purpureocillium lilacinum*				
				Azadiractina A				
				Geraniolo				
				Timolo				
				Estratto di aglio				