DIFESA Peperone 2026 v2								
Note coltura								1/4
Avversità	Nome latino	Criteri di intervento: vincoli	Criteri di intervento: consigli	Sostanza attiva	(1) n. max. interv. per singola s.a. indip. dall'avv.	(2) n. max. interv. per gruppo di s.a. indip. dall'avv.	Limitazioni d'uso e note	Limitazioni d'uso per avversità
AFIDI	*Aphis gossypii; Macrosiphum euforbiae*	Soglia: presenza generalizzata.	In serra si consiglia il lancio degli ausiliari: Chrysoperla carnea e Aphidius colemani	*Aphidius colemani*				
				Chrysoperla carnea				
				Beauveria bassiana				
				Azadiractina A				
				Maltodestrina				
				Sali potassici di acidi grassi				
				Olio minerale				
				Pirimicarb	1			
				Deltametrina		2	Ammesso 1 interventi con piretroidi.	
				Lambda-cialotrina	1		Ammesso 1 interventi con piretroidi.	
				Piretrine				
				Acetamiprid	1		Non ammesso in serra	
				Flupyradifurone	1		Ammesso con 2 trattamenti in serra	
				Flonicamid	2		Ammesso solo in serra	
				Sulfoxaflor			Impiegabile come da etichetta, fino ad un massimo di 400 ml ha/anno. Ammesso solo in serra	
TRIPIDI	*Thrips tabaci*		In serra si consiglia di installare le trappole cromotropiche per il monitoraggio degli adulti e effettuare la lotta biologica mediante il lancio degli ausiliari Amblyseius cucumeris, Amblyseius swirskii, Orius laevigatus. Soglia: presenza.	Anthocoridae			Orius laevigatus Orius majusculus	Massimo 2 trattamenti all'anno contro questa avversità
				Amblyseius swirskii				
				Beauveria bassiana				
				Paecilomyces spp.			Paecilomyces fumosoroseus	
				Azadiractina A				
				Olio essenziale di arancio				
				Sali potassici di acidi grassi				
				Piretrine		2		
				Spinosad	3	3		
				Terpenoid blend qrd 460			Ammesso solo in serra	
				Cyantraniliprole	1	2	Ammesso solo in serra e solo su colture fuori suolo. Tra Cyantraniliprole e Clorantraniliprole massimo 2 trattamenti all'anno	
				Abamectina	2		Ammessa solo in serra permanenti.	
PIRALIDE	*Ostrinia nubilalis*		In serra si consiglia di installare le reti antinsetto in corrispondenza delle aperture della serra. In pieno campo effettuare il monitoraggio degli adulti con trappole ad innesco feromonico. Impiego di feromoni per la lotta con il metodo della confusione sessuale. Soglia: in presenza di catture.	*Bacillus thuringiensis*				Massimo 2 trattamenti all'anno contro questa avversità
				Deltametrina		2	Ammessi 1 interventi con piretroidi.	
				Lambda-cialotrina	1			
				Spinosad	3	3		
				Emamectina benzoato	2		Ammessi 3 trattamenti in caso di presenza di Tuta absoluta	
				Clorantraniliprole	2			

DIFESA Peperone 2026 v2								
Note coltura								2/4
Avversità	Nome latino	Criteri di intervento: vincoli	Criteri di intervento: consigli	Sostanza attiva	(1) n. max. interv. per singola s.a. indip. dall'avv.	(2) n. max. interv. per gruppo di s.a. indip. dall'avv.	Limitazioni d'uso e note	Limitazioni d'uso per avversità
ALEURODIDI	*Trialeurodes vaporariorum; Bemisia tabaci*	Soglia: 10 stadi giovanili/foglia	In serra si consiglia di installare le trappole cromotropiche per il monitoraggio degli adulti ed effettuare la lotta biologica mediante il lancio di Encarsia formosa, Macrolophus pygmaeus, Eretmocerus mundus, E. eremicus, Amblyseius swirskii	*Eretmocerus mundus*				
				Paecilomyces spp.			Paecilomyces fumosoroseus	
				Beauveria bassiana				
				Azadiractina A				
				Maltodestrina				
				Olio essenziale di arancio				
				Sali potassici di acidi grassi				
				Acetamiprid	1		Non ammesso in serra	
				Sulfoxaflor			Impiegabile come da etichetta, fino ad un massimo di 400ml ha/anno. Ammesso solo in serra.	
				Flupyradifurone	1		Ammesso con 2 trattamenti in serra	
				Pyriproxyfen	1			
				Terpenoid blend qrd 460			Ammesso solo in serra	
				Cyantraniliprole	1	2	Ammesso solo in serra e solo su colture fuori suolo. Tra Cyantraniliprole e Clorantraniliprole massimo 2 trattamenti all'anno.	
				Piretrine		2		
TIGNOLA DEL POMODORO	*Tuta absoluta*	Soglia d'intervento: presenza del fitofago	Interventi meccanici: Utilizzare idonee reti per schermare tutte le aperture delle serre al fine di impedire l'ingresso degli adulti. Interventi biotecnici: Esporre trappole innescate con feromone sessuale per monitorare il volo dei maschi e porre trappole elettrofluorescenti per la cattura massale degli adulti. Metodo della confusione sessuale. Interventi biologici: Salvaguardare l'azione dei nemici naturali, tra i quali risultano efficaci alcuni Eterotteri predatori, Macrolophus caliginosus e Nesidiocoris tenuis e alcuni Imenotteri parassitoidi di uova (Tricogramma spp.). Interventi chimici: Si consiglia di intervenire al manifestarsi delle prime gallerie sulle foglie - Ogni s.a. va ripetuta due volte a distanza di 7-10 giorni	*Bacillus thuringiensis*				
				Azadiractina A				
				Spinosad	3	3		
				Emamectina benzoato	3			
				Clorantraniliprole	2			
				Tebufenozide		2	Ammesso solo in serra	
NOTTUE FOGLIARI	*Autographa gamma; Spodoptera littoralis; Spodoptera exigua; Helycoverpa armigera; Mamestra brassicae*	Soglia: Presenza generalizzata.		*Bacillus thuringiensis*				
				Spodoptera littoralis Nucleopoliedrovirus (SpliNPV)				
				Helicoverpa armigera NPV				
				Spinosad	3	3		
				Lambda-cialotrina	1	2	Ammesso 1 interventi con piretroidi.	
				Tebufenozide		2	Ammesso in serra	
				Clorantraniliprole	2			
ELATERIDI				*Beauveria bassiana*				

DIFESA Peperone 2026 v2								
Note coltura								3/4
Avversità	Nome latino	Criteri di intervento: vincoli	Criteri di intervento: consigli	Sostanza attiva	(1) n. max. interv. per singola s.a. indip. dall'avv.	(2) n. max. interv. per gruppo di s.a. indip. dall'avv.	Limitazioni d'uso e note	Limitazioni d'uso per avversità
ACARI	*Polyphagotarsonemus latus*		Interventi agronomici: Allontanare e distruggere le prime piante colpite	*Sali potassici di acidi grassi*				
				Maltodestrina				
				Olio essenziale di arancio				
RAGNETTO ROSSO	*Tetranychus urticae*		In serra si consiglia il lancio di ausiliari: Amblyseius andersoni, Amblyseius californicus, Phytoseiulus persimilis. Soglia: presenza generalizzata. Per Amblyseius andersoni: preventivamente lanciare 6 individui/m2. Per Amblyseius californicus: preventivamente lanciare 4-10 individui/m2.	*Amblyseius andersoni*				Massimo 1 trattamento all'anno contro questa avversità
				Amblyseius californicus				
				Acari predatori			Phytoseiulus persimilis	
				Beauveria bassiana				
				Maltodestrina				
				Olio minerale				
				Sali potassici di acidi grassi				
				Olio essenziale di arancio				
				Exitiazox				
				Pyridaben			Ammesso solo in serra	
				Fenpiroximate				
				Terpenoid blend qrd 460			Ammesso solo in serra	
				Abamectina	2		Ammesso solo in serre permanenti.	
OIDIO				*Ampelomyces quisqualis*				
				Bacillus amyloliquefaciens	6			
				Bicarbonato di potassio	6			
				Zolfo				
				Eugenolo				
				Geraniolo				
				Timolo				
				COS-OGA	5			
				Laminarina			Ammesso solo in serra	
				Tetraconazolo		2		
				Penconazolo				
				Boscalid		2		
				Pyraclostrobin		2	In pieno campo impiegabile solo in miscela con Boscalid	
				Azoxystrobin				
				Trifloxystrobin				
				Ciflufenamid	2			
				Metrafenone	2			
BOTRITE	*Botrytis cinerea*			*Bacillus subtilis*				
				Bacillus amyloliquefaciens				
				Pythium oligandrum				
				Saccharomyces cerevisiae				
				Eugenolo				
				Geraniolo				
				Timolo				
				Laminarina			Ammesso solo in serra	

DIFESA Peperone 2026 v2								
Note coltura								4/4
Avversità	Nome latino	Criteri di intervento: vincoli	Criteri di intervento: consigli	Sostanza attiva	(1) n. max. interv. per singola s.a. indip. dall'avv.	(2) n. max. interv. per gruppo di s.a. indip. dall'avv.	Limitazioni d'uso e note	Limitazioni d'uso per avversità
CANCRENA PEDALE	*Phytophthora capsici*		Impiegare seme sano, acqua irrigua non contaminata e varietà tolleranti o resistenti, effettuare ampi avvicendamenti colturali.	*Trichoderma asperellum*				Massimo 1 trattamento all'anno contro questa avversità
				Trichoderma gamsii				
				Trichoderma atroviride				
				Prodotti rameici			Non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di Rame per ettaro nell'arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo applicato di 4 kg di Rame per ettaro all'anno (al raggiungimento di tale limite concorrono anche gli apporti di Rame metallo impiegati per la fertilizzazione).	
				Propamocarb			Solo per irrigazione a goccia	
				Metalaxil-M		1		
BATTERIOSI				***Prodotti rameici***			Non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di Rame per ettaro nell'arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo applicato di 4 kg di Rame per ettaro all'anno (al raggiungimento di tale limite concorrono anche gli apporti di Rame metallo impiegati per la fertilizzazione)	
				Bacillus amyloliquefaciens				
				Bacillus subtilis				
NEMATODE GALLIGENO				*Paecilomyces lilacinus=Purpureocillium lilacinum*				
				Estratto di aglio				
				Geraniolo				
				Timolo				
				Azadiractina A				