

DIFESA Porro 2026 v2								
Note coltura								1/1
Avversità	Nome latino	Criteri di intervento: vincoli	Criteri di intervento: consigli	Sostanza attiva	(1) n. max. interv. per singola s.a. indip. dall'avv.	(2) n. max. interv. per gruppo di s.a. indip. dall'avv.	Limitazioni d'uso e note	Limitazioni d'uso per avversità
AFIDI				<i>Sali potassici di acidi grassi</i>				
				<i>Azadiractina A</i>				
MOSC A	<i>Delia antiqua</i>	Soglia: inizio infestazione		Deltametrina		2		
NOTTUE TERRICOLE	<i>Agrotis spp.</i>		Soglia: infestazione diffusa	Deltametrina		2		
RAGNETTO ROSSO	<i>Tetranychus urticae</i>			<i>Sali potassici di acidi grassi</i>				
				<i>Maltodestrina</i>				
TRIPIDI	<i>Thrips tabaci</i>		Soglia: inizio infestazione	<i>Beauveria bassiana</i>			Ammesso solo in pieno campo	
				<i>Olio essenziale di arancio</i>				
				<i>Sali potassici di acidi grassi</i>				
				<i>Azadiractina A</i>				
				Spinosad	3	3		
				Deltametrina		2		
				Lambda-cialotrina	1			
PERONOSPORA			Interventi agronomici: Limitare le concimazioni azotate, assicurare un buon drenaggio del terreno, limitare l'uso dell'acqua irrigua, impiegare materiale di propagazione sano, raccogliere e distruggere le piante colpite. Interventi chimici: con piogge ripetute ed elevata umidità relativa.	Prodotti rameici			Non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di Rame per ettaro nell'arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo applicato di 4 kg di Rame per ettaro all'anno (al raggiungimento di tale limite concorrono anche gli apporti di Rame metallo impiegati per la fertilizzazione)	
				Azoxystrobin	2	3		
				Pyraclostrobin			Ammesso solo in pieno campo.	
				Cymoxanil	3			
BOTRITE	<i>Botrytis squamosa; Botrytis allii</i>		Alla comparsa dei primi sintomi	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i>				
				Boscalid	2		Ammessa solo la miscela Boscalid + Pyraclostrobin	
				Pyraclostrobin		2	Ammessa solo la miscela Boscalid + Pyraclostrobin. Tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin massimo 3 interventi all'anno, indipendentemente dall'avversità	
RUGGINE	<i>Puccinia porri</i>		Interventi chimici: quando compaiono le prime pustole	Prodotti rameici			Non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di Rame per ettaro nell'arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo applicato di 4 kg di Rame per ettaro all'anno (al raggiungimento di tale limite concorrono anche gli apporti di Rame metallo impiegati per la fertilizzazione)	
				Azoxystrobin	2	3	Tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin massimo 3 interventi all'anno, indipendentemente dall'avversità	
				Benzovindiflupyr	1			
ALTERNARIA				Prodotti rameici			Non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di Rame per ettaro nell'arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo applicato di 4 kg di Rame per ettaro all'anno (al raggiungimento di tale limite concorrono anche gli apporti di Rame metallo impiegati per la fertilizzazione)	
MARCUMI RADICALI	<i>Pythium spp.; Rhizoctonia spp.</i>			<i>Trichoderma asperellum</i>				
				<i>Trichoderma harzianum</i>				
LUMACHE, CHIOCCIOLE, LIMACCE				<i>Fosfato ferrico</i>				