

DIFESA Ravanello 2026 v2								
Note coltura								1/1
Avversità	Nome latino	Criteri di intervento: vincoli	Criteri di intervento: consigli	Sostanza attiva	(1) n. max. interv. per singola s.a. indip. dall'avv.	(2) n. max. interv. per gruppo di s.a. indip. dall'avv.	Limitazioni d'uso e note	Limitazioni d'uso per avversità
AFIDI				Maltodestrina				
				Azadiractina A				
				Sali potassici di acidi grassi				
ALTICA	Phyllotret a spp.		Soglia: inizio infestazione	Deltametrina		2	Non ammesso in serra	
MOSCA DEL CAVOLO	Delia radicum							
NOTTUE FOGLIARI	Autographa gamma; Mamestra brassicae			Azadiractina A				
				Clorantranilprole				
PERONOSPORA	Peronospora brassicae		Interventi agronomici: Adottare ampi avvicendamenti colturali, impiegare seme sano, distruggere le piante colpite. Interventi chimici: In caso di attacchi precoci.	Prodotti rameici			Non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di Rame per ettaro nell'arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo applicato di 4 kg di Rame per ettaro all'anno (al raggiungimento di tale limite concorrono anche gli apporti di Rame metallo impiegati per la fertilizzazione)	
				Olio essenziale di arancio				
				Mandipropamid				
SCLEROTINIA				Bacillus amyloliquefaciens				
				Bacillus subtilis				
				Fluxapyroxad	1	2	Ammesso solo in pieno campo	
				Protioconazolo	2		Impiego ammesso esclusivamente per colture da seme. Ammesso solo per Sclerotinia sclerotiorum.	
ALTERNARIOSI	Alternaria raphani		Interventi agronomici: Adottare ampi avvicendamenti colturali, impiegare seme sano, distruggere le piante colpite	Prodotti rameici			Non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di Rame per ettaro nell'arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo applicato di 4 kg di Rame per ettaro all'anno (al raggiungimento di tale limite concorrono anche gli apporti di Rame metallo impiegati per la fertilizzazione)	
				Fluxapyroxad	2		Ammesso solo in pieno campo	
				Difenoconazolo	1		Ammessa esclusivamente la miscela Fluxapyroxad + Difeconazolo	
				Azoxystrobin		2	Ammesso solo in pieno campo	
MORIA DELLE PIANTINE	Pythium spp.			Trichoderma atroviride				
LUMACHE, CHIOCCIOLE, LIMACCE			Soglia: infestazione diffusa	Metaldeide esca				
				Fosfato ferrico				