

Scelta dell'ambiente di coltivazione e vocazionalità	Nessun vincolo specifico fatto salvo quanto previsto nella "Parte generale"																			
Mantenimento dell'agroecosistema naturale	Nessun vincolo specifico fatto salvo quanto previsto nella "Parte generale"																			
Scelta varietale e materiale di moltiplicazione	Per le cime di rapa si ricorda che la differenza tra le varietà si basa soprattutto sulla durata del ciclo colturale e sullo sviluppo delle piante che, di regola, è maggiore in quelle più tardive. Le varietà fanno capo a ecotipi la cui denominazione ricorda la località di coltivazione (Cima di rapa di Castrovillari) e la lunghezza del ciclo (Natalina, Marzatica) oppure combinazioni tra i due caratteri (Tardiva di Fasano, Aprile di Carovigno). Varietà di <u>ravanello</u> consigliate per la Regione Marche <table><tr><td>Corox</td></tr><tr><td>Girox</td></tr><tr><td>Janox</td></tr><tr><td>Pico</td></tr><tr><td>Rudolf</td></tr><tr><td>Saxa</td></tr></table>					Corox	Girox	Janox	Pico	Rudolf	Saxa									
Corox																				
Girox																				
Janox																				
Pico																				
Rudolf																				
Saxa																				
Sistemazione e preparazione del suolo	Nessun vincolo specifico fatto salvo quanto previsto nella "Parte generale" ⇒ Non sono ammessi interventi di sterilizzazione chimica del suolo.																			
Avvicendamento colturale	Si faccia riferimento alla parte generale ⇒ Non sono ammessi interventi di sterilizzazione chimica del suolo. ⇒ Non è ammesso il ristoppio ⇒ Il ravanello può tornare sullo stesso appezzamento dopo due cicli di altre colture (anche in serra) ⇒ Se in coltura principale il ravanello è da considerarsi da rinnovo mentre se in piccole superfici, come intercalare. ⇒ Non sono ammesse rotazioni con altre crucifere																			
Semina, trapianto, impianto	Si consiglia di fare riferimento alle seguenti indicazioni: Il sesto d’impianto non può prescindere dalla tipologia del terreno e delle caratteristiche varietali. Si rimanda alla tabella seguente per i consigli circa le distanze e le densità d’impianto <table><tr><th rowspan="2">Epoca di semina</th><th colspan="2">Distanza (cm)</th><th rowspan="2">Densità (n.piante/ha)</th><th rowspan="2">Profondità di semina (cm)</th><th rowspan="2">Quantità di seme (kg/ha)</th></tr><tr><th>Tra le file</th><th>Sulla fila</th></tr><tr><td>Fine settembre – inizio ottobre</td><td rowspan="2">10-15</td><td rowspan="2">3-4</td><td rowspan="2">2.0 – 3.0 milioni</td><td rowspan="2">1-2</td><td rowspan="2">4-8 con semina manuale 2-3 con semina meccanica</td></tr><tr><td>Fine febbraio – primi di marzo</td></tr></table>					Epoca di semina	Distanza (cm)		Densità (n.piante/ha)	Profondità di semina (cm)	Quantità di seme (kg/ha)	Tra le file	Sulla fila	Fine settembre – inizio ottobre	10-15	3-4	2.0 – 3.0 milioni	1-2	4-8 con semina manuale 2-3 con semina meccanica	Fine febbraio – primi di marzo
Epoca di semina	Distanza (cm)		Densità (n.piante/ha)	Profondità di semina (cm)	Quantità di seme (kg/ha)															
	Tra le file	Sulla fila																		
Fine settembre – inizio ottobre	10-15	3-4	2.0 – 3.0 milioni	1-2	4-8 con semina manuale 2-3 con semina meccanica															
Fine febbraio – primi di marzo																				
Gestione del suolo e pratiche agronomiche per il controllo delle infestanti	Nessun vincolo specifico fatto salvo quanto previsto nella "Parte generale"																			
Gestione della pianta e della fruttificazione	Si rimanda a quanto normato dal disciplinare per la produzione integrata delle colture parte difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti																			
Irrigazione	Si rimanda alle indicazioni contenute nella Parte Generale. ⇒ Non è ammessa l'irrigazione per scorrimento																			

	Volume massimo di irrigazione (mm).														
		A R G I L L A %													
		10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	
S A B B I A	0	34	35	35	35	36	36	36	37	37	37	37	38	38	
	5	33	34	34	35	35	36	36	37	37	38	38	39	39	
	10	32	32	33	33	34	34	35	35	36	36	37	37	38	
	15	30	31	31	32	32	33	33	34	34	35	35	36	36	
	20	29	29	30	30	31	31	32	32	33	33	34	34	35	
	25	27	28	28	29	29	30	30	31	31	32	32	33	33	
	30	26	26	27	27	28	28	29	29	30	30	31	31	32	
	35	24	25	25	26	26	27	27	28	28	29	29	30	--	
	40	23	23	24	24	25	25	26	26	27	27	28	--	--	
	%	45	21	22	22	23	23	24	24	25	25	26	--	--	--
	50	20	20	21	21	22	22	23	23	24	--	--	--	--	
	55	18	19	19	20	20	21	21	22	--	--	--	--	--	
	60	17	17	18	18	19	19	20	--	--	--	--	--	--	
	65	15	16	16	17	17	18	--	--	--	--	--	--	--	
	70	14	14	15	15	16	--	--	--	--	--	--	--	--	

Fertilizzazione	Si faccia riferimento a quanto indicato nella "Parte generale".																
	⇒ Si devono rispettare le epoche di distribuzione dell'elemento N frazionandolo in presemina e in copertura																
	⇒ Si devono rispettare le epoche di distribuzione di P ₂ O ₅ e K ₂ O secondo la tabella seguente																
	<table><tr><td>Dotazione del terreno</td><td>Elemento</td><td>Epoca di distribuzione</td></tr><tr><td rowspan="2">Bassa</td><td>P₂O₅</td><td>Pre-semina</td></tr><tr><td>K₂O</td><td>Pre-semina</td></tr><tr><td rowspan="2">Normale</td><td>P₂O₅</td><td>Pre-semina</td></tr><tr><td>K₂O</td><td>Pre-semina</td></tr><tr><td>Elevata</td><td>P₂O₅ e K₂O</td><td>Non sono ammessi apporti</td></tr></table>	Dotazione del terreno	Elemento	Epoca di distribuzione	Bassa	P ₂ O ₅	Pre-semina	K ₂ O	Pre-semina	Normale	P ₂ O ₅	Pre-semina	K ₂ O	Pre-semina	Elevata	P ₂ O ₅ e K ₂ O	Non sono ammessi apporti
	Dotazione del terreno	Elemento	Epoca di distribuzione														
	Bassa	P ₂ O ₅	Pre-semina														
		K ₂ O	Pre-semina														
Normale	P ₂ O ₅	Pre-semina															
	K ₂ O	Pre-semina															
Elevata	P ₂ O ₅ e K ₂ O	Non sono ammessi apporti															

Uso del marchio SQNPI e/o del marchio QM	Si faccia riferimento a quanto indicato nella "Parte generale".
--	---

Raccolta e post - raccolta	Si faccia riferimento a quanto indicato nella "Parte generale".
----------------------------	---

RAVANELLO – CONCIMAZIONE AZOTO

Note decrementi		Note incrementi
Quantitativo di AZOTO da sottrarre (-) alla dose standard in funzione delle diverse condizioni: (barrare le opzioni adottate)	Apporto di AZOTO standard in situazione normale per una produzione di: 25-35 t/ha: DOSE STANDARD: 80 kg/ha di N	Quantitativo di AZOTO che potrà essere aggiunto (+) alla dose standard in funzione delle diverse condizioni. Il quantitativo massimo che l'agricoltore potrà aggiungere alla dose standard anche al verificarsi di tutte le situazioni è di: 25 kg/ha: (barrare le opzioni adottate)
☐ 20 kg: se si prevedono produzioni inferiori 25 t/ha; ☐ 20 kg: in caso di apporto di ammendante alla precessione; ☐ 20 kg: in caso di elevata dotazione di sostanza organica; ☐ 15 kg: in caso di successione a leguminosa annuale.		☐ 20 kg: se si prevedono produzioni superiori a 35 t/ha; ☐ 20 kg: in caso di scarsa dotazione di sostanza organica; ☐ 30 kg: in caso di successione ad un cereale con paglia interrata; ☐ 15 kg: in caso di forte lisciviazione dovuta a surplus pluviometrico in specifici periodi dell'anno (es. pioggia superiore a 300 mm nel periodo dal 1 ottobre al 28 febbraio); ☐ 20 kg: in caso di forti escursioni termiche e precipitazioni anomale durante la coltivazione (dati bollettino).

RAVANELLO – CONCIMAZIONE FOSFORO

Note decrementi		Note incrementi
Quantitativo di P₂O₅ da sottrarre (-) alla dose standard: (barrare le opzioni adottate)	Apporto di P₂O₅ standard in situazione normale per una produzione di: 25-35 t/ha: DOSE STANDARD	Quantitativo di P₂O₅ che potrà essere aggiunto (+) alla dose standard: (barrare le opzioni adottate)
☐ 10 kg: se si prevedono produzioni inferiori a 25 t/ha; ☐ 10 kg: in caso di apporto di ammendante alla precessione.	60 kg/ha: in caso di terreni con dotazione normale; 100 kg/ha: in caso di terreni con dotazione scarsa; 40 kg/ha: in caso di terreni con dotazione elevata.	☐ 10 kg: se si prevedono produzioni superiori a 35 t/ha; ☐ 10 kg: in caso di basso tenore di sostanza organica nel suolo; ☐ 20 kg: per semine effettuate prima del 10 aprile.

RAVANELLO – CONCIMAZIONE POTASSIO

Note decrementi		Note incrementi
Quantitativo di K₂O da sottrarre (-) alla dose standard: (barrare le opzioni adottate)	Apporto di K₂O standard in situazione normale per una produzione di: 25-35 t/ha: DOSE STANDARD	Quantitativo di K₂O che potrà essere aggiunto (+) alla dose standard: (barrare le opzioni adottate)
☐ 20 Kg: se si prevedono produzioni inferiori a 25 t/ha; ☐ 30 kg: in caso di apporto di ammendante alla precessione.	90 Kg/ha: in caso di terreni con dotazione normale; 120 Kg/ha: in caso di terreni con dotazione scarsa; 60 Kg/ha: in caso di terreni con dotazione elevata.	☐ 20 Kg: se si prevedono produzioni superiori a 35 t/ha.