DIFESA Zucca 2026 v2								
Note coltura								1/2
Avversità	Nome latino	Criteri di intervento: vincoli	Criteri di intervento: consigli	Sostanza attiva	(1) n. max. interv. per singola s.a. indip. dall'avv.	(2) n. max. interv. per gruppo di s.a. indip. dall'avv.	Limitazioni d'uso e note	Limitazioni d'uso per avversità
AFIDI	*Aphis gossypii*		Intervento chimico: Infestazioni generalizzate o focolai.	*Beauveria bassiana*				
				Azadiractina A				
				Maltodestrina				
				Sali potassici di acidi grassi				
				Piretrine				
				Flonicamid	2			
				Acetamiprid	1			
				Sulfoxaflor			Impiegabile come da etichetta, fino ad un massimo di 400 ml ha/anno. Ammesso solo in serra	
RAGNETTO ROSSO	*Tetranychus urticae*		Interventi biologici: Soglia: Presenza. Introdurre con uno o due lanci, in relazione al livello di infestazione, 8-12 predatori per mq. Distanziare il lancio di almeno 10 giorni dall'eventuale trattamento aficida. Interventi chimici: Da effettuarsi in presenza di infestazione generalizzata o focolai.	*Beauveria bassiana*				Al massimo 2 interventi all'anno contro questa avversità
				Sali potassici di acidi grassi				
				Olio essenziale di arancio				
				Maltodestrina				
				Exitiazox				
				Abamectina	2		Ammessa solo in serra permanente.	
				Acequinocil			Ammesso solo in pieno campo	
ALEURODIDI	*Trialeurodes vaporariorum*		Soglia di intervento: Presenza consistente.	*Azadiractina A*				
				Maltodestrina				
				Paecilomyces spp.			Paecilomyces fumosoroseus	
				Beauveria bassiana				
				Olio essenziale di arancio				
				Sali potassici di acidi grassi				
				Sulfoxaflor			Impiegabile come da etichetta, fino ad un massimo di 400 ml ha/anno. Ammesso solo in serra	
OIDIO	*Sphaerotheca fuliginea*		Interventi agronomici: Distruggere i residui della coltura infetti - Sconsigliata l'irrigazione per aspersione. Interventi chimici: Intervenire ai primi sintomi o in caso di condizioni climatiche favorevoli alla malattia.	*Bacillus amyloliquefaciens*				
				Bicarbonato di potassio				
				Zolfo				
				Eugenolo			Impiegabili solo formulati contenenti Eugenolo, Geraniolo e Timolo	
				Geraniolo				
				Timolo				
				COS-OGA	5		Ammesso solo in serra	
				Estratto acquoso dei semi germinati di Lupinus albus dolce				
				Cerevisane				
				Laminarina			Ammesso solo in serra	
				Olio essenziale di arancio				
				Azoxystrobin				
				Trifloxystrobin		2	Amessa esclusivamente la miscela fra Trifloxystrobin+ Tebuconazolo	
				Tebuconazolo	1	2	Massimo 1 intervento all'anno tra i candidati alla sostituzione (Tebuconazolo, Difenoconazolo). Ammessa esclusivamente la miscela fra Trifloxystrobin+ Tebuconazolo.	
				Difenoconazolo	1		Massimo 1 intervento all'anno tra i candidati alla sostituzione (Tebuconazolo, Difenoconazolo).	
				Penconazolo				
				Fluxapyroxad	2			
				Bupirimate	2			
				Cyflufenamid	2			

DIFESA Zucca 2026 v2								
Note coltura								2/2
Avversità	Nome latino	Criteri di intervento: vincoli	Criteri di intervento: consigli	Sostanza attiva	(1) n. max. interv. per singola s.a. indip. dall'avv.	(2) n. max. interv. per gruppo di s.a. indip. dall'avv.	Limitazioni d'uso e note	Limitazioni d'uso per avversità
PERONOSPORA	*Pseudoperonospora cubensis*		Interventi agronomici: Distruggere i residui della coltura infetti - Sconsigliata l'irrigazione per aspersione. Interventi chimici: Intervenire ai primi sintomi o in caso di condizioni climatiche favorevoli alla malattia.	***Prodotti rameici***			Non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di Rame per ettaro nell'arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo applicato di 4 kg di Rame per ettaro all'anno (al raggiungimento di tale limite concorrono anche gli apporti di Rame metallo impiegati per la fertilizzazione)	
				Azoxystrobin		2		
				Mandipropamid		2		
				Ametoctradina	2		Ammessa solo in pieno campo	
				Cyazofamid	3			
				Zoxamide	3			
				Propamocarb	1			
				Cymoxanil	3			
				Fosfonato di potassio			Ammesso solo in miscela	
MARCIUMI BASALI	*Sclerotinia sclerotiorum*		Interventi agronomici: Ampie rotazioni - Raccolta e distruzione dei residui infetti - Accurato drenaggio - Concimazioni equilibrate - Evitare sesti d'impianto troppo fitti	*Trichoderma spp.*				
				Pythium oligandrum				
				Coniothyrium minitans				
MORIA DELLE PIANTINE			Interventi con prodotti microbiologici: In presenza di sintomi	*Trichoderma spp.*				
BATTERIOSI			Interventi agronomici: -Impiego di seme sano - Ampi avvicendamenti (almeno 4 anni) - Concimazioni potassiche e azotate equilibrate - Eliminazione della vegetazione infetta, che non va comunque interrata - Evitare di irrigare per aspersione - E' sconsigliato irrigare con acque provenienti da canali e bacini di raccolta i cui fondali non vengano periodicamente ripuliti da residui organici. Interventi chimici: Da effettuare dopo le operazioni colturali che possono causare ferite alle piante.	***Prodotti rameici***			Non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di Rame per ettaro nell'arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo applicato di 4 kg di Rame per ettaro all'anno (al raggiungimento di tale limite concorrono anche gli apporti di Rame metallo impiegati per la fertilizzazione)	
NEMATODE GALLIGENO				*Estratto di aglio*				
				Paecilomyces lilacinus=Purpureocillium lilacinum				
				Geraniolo				
				Timolo				