

Note coltura									1/2		
Avversità	Nome latino	Criteri di intervento: vincoli	Criteri di intervento: consigli	Sostanza attiva	(1) n. max. interv. per singola s.a. indip. dall'avv.	(2) n. max. interv. per gruppo di s.a. indip. dall'avv.	Limitazioni d'uso e note	Limitazioni d'uso per avversità			
AFIDE DEI CEREALI											
CARBONE NUO DELL'ORZO	<i>Metopolophium dirhodum; altri; Rhopalosiphum padi; Schizaphis graminum; Sitobion avenae</i>	<i>Ustilago nuda</i>	Effettuare semine tardive, non troppo fitte e limitare la concimazione azotata		Piretrine			Non sono ammessi interventi con sostanze di sintesi contro questa avversità			
FUSARIOSI DEI CEREALI	<i>Fusarium spp.</i>	Si consiglia l'impiego di seme conciato						Non sono ammessi interventi con sostanze di sintesi contro questa avversità			
OIDIO DEL FRUMENTO	<i>Blumeria graminis</i>	Intervento ammesso solo su varietà sensibili.	Si consiglia l'impiego di seme conciato	Protoconazolo					Ammesso 1 unico trattamento con i candidati alla sostituzione		
RUGGINE BRUNA	<i>Puccinia hordei</i>			Tebuconazolo	1						
NERUME DEI CEREALI	<i>Cladosporium sp.; Alternaria sp.; Epicoccum sp.</i>	Si consiglia l'impiego di seme conciato.						Non sono ammessi interventi con sostanze di sintesi contro questa avversità			
		Si consiglia l'impiego di seme conciato						Non sono ammessi interventi con sostanze di sintesi contro questa avversità			
		Si consiglia l'impiego di seme conciato						Non sono ammessi interventi con sostanze di sintesi contro questa avversità			

Note cultura								2/2
Avversità	Criteri di intervento: vincoli	Criteri di intervento: consigli	Sostanza attiva			Limitazioni d'uso e note	Limitazioni d'uso per avversità	
ELMINTOSPORIOSI DELL'ORZO (MACCHIE RETICOLATE, MACULATURA E STRIATURA FOGLIARE)	<i>Pyrenophora graminea</i> (sinonimi: <i>Drechslera graminea</i> , <i>Helminthosporium gramineum</i>); <i>Pyrenophora teres</i> (sinonimi: <i>Drechslera teres</i> , <i>Helminthosporium teres</i>); <i>Bipolaris sorokiniana</i> (sinonimi <i>Cochliobolus sativus</i> , <i>Drechslera sorokiniana</i> , <i>Helminthosporium sativum</i>)	Nome latino	Si consiglia l'impiego di seme conciato. Evitare i ristoppi, impiegare varietà resistenti, semine ritardate, concimazioni azotate equilibrate.	<i>Laminaria</i>	(1) n. max. interv. per singola s.a. indip. dall'avv.	(2) n. max. interv. per gruppo di s.a. indip. dall'avv.		Non sono ammessi interventi con sostanze di sintesi contro questa avversità
RINCOSPORIOSI DELL'ORZO		Si consiglia l'impiego di seme conciato						Non sono ammessi interventi con sostanze di sintesi contro questa avversità