

Note coltura									1/2	
Avversità	Nome latino	Criteri di intervento: vincoli	Criteri di intervento: consigli	Sostanza attiva	(1) n. max. interv. per singola s.a. indip. dall'avv.	(2) n. max. interv. per gruppo di s.a. indip. dall'avv.	Limitazioni d'uso e note		Limitazioni d'uso per avversità	
AFIDI	<i>Aphis fabae; Myzus persicae</i>	Intervenire in caso di presenza		<i>Azadiractina A</i>						
				<i>Maltodestrina</i>						
				<i>Sali potassici di acidi grassi</i>						
				<i>Piretrine</i>						
				<i>Lambda-cialotrina</i>	2	4	Non ammesso in serra. Ammesso massimo 3 trattamenti con piretroidi.			
				<i>Acetamiprid</i>	2	2	Ammesso in pieno campo. Massimo 1 trattamento per ciclo			
NOTTUE FOGLIARI	<i>Spodoptera spp; Helicoverpa armigera; Autographa gamma; Manduca brassicae</i>	Intervenire in caso di presenza di focolai		<i>Bacillus thuringiensis</i>					Massimo 2 trattamenti nell'arco del ciclo colturale contro queste avversità.	
				<i>Spinosad</i>			Ammesso solo in pieno campo			
				<i>Spinetoram</i>	2	3	Ammesso per <i>Heliothis armigera</i> , <i>Spodoptera littoralis</i> . Impiegabile fino al 30/12/2025			
				<i>Clorantraniliprole</i>	2	2				
				<i>Lambda-cialotrina</i>	2	4	Non ammesso in serra. Ammesso massimo 3 trattamenti con piretroidi.			
				<i>Etofenprox</i>	1		Ammesso massimo 3 trattamenti con piretroidi.			
MOSCA MINATRICE	<i>Liriomyza spp.</i>	Intervenire in caso di presenza di focolai	Interventi chimici: Se si riscontrano mine o punture di alimentazione e/o ovideposizione	<i>Azadiractina A</i>						
				<i>Piretrine</i>		4				
				<i>Acetamiprid</i>	1	2	Ammesso in pieno campo			
ALTICHE	<i>Phylloptreta spp</i>									
CERCOSPORA	<i>Cercospora beticola</i>		Interventi agronomici: Effettuare ampi avvicedimenti colturali, eliminare la vegetazione colpita. Interventi chimici: Quando compaiono le prime pustole sulle foglie, successivamente cadenzare trattamenti ogni 10-15 gironi in relazione all'andamento climatico stagionale	<i>Prodotti rameici</i>			Non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di Rame per ettaro nell'arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo applicato di 4 kg di Rame per ettaro all'anno (al raggiungimento di tale limite concorrono anche gli apporti di Rame metallo impiegati per la fertilizzazione)			
				<i>Difenoconazolo</i>	1					
PERONOSPORA	<i>Peronospora farinosa f.; Peronospora parasitica</i>		Interventi agronomici: Effettuare ampi avvicedimenti colturali. Interventi chimici: Trattare alla comparsa dei primi sintomi	<i>Prodotti rameici</i>			Non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di Rame per ettaro nell'arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo applicato di 4 kg di Rame per ettaro all'anno (al raggiungimento di tale limite concorrono anche gli apporti di Rame metallo impiegati per la fertilizzazione)			
				<i>Laminaria</i>						
				<i>Mandipropamid</i>	2	3	Ammesso solo in pieno campo. Massimo 1 trattamento per ciclo			
				<i>Ametoctradina</i>	2		Ammessa solo in pieno campo.			
				<i>Pyraclostrobin</i>		2				
				<i>Fosfonato di potassio</i>			Ammesso solo in miscela. Ammesso solo in pieno campo.			

DIFESA Bietola da coste e da foglie 2025 v2									2/2				
Note coltura													
Avversità	Nome latino	Criteri di intervento: vincoli	Criteri di intervento: consigli	Sostanza attiva	(1) n. max. interv. per singola s.a. indip. dall'avv.	(2) n. max. interv. per gruppo di s.a. indip. dall'avv.	Limitazioni d'uso e note		Limitazioni d'uso per avversità				
MUFFA GRIGIA	<i>Botrytis cinerea</i>	Interventi agronomici: Evitare ristagni idrici riducendo allo stretto necessario le irrigazioni. Interventi chimici: Da eseguire tempestivamente	Intervenire quando compaiono i primi sintomi	<i>Pythium oligandrum</i>									
OIDIO E ALTERNARIA	<i>Erysiphe betae; Alternaria spp.</i>			<i>Penthiopyrad</i>									
RIZOCTONIA	<i>Rhizoctonia spp.</i>			<i>Boscalid</i>		1							
MORIA DELLE PIAINTINE	<i>Rhizyhum spp.</i>			<i>Isofetamid</i>	1		Ammesso solo in serra						
SCLEROTINIA	<i>Sclerotinia spp.</i>			<i>Pyraclostrobin</i>		2	Ammesso solo in miscela con Boscalid						
LUMACHE, CHIOTCIOLE, LIMACCE	Soglia: Presenza generalizzata			<i>Zolfo</i>									
RODITORI				<i>Olio essenziale di arancio dolce</i>			Ammesso solo su Oidio						
				<i>Pseudomonas spp.</i>									
				<i>Trichoderma asperellum</i>									
				<i>Pythium oligandrum</i>									
				<i>Coniothyrium minitans</i>									
				<i>Trichoderma asperellum</i>									
				<i>Trichoderma gamsii</i>									
				<i>Fluxapyroxad</i>	1	1							
				<i>Isofetamid</i>	1		Ammesso solo in serra						
				<i>Fosfato ferrico</i>									
				<i>Metaldeide esca</i>									