

Note cultura									1/2	
Aversità	Nome latino	Criteri di intervento: vincoli	Criteri di intervento: consigli	Sostanza attiva	(1) n. max. interv. per singola s.a. indip. dall'avv.	(2) n. max. interv. per gruppo di s.a. indip. dall'avv.	Limitazioni d'uso e note		Limitazioni d'uso per avversità	
MOSCA	<i>Psila rosae</i>	Interventi chimici: Limitatamente su colture seminate in primavera nelle zone dove sono ricorrenti le infestazioni.	Effettuare il monitoraggio degli adulti mediante trappole attrattive di colore giallo. Interventi agronomici: Ritardare le semine di luglio, dopo il volo degli adulti.	Deltametrina	1	2	Ammesso massimo 1 trattamento all'anno con piretroidi.			
AFIDI ELATERIDI	<i>Semniphis dauci</i> <i>Agriotes spp.</i>	Soglia: Presenza accertata Geodisinfestazione localizzata previa accertata presenza dei parassiti		<i>Salic potassici di acidi grassi</i>					Massimo 1 trattamento all'anno contro questa avversità	
				<i>Azadiractina A</i>						
				<i>Maltodestrina</i>						
				Deltametrina	1	2	Ammesso massimo 1 trattamento all'anno con piretroidi.			
				<i>Lambda-cialotrina</i>	1		Non impiegabile in serra Ammesso massimo 1 trattamento all'anno con piretroidi.			
				<i>Tau-fluvalinate</i>			Ammesso massimo 1 trattamento all'anno con piretroidi.			
NOTTUE FOGLIARI	<i>Autographa gamma</i>			Piretrine					Intervento localizzato lungo la fila di semina. I trattamenti geodisinfestanti granulari a base di piretroidi non sono da considerarsi nel limite numerico dei trattamenti fogliari con le stesse s.a.	
				Teflutrin						
MINATORI FOGLIARI	<i>Liriomyza trifolii</i>			<i>Lambda-cialotrina</i>			Non impiegabile in serra			
				<i>Diglyphus Isaea</i>						
MAL DEL PIEDE	<i>Phoma betae</i>			<i>Azadiractina A</i>						
				<i>Trichoderma asperellum</i>						
ALTERNARIOSI	<i>Alternaria dauci</i>	Interventi agronomici: Raccolta e distruzione delle piante colpite, ampie rotazioni culturali, impiego di semente sana o disinfeccata, concimazioni equilibrate. Interventi chimici: Con andamento climatico umido e piovoso.		<i>Prodotti rameici</i>			Non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di Rame per ettaro nell'arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo applicato di 4 kg di Rame per ettaro all'anno (al raggiungimento di tale limite concorrono anche gli apporti di Rame metallo impiegati per la fertilizzazione)			
				<i>Bacillus amyloliquefaciens</i>						
				<i>Difenoconazolo</i>		2				
				<i>Boscalid</i>		2	Ammessa esclusivamente la miscela Pyraclostrobin			
				<i>Fluxapyroxad</i>			Ammesso solo in pieno campo			
				<i>Pyrimethanil</i>	2					
				<i>Azoxystrobin</i>			Massimo 2 trattamenti per ciclo			
				<i>Pyraclostrobin</i>			Ammesso esclusivamente in miscela con Boscalid. Massimo 2 trattamenti per ciclo			

Note cultura									2/2	
Avversità	Nome latino	Criteri di intervento: vincoli	Criteri di intervento: consigli	Sostanza attiva	(1) n. max. interv. per singola s.a. indip. dall'avv.	(2) n. max. interv. per gruppo di s.a. indip. dall'avv.	Limitazioni d'uso e note		Limitazioni d'uso per avversità	
MARCUMI BASALI	Sclerotinia spp.; Rhizoctonia solani	Interventi agronomici: Ampie rotazioni, concimazioni equilibrate, investimenti ottimali, evitare ristagni idrici, coltivazione di varietà resistenti, solarizzazione del terreno. Interventi chimici: Su piccole superfici o in ambienti confinati.		<i>Coniothyrium minitans</i>					Massimo un trattamento all'anno contro questa avversità	
MORIA DELLE PIASTINE	Pithium spp.			<i>Trichoderma asperellum</i>						
OIDIO	Erysiphe spp.			<i>Trichoderma gamsii</i>						
NEMATODE DEI BULBI E DELLO STELO	Ditylenchus dipsaci			<i>Bacillus subtilis</i>						
LUMACHE, CHIACCIOLE, LIMACCE	Meloidogyne spp.			<i>Bacillus amyloliquefaciens</i>						
RODITORI				Zolfo						
				Olio essenziale di arancio dolce			Ammessi massimo 6 trattamenti per ciclo			
				Bicarbonato di potassio						
				Difenoconazolo	2					
				Azoxystrobin	2	2	Ammessa esclusivamente la miscela con Boscalid			
				Pyraclostrobin	2		Ammessa esclusivamente la miscela con Pyraclostrobin			
				Boscalid			Ammesso esclusivamente in miscela con Difenoconazolo e solo in pieno campo			
				Fluxapyroxad		2				
				Paecilomyces lilacinus						
				Estratto di aglio						
				Azadiractina A						
				Paecilomyces lilacinus						
				Estratto di aglio						
				Azadiractina A						
				Fosfato ferrico						