

Note coltura									1/4	
Avversità	Nome latino	Criteri di intervento: vincoli	Criteri di intervento: consigli	Sostanza attiva	(1) n. max. interv. per singola s.a. indip. dall'avv.	(2) n. max. interv. per gruppo di s.a. indip. dall'avv.	Limitazioni d'uso e note		Limitazioni d'uso per avversità	
AFIDI	<i>Aphis fabae</i>	Soglia: Presenza		<i>Maltodestrina</i>					Massimo 2 trattamenti per ciclo culturale	
				<i>Sali potassici di acidi grassi</i>						
				<i>Pirimicarb</i>			Massimo 1 intervento all'anno			
				<i>Deltametrina</i>		3	Con Piretroidi e Piretrine massimo 2 interventi per ciclo e massimo 3 interventi all'anno.			
				<i>Cipermetrina</i>	1		Con Piretroidi e Piretrine massimo 2 interventi per ciclo e massimo 3 interventi all'anno.			
				<i>Tau-fluvalinate</i>	2		Non ammesso in serra. Con Piretroidi e Piretrine massimo 2 interventi per ciclo e massimo 3 interventi all'anno.			
				<i>Lambda-cialotrina</i>	1		Non ammesso in serra. Con Piretroidi e Piretrine massimo 2 interventi per ciclo e massimo 3 interventi all'anno.			
				<i>Piretrine</i>			Massimo 1 intervento all'anno			
				<i>Acetamiprid</i>	1		Ammesso solo in serra. Massimo 2 interventi all'anno. Impiegabile fino al 30/10/2025			
				<i>Spirotetramat</i>	2		Ammesso 1 intervento ogni 2 anni sulla coltura			
TRIPIDI	<i>Frankliniella occidentalis;</i> <i>Trips spp.</i>	Interventi chimici: Intervenire solo con infestazione generalizzata nel periodo agosto-settembre		<i>Flupyradifurone</i>						
				<i>Flonicamid</i>	1					
				<i>Lecanicillium muscarium</i>		3				
				<i>Paecilomyces fumosoroseus</i>			Ammesso solo in serra			
				<i>Sali potassici di acidi grassi</i>						
				<i>Deltametrina</i>			Con Piretroidi e Piretrine massimo 2 interventi per ciclo e massimo 3 interventi all'anno.			
				<i>Tau-fluvalinate</i>	2		Ammesso solo in pieno campo. Con Piretroidi e Piretrine massimo 2 interventi per ciclo e massimo 3 interventi all'anno.			
ALEURODIDI	<i>Triaeurodes vaporariorum;</i> <i>Bemisia tabaci</i>			<i>Etofenprox</i>	1	3	Con Piretroidi e Piretrine massimo 2 interventi per ciclo e massimo 3 interventi all'anno.			
				<i>Acrinatrina</i>	2		Con Piretroidi e Piretrine massimo 2 interventi per ciclo e massimo 3 interventi all'anno.			
				<i>Paecilomyces fumosoroseus</i>			Ammesso solo in serra			
				<i>Sali potassici di acidi grassi</i>						

Note cultura									2/4	
Avversità	Nome latino	Criteri di intervento: vincoli	Criteri di intervento: consigli	Sostanza attiva	(1) n. max. interv. per singola s.a. indip. dall'avv.	(2) n. max. interv. per gruppo di s.a. indip. dall'avv.	Limitazioni d'uso e note		Limitazioni d'uso per avversità	
PIRALIDE DEL MAIS	<i>Ostrinia nubilalis</i>	In presenza di catture intervenire nelle fasi fenologiche del bottone fiorale e del baccello differenziato. Soglia: presenza.	Installare le trappole ad innesco feromonico per monitorare il volo degli adulti.	<i>Bacillus thuringiensis</i>					Massimo 2 trattamenti per ciclo culturale contro questa avversità	
				<b>Etofenprox</b>	1		Con Piretroidi e Piretrine massimo 2 interventi per ciclo e massimo 3 interventi all'anno.			
				Tau-fluvalinate	2		Non ammesso in serra. Con Piretroidi e Piretrine massimo 2 interventi per ciclo e massimo 3 interventi all'anno.			
				Deltametrina	2		Con Piretroidi e Piretrine massimo 2 interventi per ciclo e massimo 3 interventi all'anno.			
				<b>Lambda-cialotrina</b>	1		Non ammesso in serra. Con Piretroidi e Piretrine massimo 2 interventi per ciclo e massimo 3 interventi all'anno.			
				<b>Emamectina benzoato</b>	2		Non ammesso in serra. Massimo 2 interventi all'anno			
				Clorantraniliprole	2		Massimo 2 interventi all'anno			
				Spinosad	3	3				
NOTTUE FOGLIARI	<i>Pollia pisi; Mamestra spp.; Autographa gamma; Spodoptera spp.; Heliothis armigera</i>	Soglia: Presenza accertata		<i>Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus</i>					Massimo 2 trattamenti per ciclo culturale	
				<i>Bacillus thuringiensis</i>						
				<i>Sali potassici di acidi grassi</i>			Ammesso solo contro Mamestra brassice			
				<b>Etofenprox</b>	1		Con Piretroidi e Piretrine massimo 2 interventi per ciclo e massimo 3 interventi all'anno.			
				Deltametrina			Con Piretroidi e Piretrine massimo 2 interventi per ciclo e massimo 3 interventi all'anno.			
				<b>Cipermetrina</b>	1		Con Piretroidi e Piretrine massimo 2 interventi per ciclo e massimo 3 interventi all'anno.			
				<b>Lambda-cialotrina</b>	2		Non ammesso in serra. Con Piretroidi e Piretrine massimo 2 interventi per ciclo e massimo 3 interventi all'anno.			
				<b>Emamectina benzoato</b>	2		Non ammesso in serra. Massimo 2 interventi all'anno.			
				Clorantraniliprole	2		Massimo 2 interventi all'anno			
				Spinosad	3	3	Massimo 3 interventi all'anno			
ANTRACNOSI	<i>Colletotrichum lindemuthianum</i>		Interventi agronomici: Raccolta e distruzione dei residui di piante infette, ampie rotazioni colturali, varietà resistenti o poco sensibili, semente sana o conciata. Interventi chimici: Con condizioni climatiche particolarmente favorevoli all'infezione	<b>Prodotti rameici</b>			Non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di Rame per ettaro nell'arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo applicato di 4 kg di Rame per ettaro all'anno (al raggiungimento di tale limite concorrono anche gli apporti di Rame metallo impiegati per la fertilizzazione)			
				<b>Cyprodinil</b>	2		Tra Pyrimetanil e Cyprodinil massimo 2 trattamenti all'anno indipendentemente dall'avversità. Impiegabile solo in miscela.			
				<b>Fludioxonil</b>	2		Massimo 2 trattamenti all'anno			

Note coltura								3/4
Avversità	Nome latino	Criteri di intervento: vincoli	Criteri di intervento: consigli	Sostanza attiva	(1) n. max. interv. per singola s.a. indip. dall'avv.	(2) n. max. interv. per gruppo di s.a. indip. dall'avv.	Limitazioni d'uso e note	Limitazioni d'uso per avversità
RUGGINE	<i>Uromyces appendiculatus</i>	Interventi chimici: Da praticarsi nei periodi piovosi e con temperature di circa 20°C		<i>Prodotti rameici</i>			Non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di Rame per ettaro nell'arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo applicato di 4 kg di Rame per ettaro all'anno (al raggiungimento di tale limite concorrono anche gli apporti di Rame metallo impiegati per la fertilizzazione)	
				Boscalid	2		Ammessa solo la miscela Boscalid + Pyraclostrobin in pieno campo. Massimo 2 trattamenti all'anno	
				Azoxystrobin		2	Ammessa solo la miscela Boscalid + Pyraclostrobin in pieno campo.	
				Pyraclostrobin				
MUFFA GRIGIA	<i>Botrytis cinerea</i>	Interventi chimici: Con condizioni particolarmente favorevoli all'infezione		<i>Pythium oligandrum</i>				
				<i>Bacillus amyloliquefaciens</i>				
				Fenexamid	2		Massimo 2 interventi all'anno.	
				<i>Fludioxonil</i>	2		Massimo 2 interventi all'anno.	
				Boscalid	2		Ammessa solo la miscela Boscalid + Pyraclostrobin in pieno campo. Massimo 2 interventi all'anno.	
				Pyrimethanil		2	Solo in serra. Impiegabile solo in miscela.	
				<i>Cyprodinil</i>				
				Azoxystrobin		2		
				Pyraclostrobin			Ammessa solo la miscela Boscalid + Pyraclostrobin in pieno campo.	
SCLEROTINA	<i>Sclerotinia spp.</i>			<i>Coniothyrium minitans</i>				
				<i>Pythium oligandrum</i>				
				<i>Trichoderma asperellum</i>				
				<i>Trichoderma gamsii</i>				
				<i>Bacillus subtilis</i>				
				<i>Bacillus amyloliquefaciens</i>				
				<i>Cyprodinil</i>	2		Impiegabile solo in miscela. Tra Pyrimetanil e Cyprodinil massimo 2 trattamenti all'anno indipendentemente dall'avversità. Massimo 2 interventi all'anno.	
				<i>Fludioxonil</i>	2		Massimo 2 interventi all'anno	
				Fenexamid	2		Massimo 2 interventi all'anno.	
				Boscalid	2		Ammessa solo la miscela Boscalid + Pyraclostrobin in pieno campo. Massimo 2 interventi all'anno.	
				Azoxystrobin		2	Ammessa solo la miscela Boscalid + Pyraclostrobin in pieno campo.	
				Pyraclostrobin				

Note coltura									4/4
Avversità	BATTERIOSI	Nome latino	Criteri di intervento: vincoli	Criteri di intervento: consigli	Sostanza attiva	(1) n. max. interv. per singola s.a. indip. dall'avv.	(2) n. max. interv. per gruppo di s.a. indip. dall'avv.	Limitazioni d'uso e note	Limitazioni d'uso per avversità
LUMACHE, CHIACCIOLE, LIMACCE	PATOGENI TELLURICI	<i>Pseudomonas syringae; Xanthomonas campestris</i>			<i>Prodotti rameici</i>			Non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di Rame per ettaro nell'arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo applicato di 4 kg di Rame per ettaro all'anno (al raggiungimento di tale limite concorrono anche gli apporti di Rame metallo impiegati per la fertilizzazione)	
LUMACHE, CHIACCIOLE, LIMACCE	<i>Rhizoctonia</i> spp		Si consiglia l'impiego di seme conciato		<i>Trichoderma asperellum</i>				
					<i>Trichoderma gamsii</i>				
					Flutolanil			Impiegabile solo in miscela	
					<i>Fosfato ferrico</i>				