

| Note coltura | | | | | | | | 1/3 |
|-------------------|---|---|--|---------------------------------------|---|---|--|---|
| Avversità | Nome latino | Criteri di intervento: vincoli | Criteri di intervento: consigli | Sostanza attiva | (1) n. max. interv. per singola s.a. indip. dall'avv. | (2) n. max. interv. per gruppo di s.a. indip. dall'avv. | Limitazioni d'uso e note | Limitazioni d'uso per avversità |
| AFIDI | <i>Aphis fabae</i> | Soglia: Presenza | | <i>Maltodestrina</i> | | | | Massimo 2 trattamenti per ciclo colturale |
| | | | | <i>Sali potassici di acidi grassi</i> | | | | |
| | | | | Pirimicarb | | | Massimo 1 intervento all'anno | |
| | | | | Deltametrina | | 3 | Con Piretroidi e Piretrine massimo 2 interventi per ciclo e massimo 3 interventi all'anno. | |
| | | | | Cipermetrina | 1 | | Non ammesso in serra. Con Piretroidi e Piretrine massimo 2 interventi per ciclo e massimo 3 interventi all'anno. | |
| | | | | Tau-fluvalinate | 2 | | Non ammesso in serra. Con Piretroidi e Piretrine massimo 2 interventi per ciclo e massimo 3 interventi all'anno. | |
| | | | | Lambda-cialotrina | 1 | | Non ammesso in serra. Con Piretroidi e Piretrine massimo 2 interventi per ciclo e massimo 3 interventi all'anno. | |
| | | | | Piretrine | | | | |
| | | | | Acetamiprid | 1 | | Massimo 1 intervento all'anno | |
| Flupyradifurone | | | Ammesso 1 intervento ogni 2 anni sulla coltura | | | | | |
| Fonicamid | 1 | | | | | | | |
| TRIPIDI | <i>Frankliniella occidentalis</i> ; <i>Thrips spp.</i> | Interventi chimici: Intervenire solo con infestazione generalizzata nel periodo agosto-settembre | | <i>Lecanicillium muscarium</i> | | | | Massimo 2 trattamenti per ciclo colturale |
| | | | | <i>Paecilomyces fumosoroseus</i> | | | Ammesso solo in serra | |
| | | | | <i>Sali potassici di acidi grassi</i> | | | | |
| | | | | Deltametrina | | 3 | Con Piretroidi e Piretrine massimo 2 interventi per ciclo e massimo 3 interventi all'anno. | |
| | | | | Tau-fluvalinate | 2 | | Ammesso solo in pieno campo. Con Piretroidi e Piretrine massimo 2 interventi per ciclo e massimo 3 interventi all'anno. | |
| | | | | Etofenprox | 1 | | Con Piretroidi e Piretrine massimo 2 interventi per ciclo e massimo 3 interventi all'anno. | |
| Acrinatrina | 2 | | Con Piretroidi e Piretrine massimo 2 interventi per ciclo e massimo 3 interventi all'anno. | | | | | |
| ALEURODIDI | <i>Trialeurodes vaporariorum</i> ; <i>Bemisia tabaci</i> | | | <i>Paecilomyces fumosoroseus</i> | | | Ammesso solo in serra | Massimo 2 trattamenti per ciclo colturale |
| | | | | <i>Sali potassici di acidi grassi</i> | | | | |
| PIRALIDE DEL MAIS | <i>Ostrinia nubilalis</i> | In presenza di catture intervenire nelle fasi fenologiche del bottone florale e del baccello differenziato. Soglia: presenza. | Installare le trappole ad innesco feromonico per monitorare il volo degli adulti. | <i>Bacillus thuringiensis</i> | | | | Massimo 2 trattamenti per ciclo colturale contro questa avversità |
| | | | | Etofenprox | 1 | 3 | Con Piretroidi e Piretrine massimo 2 interventi per ciclo e massimo 3 interventi all'anno. | |
| | | | | Tau-fluvalinate | 2 | | Non ammesso in serra. Con Piretroidi e Piretrine massimo 2 interventi per ciclo e massimo 3 interventi all'anno. | |
| | | | | Deltametrina | 2 | | Con Piretroidi e Piretrine massimo 2 interventi per ciclo e massimo 3 interventi all'anno. | |
| | | | | Lambda-cialotrina | 1 | | Non ammesso in serra. Con Piretroidi e Piretrine massimo 2 interventi per ciclo e massimo 3 interventi all'anno. | |
| | | | | Emamectina benzoato | 2 | | Non ammesso in serra. Massimo 2 interventi all'anno | |
| | | | | Clorantraniliprole | 2 | | Massimo 2 interventi all'anno | |
| Spinosad | 3 | 3 | | | | | | |

| Note coltura | | | | | | | | 2/3 |
|-------------------|---|--------------------------------|---|---------------------------------------|---|---|--|---|
| Avversità | Nome latino | Criteri di intervento: vincoli | Criteri di intervento: consigli | Sostanza attiva | (1) n. max. interv. per singola s.a. indip. dall'avv. | (2) n. max. interv. per gruppo di s.a. indip. dall'avv. | Limitazioni d'uso e note | Limitazioni d'uso per avversità |
| NOTTUE FOGLIARI | <i>Spodoptera</i> spp.; <i>Mamestra</i> spp.; <i>Autographa gamma</i> ; <i>Ceramica pisi</i> = <i>Polla pisi</i> | Soglia: Presenza accertata | | <i>Helicoverpa armigera</i> | | | | Massimo 2 trattamenti per ciclo culturale |
| | | | | <i>nucleopoliedrovirus</i> | | | | |
| | | | | <i>Bacillus thuringiensis</i> | | | | |
| | | | | <i>Sali potassici di acidi grassi</i> | | | Ammesso solo contro Mamestra brassice | |
| | | | | Etofenprox | 1 | 3 | Con Piretroidi e Piretrine massimo 2 interventi per ciclo e massimo 3 interventi all'anno. | |
| | | | | Deltametrina | | | | |
| | | | | Cipermetrina | 1 | | | |
| | | | | Lambda-cialotrina | 2 | | Non ammesso in serra. Con Piretroidi e Piretrine massimo 2 interventi per ciclo e massimo 3 interventi all'anno. | |
| | | | | Emamectina benzoato | 2 | | Non ammesso in serra. Massimo 2 interventi all'anno. | |
| Clorantranilprole | 2 | | Massimo 2 interventi all'anno | | | | | |
| Spinosad | 3 | 3 | Massimo 3 interventi all'anno | | | | | |
| ANTRACNOSI | <i>Colletotrichum lindemuthianum</i> | | Interventi agronomici: Raccolta e distruzione dei residui di piante infette, ampie rotazioni colturali, varietà resistenti o poco sensibili, semente sana o concziata. Interventi chimici: Con condizioni climatiche particolarmente favorevoli all'infezione | Prodotti rameici | | | Non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di Rame per ettaro nell'arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo applicato di 4 kg di Rame per ettaro all'anno (al raggiungimento di tale limite concorrono anche gli apporti di Rame metallo impiegati per la fertilizzazione) | |
| | | | | Cyprodinil | 2 | | Tra Pyrimetanil e Cyprodinil massimo 2 trattamenti all'anno indipendentemente dall'avversità. Impiegabile solo in miscela. | |
| | | | | Fludioxonil | 2 | | Massimo 2 trattamenti all'anno | |
| RUGGINE | <i>Uromyces appendiculatus</i> , | | Interventi chimici: Da praticarsi nei periodi piovosi e con temperature di circa 20°C | Prodotti rameici | | | Non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di Rame per ettaro nell'arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo applicato di 4 kg di Rame per ettaro all'anno (al raggiungimento di tale limite concorrono anche gli apporti di Rame metallo impiegati per la fertilizzazione) | |
| | | | | <i>Zolfo</i> | | | Ammesso solo in miscela | |
| | | | | Boscalid | 2 | | Ammessa solo la miscela Boscalid + Pyraclostrobin in pieno campo. Massimo 2 trattamenti all'anno | |
| | | | | Azoxystrobin | | 2 | Ammessa solo la miscela Boscalid + Pyraclostrobin in pieno campo. | |
| | | | | Pyraclostrobin | | | | |
| MUFFA GRIGIA | <i>Botrytis cinerea</i> | | Interventi chimici: Con condizioni particolarmente favorevoli all'infezione | <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> | | | | |
| | | | | <i>Pythium oligandrum</i> | | | | |
| | | | | <i>Laminarina</i> | | | Ammessa solo in serra | |
| | | | | Fenexamid | 2 | | Massimo 2 interventi all'anno. | |
| | | | | Fludioxonil | 2 | | Massimo 2 interventi all'anno. | |
| | | | | Boscalid | 2 | | Ammessa solo la miscela Boscalid + Pyraclostrobin in pieno campo. Massimo 2 interventi all'anno. | |
| | | | | Pyrimethanil | | 2 | Solo in serra. | |
| | | | | Cyprodinil | | | Impiegabile solo in miscela. | |
| | | | | Azoxystrobin | | 2 | Ammessa solo la miscela Boscalid + Pyraclostrobin in pieno campo. | |
| Pyraclostrobin | | | | | | | | |

| DIFESA Fagiolino 2026 v1 | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|---|--|---------------------------------|-----|
| Note coltura | | | | | | | | | 3/3 |
| Avversità | Nome latino | Criteri di intervento: vincoli | Criteri di intervento: consigli | Sostanza attiva | (1) n. max. interv. per singola s.a. indip. dall'avv. | (2) n. max. interv. per gruppo di s.a. indip. dall'avv. | Limitazioni d'uso e note | Limitazioni d'uso per avversità | |
| SCLEROTINIA | <i>Sclerotinia</i> spp. | | | <i>Coniothyrium minitans</i> | | | | | |
| | | | | <i>Pythium oligandrum</i> | | | | | |
| | | | | <i>Trichoderma asperellum</i> | | | | | |
| | | | | <i>Trichoderma gamsii</i> | | | | | |
| | | | | <i>Bacillus subtilis</i> | | | | | |
| | | | | <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> | | | | | |
| | | | | Cyprodinil | 2 | | Impiegabile solo in miscela. Tra Pyrimetanil e Cyprodinil massimo 2 trattamenti all'anno indipendentemente dall'avversità. Massimo 2 interventi all'anno. | | |
| | | | | Fludioxonil | 2 | | Massimo 2 interventi all'anno | | |
| | | | | Fenexamid | 2 | | Massimo 2 interventi all'anno. | | |
| | | | | Boscalid | 2 | | Ammessa solo la miscela Boscalid + Pyraclostrobin in pieno campo. Massimo 2 interventi all'anno. | | |
| Azoxystrobin | | | 2 | Ammessa solo la miscela Boscalid + Pyraclostrobin in pieno campo. | | | | | |
| Pyraclostrobin | | | | | | | | | |
| BATTERIOSI | <i>Pseudomonas syringae;</i> <i>Xanthomonas campestris</i> | | | Prodotti rameici | | | Non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di Rame per ettaro nell'arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo applicato di 4 kg di Rame per ettaro all'anno (al raggiungimento di tale limite concorrono anche gli apporti di Rame metallo impiegati per la fertilizzazione) | | |
| PATOGENI TELLURICI | <i>Rhizoctonia</i> spp | | Si consiglia l'impiego di seme conciato | <i>Trichoderma asperellum</i> | | | | | |
| | | | | <i>Trichoderma gamsii</i> | | | | | |
| | | | | Flutolanil | | | Impiegabile solo in miscela | | |
| LUMACHE, CHIOCCIOLE, LIMACCE | | | | Fosfato ferrico | | | | | |