

Note coltura								1/4
Avversità	Nome latino	Criteri di intervento: vincoli	Criteri di intervento: consigli	Sostanza attiva	(1) n. max. interv. per singola s.a. indep. dall'avv.	(2) n. max. interv. per gruppo di s.a. indep. dall'avv.	Limitazioni d'uso e note	Limitazioni d'uso per avversità
NOTTUE FOGLIARI	Autographa gamma; Chrysodeixis chalcites; Spodoptera littoralis; Spodoptera exigua	Soglia: presenza generalizzata		Bacillus thuringiensis Helicoverpa armigera nucleopoliedrovirus Spodoptera littoralis Nucleopoliedrovirus (SpliNPV) Azadiractina A Cipermetrina Lambda-cialotrina Etofenprox Deltametrina Emamectina benzoato Spinosad Clorantraniliprole			AmMESSO un solo trattamento con piretroidi candidati alla sostituzione, indipendentemente dall'avversità. AmMESSI al massimo 2 trattamenti con piretroidi. AmMESSI al massimo 2 trattamenti con piretroidi.	Contro questa avversità massimo 1 trattamento all'anno con prodotti chimici
NOTTUE TERRICOLE	Agrotis ipsilon; Agrotis segetum	Soglia: 1 pianta attaccata su 5m di fila, rilevata su almeno 4 punti dell'appezzamento.		Cipermetrina Lambda-cialotrina Deltametrina Teflutrin	1 1	2	AmMESSO un solo trattamento con piretroidi candidati alla sostituzione, indipendentemente dall'avversità. AmMESSI al massimo 2 trattamenti con piretroidi. AmMESSI al massimo 2 trattamenti con piretroidi. I trattamenti geodisinfestanti a base di piretroidi granulari non sono da considerarsi nel limite numerico dei trattamenti fogliari con le stesse s.a.	Massimo 1 trattamento all'anno contro questa avversità
CIMICI	Halyomorpha halys; Nezara viridula	Soglia: presenza generalizzata		Cipermetrina Etofenprox Deltametrina Acetamiprid	1 1	3	AmMESSO un solo trattamento con piretroidi candidati alla sostituzione, indipendentemente dall'avversità. AmMESSI al massimo 2 trattamenti con piretroidi.	Massimo 1 trattamento all'anno contro questa avversità
AFIDI	Myzus persicae; Macrosiphum euphorbiae; Aphis gossypii		Soglia: infestazione diffusa	Beauveria bassiana Sali potassici di acidi grassi Olio minerale Azadiractina A Maltodestrina Pirimicarb Acetamiprid Sulfoxaflor Flupyradifurone Fonicamid Piretrine	1	3	Impiegabile come da etichetta, fino ad un massimo di 400 ml ha/anno. AmMESSO solo in serra AmMESSI al massimo 2 trattamenti con piretroidi.	Massimo 1 trattamento all'anno contro questa avversità
TRIPIDI	Thrips sp. ; Frankliniella occidentalis			Orius sp. Beauveria bassiana Metarhizium anisopliae Azadiractina A Olio essenziale di arancio Sali potassici di acidi grassi Piretrine Spinosad	3	3	AmMESSI al massimo 2 trattamenti con piretroidi.	

Note coltura								2/4
Avversità	Nome latino	Criteri di intervento: vincoli	Criteri di intervento: consigli	Sostanza attiva	(1) n. max. interv. per singola s.a. indep. dall'avv.	(2) n. max. interv. per gruppo di s.a. indep. dall'avv.	Limitazioni d'uso e note	Limitazioni d'uso per avversità
MINATRICE DELLE FOGLIE	<i>Liriomyza</i> sp.			Azadiractina A				
				Spinosad	3	3		
RAGNETTO ROSSO	<i>Tetranychus urticae</i>	Soglia: presenza generalizzata di focolai d'infezione		<i>Beauveria bassiana</i>				Massimo 1 trattamento all'anno contro questa avversità
				Sali potassici di acidi grassi				
				Olio essenziale di arancio				
				Olio minerale				
				Maltodestrina				
				Zolfo				
				Cyflumetofen				
				Exitiazox				
				Fenpiroximate				
ELATERIDI	<i>Agricoltes</i> spp.	Soglia: presenza accertata di larve		<i>Beauveria bassiana</i>				Geodisinfestazione lungo la fila di semina o trapianto. I trattamenti
				Teflutrin			In pre-semina/pre-trapianto o alla sarchiatura/rincazzatura	
				<b>Lambda-cialotrina</b>			In pre-semina/pre-trapianto o alla sarchiatura/rincazzatura	
PERONOSPORA	<i>Phytophthora infestans</i>		Cadenzare i trattamenti in funzione dell'andamento climatico stagionale	<b>Prodotti rameici</b>			Non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di Rame per ettaro nell'arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo applicato di 4 kg di Rame per ettaro all'anno (al raggiungimento di tale limite concorrono anche gli apporti di Rame metallo impiegati per la fertilizzazione)	
				<i>Bacillus amyloliquefaciens</i>				
				Olio essenziale di arancio				
				Fosetil alluminio				
				Fosfonato di potassio				
				Azoxystrobin		3	Tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin massimo 3 interventi all'anno, indipendentemente dall'avversità controllata.	
				Pyraclostrobin		3		
				Zoxamide		4		
				Mandipropamid		3		
				Cymoxanil				
				Metalaxil-M				
				Propamocarb		3	Impiegabile solo in miscela con Cimoxanil	
				Ciazofamid		3		
				Amisulbrom				
				Ametoctradina		3	Amnesso esclusivamente in miscela con altre s.a.	
				Fluazinam			Amnessi 2 trattamenti tra Fluazinam, Captano e Folpet	
				Oxathiapiprolin		3		
				Folpet		2	Amnessi 2 trattamenti tra Fluazinam, Captano e Folpet	
				Captano			Amnessi 2 trattamenti tra Fluazinam, Captano e Folpet	

Note coltura								3/4
Avversità	Nome latino	Criteri di intervento: vincoli	Criteri di intervento: consigli	Sostanza attiva	(1) n. max. interv. per singola s.a. indep. dall'avv.	(2) n. max. interv. per gruppo di s.a. indep. dall'avv.	Limitazioni d'uso e note	Limitazioni d'uso per avversità
SCLEROTINIA	<i>Sclerotinia</i> spp.		Interventi agronomici: - impiego di seme sano; - ridurre gli eccessi di umidità.	<i>Trichoderma asperellum</i> <i>Trichoderma gamsii</i> <i>Trichoderma harzianum</i> <i>Coniothyrium minitans</i> <i>Pythium oligandrum</i>				
ALTERNARIOSI	<i>Alternaria solani</i>		Intervenire alla prima comparsa dei sintomi	<b>Prodotti rameici</b>  <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> Cyflufenamid Azoxytrobina Pyraclostrobin  Zoxamide <b>Difenoconazolo</b> Fluxapyroxad Folpet Captano		3   3  2  2  2	Non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di Rame per ettaro nell'arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo applicato di 4 kg di Rame per ettaro all'anno (al raggiungimento di tale limite concorrono anche gli apporti di Rame metallo impiegati per la fertilizzazione)   Impiegare solo in miscela con Difenoconazolo Tra Azoxytrobina e Pyraclostrobin massimo 3 interventi all'anno, indipendentemente dall'avversità controllata  Autorizzata contro Alternaria anche la miscela con Cymoxanil  Impiegare solo in miscela con Difenoconazolo Ammessi 2 trattamenti tra Fluazinam, Captano e Folpet Ammessi 2 trattamenti tra Fluazinam, Captano e Folpet	
SEPTORIOSI DEL POMODORO	<i>Septoria lycopersici</i>		Intervenire alla prima comparsa dei sintomi	<b>Prodotti rameici</b>  <b>Difenoconazolo</b> Azoxytrobina Pyraclostrobin	2	2  3	Non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di Rame per ettaro nell'arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo applicato di 4 kg di Rame per ettaro all'anno (al raggiungimento di tale limite concorrono anche gli apporti di Rame metallo impiegati per la fertilizzazione)  Tra Azoxytrobina e Pyraclostrobin massimo 3 interventi all'anno, indipendentemente dall'avversità controllata.	
OIDIO	<i>Erysiphe</i> sp.: <i>Leveillula taurica</i>			<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> <i>Ampelomyces quisqualis</i> Zolfo COS-OGA Estratto acquoso dei semi germinati di <i>Lupinus albus</i> dolce Eugenolo Geraniolo Timolo				

Note coltura								4/4
Avversità	Nome latino	Criteri di intervento: vincoli	Criteri di intervento: consigli	Sostanza attiva	(1) n. max. interv. per singola s.a. indep. dall'avv.	(2) n. max. interv. per gruppo di s.a. indep. dall'avv.	Limitazioni d'uso e note	Limitazioni d'uso per avversità
BOTRITE	<i>Botrytis cinerea</i>			<i>Bacillus amyloliquefaciens</i>				
				<i>Bacillus subtilis</i>				
				<i>Pythium oligandrum</i>				
				Estratto acquoso dei semi germinati di <i>Lupinus albus</i> dolce				
				<i>Eugenolo</i>				
				<i>Geraniolo</i>				
				<i>Timolo</i>				
BATTERIOSI	<i>Pseudomonas</i> sp.; <i>Xanthomonas</i> spp			<b>Prodotti rameici</b>			Non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di Rame per ettaro nell'arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo applicato di 4 kg di Rame per ettaro all'anno (al raggiungimento di tale limite concorrono anche gli apporti di Rame metallo impiegati per la fertilizzazione)	
				<i>Bacillus amyloliquefaciens</i>				
				<i>Bacillus subtilis</i>				
NEMATODE GALLIGENO	<i>Meloidogyne</i> sp.			Estratto di aglio				
				Paecilomyces lilacinus				
				<i>Azadiractina A</i>				
				<i>Geraniolo</i>				
				<i>Timolo</i>				