

Note coltura									1/1
Avversità	Nome latino	Criteri di intervento: vincoli	Criteri di intervento: consigli	Sostanza attiva			Limitazioni d'uso e note	Limitazioni d'uso per avversità	
MOSCA DEL CAVOLO	Phylloreta spp.		Soglia: inizio infestazione	Deltametrina	<i>Maltodestrina</i>				
					<i>Salì potassici di acidi grassi</i>				
NOTTUE FOGLIARI	MOSCÀ DEL CAVOLO	ALTICA	Phylloreta spp.	Deltametrina		2	Non ammesso in serra		
PERONOSPORA	Peronospora brassicae		Interventi agronomici: Adottare ampi avvicendamenti colturali, impiegare seme sano, distruggere le piante colpite. Interventi chimici: In caso di attacchi precoci.		<i>Prodotti rameici</i>		Non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di Rame per ettaro nell'arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo applicato di 4 kg di Rame per ettaro all'anno (al raggiungimento di tale limite concorrono anche gli apporti di Rame metallo impiegati per la fertilizzazione)		
					<i>Olio essenziale di arancio dolce</i>				
					<i>Mandipropamid</i>				
					<i>Bacillus amyloliquefaciens</i>				
SCLEROTINIA	Sclerotinia sp.		Interventi agronomici: Adottare ampi avvicendamenti colturali, impiegare seme sano, distruggere le piante colpite		<i>Bacillus subtilis</i>		Ammesso solo in pieno campo		
					Fluxapyroxad	1			
					Protoconazolo	2	Impiego ammesso esclusivamente per colture da seme. Ammesso solo per Sclerotinia sclerotiorum.		
					<i>Prodotti rameici</i>				
ALTERNARIOSI	Alternaria raphani		Interventi agronomici: Adottare ampi avvicendamenti colturali, impiegare seme sano, distruggere le piante colpite		Fluxapyroxad	2	Ammesso solo in pieno campo		
					<i>Difenoconazolo</i>	1			
					Azoxystrobin	2			
					<i>Trichoderma atroviride</i>				
LUMACHE, CHIACCIOLE, LIMACCE	Pythium spp.		Soglia: infestazione diffusa		Metaldeide esca				
					<i>Fosfato ferrico</i>				