

Note coltura								1/1
Avversità	Nome latino	Criteri di intervento: vincoli	Criteri di intervento: consigli	Sostanza attiva	(1) n. max. interv. per singola s.a. indep. dall'avv.	(2) n. max. interv. per gruppo di s.a. indep. dall'avv.	Limitazioni d'uso e note	Limitazioni d'uso per avversità
AFIDI				Maltodestrina				
				Azadiractina A				
				Sali potassici di acidi grassi				
ALTICA	<i>Phylloreta spp.</i>		Soglia: inizio infestazione	Deltametrina		2	Non ammesso in serra	
MOSCA DEL CAVOLO	<i>Delia radicum</i>							
NOTTUE FOGLIARI	<i>Autographa gamma;</i> <i>Mamestra brassicae</i>			Azadiractina A				
				Clorantraniliprole				
PERONOSPORA	<i>Peronospora brassicae</i>		Interventi agronomici: Adottare ampi avvicendamenti colturali, impiegare seme sano, distruggere le piante colpite. Interventi chimici: In caso di attacchi precoci.	Prodotti rameici			Non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di Rame per ettaro nell'arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo applicato di 4 kg di Rame per ettaro all'anno (al raggiungimento di tale limite concorrono anche gli apporti di Rame metallo impiegati per la fertilizzazione)	
				Olio essenziale di arancio				
				Mandipropamid				
SCLEROTINIA	<i>Sclerotinia sp.</i>			<i>Bacillus amyloliquefaciens</i>				
				<i>Bacillus subtilis</i>				
				Fluxapyroxad	1	2	Ammesso solo in pieno campo	
				Protioconazolo	2		Impiego ammesso esclusivamente per colture da seme. Ammesso solo per <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> .	
ALTERNARIOSI	<i>Alternaria raphani</i>		Interventi agronomici: Adottare ampi avvicendamenti colturali, impiegare seme sano, distruggere le piante colpite	Prodotti rameici			Non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di Rame per ettaro nell'arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo applicato di 4 kg di Rame per ettaro all'anno (al raggiungimento di tale limite concorrono anche gli apporti di Rame metallo impiegati per la fertilizzazione)	
				Fluxapyroxad	2		Ammesso solo in pieno campo	
				Difenoconazolo	1		Ammessa esclusivamente la miscela Fluxapyroxad + Difeconazolo	
				Azoxystrobin		2	Ammesso solo in pieno campo	
MORIA DELLE PIANTINE	<i>Pythium spp.</i>			<i>Trichoderma atroviride</i>				
LUMACHE, CHIOCCIOLE, LIMACCE			Soglia: infestazione diffusa	Metaldeide esca				
				Fosfato ferrico				