

DISERBO ARBOREE Olivo 2025 v2

Specifiche a livello regionale								1/1	
Num. max inter. con i c.a.s	Numero di interventi massimi consentiti con le sostanze attive candidate alla sostituzione, indicate in grassetto:1. Nel caso di impiego di miscele contenenti più sostanze attive candidate alla sostituzione, vanno conteggiate le singole sostanze candidate. Ad esempio, una miscela con 2 sostanze attive candidate alla sostituzione vale per 2 interventi								
Vincoli coltura	Non ammessi interventi chimici nelle interfile. Il diserbo deve essere localizzato solo in bande lungo la fila. La superficie massima diserbabile non deve superare il 30% della superficie totale della coltura.								
Consigli coltura	<ul style="list-style-type: none"> - Operare con inerbimenti, sfalci, trinciatore e/o lavorazioni del terreno; - Interventi localizzati sulle file, operando con microdosaggi su infestanti nei primi stadi di sviluppo. Ripetere le applicazioni in base alle necessità; - Consigliabili le applicazioni nel periodo autunnale; - L'uso di diserbanti può essere opportuno quando: - Vi siano rischi di erosione (es. pendenze superiori al 5%); - Vi siano impianti con impalcature basse e di dimensioni tali da limitare la possibilità di intervenire con organi meccanici 								
Impianto Attività	Infestante	Sostanza attiva	Note sostanza attiva - vincoli	Note sostanza attiva - consigli	Note attività - vincoli	Note attività - consigli	Informazioni aggiuntive		
ALLEVAMENTO E PRODUZIONE Fogliare (post emergenza infestanti)	Dicotiledoni e Graminacee	Glifosate	Max 9 l/ha/anno con formulati a 360 g/L se si usano erbicidi fogliari; max 6 l/ha/anno se si usano erbicidi residuali in produzione.						
	Dicotiledoni	Halauxifen-metile							
		Fluroxipir							
	Dicotiledoni e polloni	Carfentrazone ethyle	Per ogni singolo intervento la dose è di 0,3 l/ha come erbicida e max 1 L/ha come spollonante.						
		Pyraflufen ethyle							
		Fluroxipir							
	Graminacee	Fluazifop-p-butile							
		Clethodim							
ALLEVAMENTO E PRODUZIONE Residuale (pre emergenza infestanti)	Dicotiledoni e Graminacee	Spollonante e Dicotiledoni	Acido pelargonico						
		Florasulam	Un trattamento all'anno alle dosi di etichetta tra ottobre e novembre						
		Penoxsulam	Un trattamento all'anno alle dosi di etichetta tra ottobre e novembre						
		Flazasulfuron							
		Oxyfluorfen							
		Diflufenican							
PRODUZIONE Residuale (pre emergenza infestanti)	Dicotiledoni	Tribenuron-metile	Un solo trattamento per stagione						
ALLEVAMENTO (FINO A 3 ANNI) Residuale (pre emergenza infestanti)	Dicotiledoni e Graminacee	Glifosate							