

DISERBO ERBACEE Colza 2026 v1

| Specifiche a livello regionale | | | | | | 1/1 | |
|--------------------------------|---|---------------------------------------|--|---|------------|-------------------------|--|
| Num. max inter. con i c.a.s | Numero di interventi massimi consentiti con le sostanze attive candidate alla sostituzione, indicate in grassetto: 2 . Nel caso di impiego di miscele contenenti più sostanze attive candidate alla sostituzione, vanno conteggiate le singole sostanze candidate. Ad esempio, una miscela con 2 sostanze attive candidate alla sostituzione vale per 2 interventi | | | | | | |
| Vincoli coltura | | | | | | | |
| Consigli coltura | | | | | | | |
| Epoca | Infestante | Sostanza attiva | Note sostanza attiva - vincoli | Note sostanza attiva - consigli | Note epoca | Informazioni aggiuntive | |
| Pre semina | Graminacee e Dicotiledoni | Acido pelargonico | Diserbo letti di semina. | | | | |
| | | Glifosate | <p>Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree</p> <p>Ogni azienda per singolo anno (1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.</p> <p>Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha (720 g di s. a./ ha) è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.</p> <p>Nel caso di due colture / anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per ciascuna delle colture.</p> | Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative. | | | |
| Pre emergenza | Graminacee e Dicotiledoni | Napropamide | | | | | |
| | | Clomazone | | | | | |
| | | Metazaclor | Sullo stesso appezzamento non distribuire più di 1 kg di metazaclor ogni 3 anni. | | | | |
| Post emergenza | Graminacee e Dicotiledoni | Pendimethalin | | | | | |
| | | Metazaclor | Sullo stesso appezzamento non distribuire più di 1 kg di metazaclor ogni 3 anni. | | | | |
| | | Imazamox | Ammesso solo su varietà tolleranti. | | | | |
| | | Halauxifen-metile | | | | | |
| | | Aminopiridid | | | | | |
| | Dicotiledoni | Picloram | | | | | |
| | | Clopiralid | | | | | |
| | Graminacee | Quizalofop-p-etile | | | | | |
| | | Propaquizafop | | | | | |
| Ciclossidim | | Applicare solo una volta ogni 3 anni. | | | | | |
| Clethodim | | | | | | | |
| | | Fluazifop-p-butile | | | | | |