

DISERBO ERBACEE Orzo 2025 v2

Specifiche a livello regionale							1/2	
Num. max inter. con i c.a.s	Numero di interventi massimi consentiti con le sostanze attive candidate alla sostituzione, indicate in grassetto: 4. Nel caso di impiego di miscele contenenti più sostanze attive candidate alla sostituzione, vanno conteggiate le singole sostanze candidate. Ad esempio, una miscela con 2 sostanze attive candidate alla sostituzione vale per 2 interventi.							
Vincoli cultura								
Consigli coltura								
Epoca	Infestante	Sostanza attiva	Note sostanza attiva - vincoli	Note sostanza attiva - consigli	Note epoca	Informazioni aggiuntive		
Pre semina	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate	Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree. Ogni azienda per singolo anno (1 gen. 31 dicembre) può disporre di un quantitativo massimo di Glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto. Il quantitativo totale di Glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato. Nel caso di due colture/anno sulla stessa superficie la quantità di Glifosate si conteggia per ciascuna delle colture	Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.				
Pre emergenza	Graminacee e Dicotiledoni	Flufenacet	Non impiegabile se utilizzato per il diserbo di pre-emergenza della coltura precedente		Il diserbo di pre-emergenza di orzo è consentito una volta ogni 3 anni sullo stesso appezzamento. Tale pratica è alternativa al diserbo di post emergenza precoce			
		Pendimethalin	Non impiegabile se utilizzato per il diserbo di pre-emergenza della coltura precedente					
		Prosulfocarb						
		Diflufenican		Dicotiledonicida con azione secondaria su graminacee				
	Graminacee	Triallate						
Post emergenza precoce	Graminacee e Dicotiledoni	Prosulfocarb			Il diserbo di post emergenza precoce è alternativo a quello di pre emergenza			
		Flufenacet	Non impiegabile se utilizzato per il diserbo di pre-emergenza della coltura precedente.					
		Diflufenican		Dicotiledonicida con azione secondaria su graminacee				
		Beflubutamid						
	Dicotiledoni	Halauxifen-metile						

DISERBO ERBACEE Orzo 2025 v2

Specifiche a livello regionale							2/2	
Num. max inter. con i c.a.s	Numero di interventi massimi consentiti con le sostanze attive candidate alla sostituzione, indicate in grassetto: 4. Nel caso di impiego di miscele contenenti più sostanze attive candidate alla sostituzione, vanno conteggiate le singole sostanze candidate. Ad esempio, una miscela con 2 sostanze attive candidate alla sostituzione vale per 2 interventi.							
Vincoli cultura								
Consigli coltura								
Epoca	Infestante	Sostanza attiva	Note sostanza attiva - vincoli	Note sostanza attiva - consigli	Note epoca	Informazioni aggiuntive		
Post emergenza	Dicotiledoni	Tifensufuron metile						
		Metsulfuron metile						
		Tribenuron-metile						
		Mecoprop-P						
		Diclorprop-p						
		Tritosulfuron	Utilizzabile fino al 7 novembre 2025					
		Fluroxipir						
		Florasulam						
		Amidosulfuron						
		Aminopiralid						
		2,4 D						
		MCPA						
		Diflufenican	Impiego alternativo al diserbo di pre emergenza / post emergenza precoce.	Dicotiledonicida con azione secondaria su graminacee				
		Clopiralid						
	Graminacee e Dicotiledoni	Halauxifen-metile						
		Iodosulfuron metil-sodium						
		Bensulfuron metile						
		Fenoxaprop-p-etile	Non efficace su Lolium					
	Graminacee	Pinoxaden						
		Diclofop-metile						