

CONTROLLO INTEGRATO DELLE INFESTANTI DI: BARBABIETOLA DA ZUCCHERO (1/1)

EPOCHE DI INTERVENTO	INFESTANTI CONTROLLATE	SOSTANZE ATTIVE	NOTE
Pre-semina Pre-emergenza	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate (1) Acido pelargonico Triallate (2)	(1) Ogni azienda per singolo anno (1 gen. 31 dicembre) può disporre di un quantitativo massimo di Glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto. Il quantitativo totale di Glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato. Nel caso di due colture / anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per ciascuna delle colture. Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative. (2) Utilizzabile per la barbabietola da zucchero a semina autunnale. Massimo un intervento per ciclo colturale.
Pre-emergenza	Dicotiledoni Prevalenza di crucifere, poligonacee e situazioni miste	Metamitron Triallate (2)	Si consiglia la localizzazione. Per ciascun prodotto la dose indicata costituisce il quantitativo massimo di prodotto utilizzabile sull'ettaro coltivato, a prescindere dalla modalità di distribuzione (localizzato o in pieno campo) (2) Utilizzabile per la barbabietola da zucchero a semina autunnale. Massimo un intervento per ciclo colturale.
	Graminacee e Dicotiledoni	Ethofumesate Clomazone S-Metolaclo (3)	(3) Impiegabile, in presenza di popolazioni di amaranto resistenti e massimo 1 volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento indipendentemente dall'applicazione su mais, sorgo, pomodoro, girasole.
Post-emergenza	Graminacee e Dicotiledoni	Ethofumesate Fenmedifam Metamitron Foramsulfuron (4) Thiencarbazone-metile (4)	Si consiglia di intervenire con microdosi non superando le 3 applicazioni. In caso di interventi con diverso frazionamento non superare il triplo della microdose indicata nella colonna a fianco (4) Impiegare esclusivamente sulle varietà di barbabietola da zucchero tolleranti alle solfoniluree
	Dicotiledoni e per la risoluzione di problemi particolari	Propyzamide Clopiralid (5) Lenacil Triflusulfuron-methyl (6)	Prodotti da utilizzare per interventi singoli o in combinazione con quelli consigliati per il contenimento di graminacee e Dicotiledoni sopra elencati (5) Evitare la miscela con Triflusulfuron-methyl (6) Evitare la miscela con graminicidi e Clopiralid. Impiegabile fino al 20/08/2024
	Graminacee	Clethodim Cicloxidim Propaquizafop Quizalofop p etile Fluazifop p butile	

Numero di interventi massimi consentiti con le sostanze attive candidate alla sostituzione (indicate in grassetto): 3.

Nel caso di impiego di miscele contenenti più sostanze attive candidate alla sostituzione vanno conteggiate le singole sostanze candidate (ad esempio, una miscela con 2 sostanze attive candidate alla sostituzione vale per 2 interventi)

N.B. Si ricorda che è sempre obbligatorio il rispetto di quanto riportato nell'etichetta di ciascun formulato commerciale.