

DISERBO ORTICOLE Lattuga 2026 v1

DISERBO ORTICOLE Lattuga 2026 v1						
Specifiche a livello regionale						1/1
Num. max inter. con i c.a.s	Numero di interventi massimi consentiti con le sostanze attive candidate alla sostituzione, indicate in grassetto: 2. Nel caso di impiego di miscele contenenti più sostanze attive candidate alla sostituzione, vanno conteggiate le singole sostanze candidate. Ad esempio, una miscela con 2 sostanze attive candidate alla sostituzione vale per 2 interventi					
Vincoli coltura						
Consigli coltura						
Epoca	Infestante	Sostanza attiva	Note sostanza attiva - vincoli	Note sostanza attiva - consigli	Note epoca	Informazioni aggiuntive
Pre semina e pre trapianto	Graminacee e Dicotiledoni	Acido pelargonico				
		Glifosate	<p>Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree¶</p> <p>Ogni azienda per singolo anno (1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari ¶</p> <p>a 2 L per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto. ¶</p> <p>Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha ammissibili è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte ¶ le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato. ¶</p> <p>Nel caso di due colture / anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per ciascuna delle colture.</p>	<p>Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.</p>		
Pre emergenza e pre trapianto	Graminacee e Dicotiledoni	Propyzamide	<p>Non usare sullo stesso appezzamento più di 2 volte all'anno.</p> <p>Attenzione alle colture in successione.</p>			
Pre trapianto	Dicotiledoni	Bifenox				
Pre trapianto e pre ricaccio	Graminacee e Dicotiledoni	Pendimethalin				
Post trapianto	Graminacee	Propaquizafop				
		Ciclossidim				
		Quizalofop-p-etile				
		Fluazifop-p-butile				
	Graminacee e Dicotiledoni	Propyzamide	<p>Non usare sullo stesso appezzamento più di 2 volte all'anno.</p> <p>Attenzione alle colture in successione.</p>			