

PESCO

VOCAZIONALITÀ PEDOCLIMATICA

Tenuto conto di quanto indicato nella Parte Generale e in quella introduttiva ai fruttiferi, si riportano di seguito le caratteristiche specifiche di questa coltura con obblighi e indicazioni utili.

Ambiente pedoclimatico

Il livello ottimale di attitudine dei suoli alla coltivazione del pesco (in condizioni irrigue, con clima locale non limitante e utilizzo di portainnesto "franco") prevede che la profondità utile di esplorazione radicale (profondità a strati limitanti gli apparati radicali escluso strati ghiaiosi se penetrabili dalle radici) sia > 100 cm, il drenaggio sia buono (ovvero l'acqua è rimossa dal suolo prontamente e/o non si verificano durante la stagione vegetativa eccessi di umidità limitanti per lo sviluppo della coltura), il calcare attivo <5%, la salinità (mS/cm) <2.

⇒ Non sono ammessi nuovi impianti in terreni che presentano anche una sola delle seguenti condizioni:

- profondità utile delle radici < 50cm;
- drenaggio imperfetto, lento o molto lento;
- tessitura molto fine con presenza di crepe profonde in caso di suolo asciutto;
- pH <5,4 e >8,8;
- calcare attivo (%) >8 (>13 con portainnesto GF677);
- salinità (mS/cm) > 3

Da un punto di vista climatico il pero non risulta essere una specie particolarmente esigente

TECNICA COLTURALE

Scelta varietale e del portainnesto

Tenuto conto di quanto indicato nella Parte Generale e nella premessa ai fruttiferi le varietà suggerite per la Regione Marche sono quelle riportate in coda alla presente scheda mentre nella tabella seguente sono indicati i portainnesti consigliati.

PORTINNESTO	ESIGENZE PEDOLOGICHE	RESISTENZA AVVERSITA'	COMPORAMENTO AGRONOMICO
Franco e cloni (<i>Prunus persica</i>)	Terreno vergine di medio impasto, tendenzialmente sciolto, non soggetto a ristagni idrici, fresco o irriguo; pH 6,6 - 7,5; CaCO3 attivo fino 5%.	-	Vigoroso, influisce positivamente su produttività e qualità dei frutti. Tuttavia, la selezione PSA5 di pesco franco riduce del 15 - 20 % la vigoria.
Ibrido pesco per mandorlo GF 677	Terreno sciolto, ben drenato, calcareo (CaCO3 attivo fino 12%); pH elevato; adatto per terreni ristoppiati.	Tollerante a <i>Meloidogyne incognita</i> (nematode galligeno); resiste alla siccità meglio del franco	Molto vigoroso (+10% rispetto al franco); ritarda la maturazione.
Mr.S. 2/5	Terreni irrigui di pianura; pH fino a 7,5; CaCO3 attivo fino a 9%; buona attitudine al ristoppio	-	Riduce del 15-20% la vigoria, rispetto al franco; poco "pollonifero".
ISHTARA®	Si adatta bene a terreni pesanti, calcarei, purché irrigui.	-	Riduce del 20-25% la vigoria rispetto al franco, pur garantendo un buon rinnovo vegetativo e un discreto sviluppo del tronco. Non pollonifero.

⇒ In caso di nuovo impianto devono essere rispettati i seguenti requisiti biometrici e qualitativi minimi del materiale vivaistico da impiegare:

- crescita eretta e regolare;
- con "saldatura integra" all'innesto (solo per astoni);
- assenza di segni di disidratazione (raggrinzimento);
- assenza di danni meccanici dovuti all'estirpazione in vivaio;
- non derivanti da reinnesto di materiale non attecchito o invenduto nelle campagne precedenti (solo astoni);

- uniformità della partita del materiale vivaistico;
- assenza di gravi ferite non cicatrizzate dovute a grandine.

SISTEMA D'IMPIANTO

Si consigliano i sest d'impianto a vasetto ritardato (sesto consigliato per vigoria elevata 6 x 4 - 3,5 m, per vigoria media 5,5 x 3,5 - 3 m e scarsa 5,5 x 2,5 m), palmetta (sesto consigliato per vigoria elevata 4,7 x 4 - 3,5 m, per vigoria media 4,5 x 3,5 - 3 m e scarsa 4,3 x 3 - 2,5 m) o fusetto (sesto consigliato per vigoria media 5 x 2 m, scarsa 4,5 x 1,5 m; sconsigliato per vigoria elevata)

FERTILIZZAZIONE

Si rimanda a quanto indicato nelle Norme Generali.

- ⇒ In fase di pre-impianto non sono ammesse concimazioni minerali azotate
- ⇒ In fase di allevamento (1° e 2° anno) sono ammessi apporti azotati solo localizzati con dose massima prevista ridotta rispetto alla fase di produzione
- ⇒ Non sono ammesse distribuzioni di azoto minerale prima della fase fenologica di "inizio fioritura"

POTATURA

Fase di produzione: potatura verde pre-raccolta: da eseguirsi preferibilmente in maggio ed in giugno, per favorire una razionale intercettazione dell'energia radiante in tutta la chioma e una migliore lignificazione dei rami.

Potatura verde post-raccolta: Sono consigliati, inoltre, interventi di pre-potatura a fine estate (tagli di ritorno e asportazione dei succhioni) al fine di favorire la lignificazione dei rami posti all'interno della chioma e spostare il completamento della potatura in un'epoca più prossima alla fioritura (o dopo la fioritura in varietà a rischio).

DIRADAMENTO DEI FRUTTI

Per ottenere effetti positivi sulla qualità dei frutti si può procedere al diradamento dei frutti fortemente consigliato prima dell'indurimento del nocciolo.

IRRIGAZIONE

Si rimanda alle indicazioni contenute nella Parte Generale e alla premessa ai fruttiferi.

RACCOLTA

La definizione del momento ottimale della raccolta può essere effettuata con diverse metodologie tenendo conto della scalarità della maturazione dei frutti, delle forti variabilità tra le diverse cultivar e della diversa reazione ai fattori pedoclimatici; per le percoche, il colore della polpa e quello "di fondo" della buccia rappresentano indici di primaria importanza.

⇒ **Varietà di pesco giudicate tecnicamente negative e che pertanto NON devono essere utilizzate per i nuovi impianti**

PESCHE BIANCHE

Cultivar	Maturazione 2012	+/- gg Roms (1)	Produzione	Calibro prev.	Consistenza	Sapore	RSR (%)	Acidità (meqNaOH/100g)	Punti Forti	Punti Deboli
Summer Sweet	09-ago	4	media	A-B	med-elev	med-elev	13,2	4,6	Buon sovracoloro. Frutto attraente di buon sapore. Subacida.	Vuoto e callo al nocciolo, verificare pezzatura ancora insufficiente. GTN

NETTARINA GIALLA

Cultivar	Maturazione 2012	+/- gg Roms (1)	Produzione	Calibro prev.	Consistenza	Sapore	RSR (%)	Acidità (meqNaOH/100g)	Punti Forti	Punti Deboli
Cinzia	08-giu	-58	media	D	med-elev	buono	9,7	15,8	Epoca di maturazione molto precoce, sapore e sovracoloro. Buona la consistenza e la tenuta in pianta. Interessante solo per epoca	Pezzatura e scarsa tenuta del frutto (allenta all'apice). In alcune annate presenza di Cracking. GTN
Gran Sun	15-giu	-51	scarsa	A-B	media	medio	9,8	12,5	Aspetto del frutto, sovracoloro, consistenza e sapore.	Produzione, pezzatura e tenuta del frutto. Monilia su frutto. GTN
Armking	18-giu	-48	media	A-B	med-elev	buono	14,0	15,1	Buona produzione, sapore, consistenza e sovracoloro. Interessante solo per epoca	Disformità di maturazione del frutto, sciolto, frutto umbonato. Necessita di diradamento tardivo per limitare fenomeni di spaccatura del frutto e favorire la pezzatura. GTN
Adriana	27-giu	-39	media	A-B	elevata	medio	10,8	13,3	Buon sapore, consistenza, tenuta e sovracoloro del frutto.	Pezzatura al limite. In alcune annate presenza di Cracking. GTN

Varietà di pesco consigliate per la Regione Marche
Pesche gialle

Cultivar	Maturazione 2012	+/- gg Roms (1)	Produzione	Calibro prev.	Consistenza	Sapore	RSR (%)	Acidità (meqNaOH/100g)	Punti Forti	Punti Deboli
Maycrest	07-giu	-59	media	B	med-elev	medio	10,0	10,0	Per l'epoca di maturazione interessante per produttività, sovracoloro e assenza di spaccature. Sufficiente la pezzatura, buona la consistenza.	Necessita di diradamento accurato, presenza di sciolto e lesioni sutura.
Rich May	08-giu	-58	media	B	med-elev	buono	12,0	12,2	Epoca di maturazione precoce, sovracoloro e consistenza.	Albero di scarsa vigoria, che necessita di potatura corta e ottimo diradamento.
<i>Tasty red</i>	09-giu	-57	media	A	med-elev	medio			Buon sapore e sovracoloro. Interessante l'epoca di maturazione. Aspetto del frutto.	Pezzatura e produzione da rivedere cucitura, maturazione disforme 2° produzione
Sagittaria	15-giu	-51	med-elev	B-A	med-elev	med-elev			Interessante per sovracoloro, sapore e assenza di spaccature. Sufficiente la pezzatura, buona la consistenza.	Pezzatura, necessita di diradamento accurato, rosso nella polpa.
Springbelle	20-giu	-46	media	A-B	med-elev	buono	10,8	13,7	cv storica, dalle buone caratteristiche produttive. Produzione elevata e costante, buon sovracoloro, consistenza e sapore.	Necessita di potatura invernale corta e di diradamento accurato per mantenere la pezzatura elevata e uniforme.

Velvet D31/10	21-giu	-45	med-elev	A	med-elev	medio			Produzione sovracolore	e	Consistenza e tenuta, presenza di scatolato, da verificare la pezzatura e sapore (acidulo)
Zee diamond	21-giu	-45	scarsa	A	media	buono	10,8	12,5			1° raccolta da rivedere
Crimson Lady	22-giu	-44	media	A-B	elevata	buono	10,8	12,6	Produzione e pezzatura sufficienti, consistenza, sovracolore.		Presenza sporadica di scatolato, pezzatura poco omogenea. Necessità di ottimo diradamento.
Ruby Rich	25-giu	-41	media	A-AA	med-elev	medio	9,0	10,0	Interessante per consistenza, pezzatura e sovracolore.		Forma del frutto leggermente triangolare, cucitura, polpa fibrosa e maturazione disforme.
<i>Coraline</i>	27-giu	-39	media	A-B	media	medio			Buon sovracolore e produzione		Frutto acidulo, presenza di umbone, 2° raccolta da rivedere
Royal Gem	28-giu	-38		A	elevata	med-elev			Produzione sovracolore		uniformità pezzatura, presenza occasionale di umbone
<i>Kalos 2</i>	28-giu	-38	media	A	med-elev	buono			Buon sapore (sub-acida), consistenza, sovracolore uniforme e intenso.		Pezzatura disforme sulla pianta, 1° raccolta, da rivedere
Maeba Star	01-lug	-35	media	A-AA	med-elev	buono	11,2	12,7	Sapore, pezzatura, consistenza, sovracolore e aspetto del frutto.		Maturazione disforme, cascola, scatolato e lesione cavità pedunculare.
<i>Kalos 3</i>	02-lug	-34	media	A	med-elev	med-elev	7,0	4,5	Sapore, consistenza, sovracolore, aspetto frutto.		Pezzatura disforme e produzione.
Royal Glory	05-lug	-31	med-elev	AA	elevata	buono	10,7	5,5	Buona produzione e pezzatura elevata. Interessante la consistenza, il sovracolore e tenuta del frutto.		Sapore subacido non troppo gradevole.
<i>Royal Jim</i>	08-lug	-28	scarsa	B	elevata	med-elev	nd	nd			1° raccolta, da rivedere.
Royal Majestic	12-lug	-24	media	A	elevata	med-elev	10,3	15,0	Pezzatura, consistenza e sapore. Sovracolore uniforme e diffuso		Produzione da rivedere. Rosso nella polpa che risulta fibrosa.
Cloe	14-lug	-22	med-elev	A	med-elev	med-elev	13,7	9,6	Produzione, pezzatura, sovracolore, sapore e consistenza.		sapore acidulo, cascola.
Rich Lady	17-lug	-19	media	A-AA	elevata	buono	11,9	12,7	Cv produttiva, pezzatura, consistenza. Interessante anche per sapore, sovracolore e tenuta del frutto. Sensibilità a monilia scarsa.		Presenza di leggera cucitura, l'elevato sovracolore evidente anche prima della maturazione può portare a raccolte anticipate di frutti non maturi.
<i>Kalos 4</i>	18-lug	-18	media	AA-A	elevata	med-elev			Consistenza, pezzatura, sapore		
<i>Royal Time</i>	18-lug	-18	media	AA	med-elev	med-elev	14,0	8,0	Gusto equilibrato, sovracolore elevato ed esteso, consistenza, produzione, tenuta del frutto		Da rivedere
Royal Summer	23-lug	-13	media	A-AA	med-elev	med-elev	14,2	3,8	aspetto, sapore consistenza del frutto e buona tenuta del frutto.		verificare la produzione, cascola pre-raccolta da rivedere
Maria Marta	25-lug	-11	media	AA-A	media	medio	12,4	11,2	Produzione e pezzatura medie, sapore medio-buono.		Difetta nel sovracolore (pesca tradizionale), nella consistenza e nella produzione non sempre costante. Pezzatura disforme. L'oggera cascola

<i>Royal Lee</i>	27-lug	-9	media	A	med-elev	med-elev	14,2	3,8	Consistenza del frutto. Buon sovracoloro ed aspetto del frutto. Sapore sub-acido ma gradevole.	Produzione da verificare. Pezzatura disforme.
Grenat	02-ago	-3	media	A	med-elev	medio	13,1	3,5	Aspetto, sapore consistenza del frutto . Sapore sub acido e buona tenuta del frutto.	Produzione al limite. Polpa poco croccante. Pezzatura disforme. Forma frutto
Elegant Lady	06-ago	1	media	AA	elevata	med-elev	12,0	10,6	Produzione, pezzatura e consistenza elevata; di interesse anche per sovracoloro frutto e sapore.	Possibile presenza di frutti con vuoti e callo al nocciolo.
Romestar	05-ago	0	media	A	elevata	medio	12,8	9,3	Buona produzione e consistenza del frutto.	Limiti nel sapore e nel sovracoloro poco esteso e di tonalità chiara. Vuoto e callo al nocciolo. Cultivar di riferimento
C16 - Velvet Sisters	08-ago	3	media	A-AA	elevata	medio	13,0	10,3	Buona consistenza, pezzatura e sovracoloro del frutto.	Sovracoloro chiaro. Limiti nel sapore acidulo.
Zee Lady	10-ago	5	media	A-AA	media	medio	12,0	11,7	Pezzatura elevata e uniforme.	Presenza vuoto e callo al nocciolo, sapore e produzione medi. Produzione.
Royal Pride	18-ago	13	media	A	media	med-elev	14,0	3,2	Buon sovracoloro consistenza ed aspetto del frutto. Sapore sub-acido ma gradevole.	Produzione da verificare. Pezzatura disforme. Frutto leggermente triangolare
<i>Rian Sun</i>	19-ago	14	media	A-AA	med-elev	medio	12,1	12,0	Buone consistenza e pezzatura.	Produzione al limite. Monilia.
Fayette	20-ago	15	elevata	A	elevata	med-elev	12,1	12,0	Pesca tradizionale; produzione e pezzatura elevate e costanti di buon sapore.	Scarso sovracoloro e linea di sutura con cucitura marcata.
<i>Royal Jim ® Zaigadi</i>	24-ago	19	media	A	elevata	med-elev	13,8	13,2	Sovracoloro, consistenza, sapore.	Pezzatura, necessita di ottimo diradamento. leggera cascola.
O'Henry	27-ago	22	med-elev	A-AA	med-elev	med-elev	10,8	11,1	Produzione e pezzatura sufficiente e costante. Buona consistenza, sovracoloro e sapore.	Occasionale presenza di lesioni alla sutura (cucitura).
Kaweah	29-ago	24	media	B	med-elev	medio	12,8	11,2	Buone la consistenza e la tenuta. Buon sapore. Tomentosità scarsa.	Frutto triangolare, rugginosità, callo al nocciolo, lesioni sutura. Produzione al limite, pezzatura
Guglielmina	10-set	36	media	A	med-elev	elevato	13,1	9,3	Per l'epoca di maturazione tardiva si distingue per produzione e pezzatura elevata e costante. Consistenza e sapore elevato.	Forma e colore del frutto poco attraenti, un po' di cucitura, cascola pre-raccolta e moniliosi dei frutti.
<i>Plus Plus</i>	07-set	33	media	A	med-elev	medio	n.d	n.d	Produzione	Callo nocciolo, pezzatura disforme. Frutto a volte triangolare e asimmetrico. 1° raccolta da rivedere
<i>Tardibelle</i>	12-set	38	media	A	med-elev	med-elev	12,0	14,5	Pezzatura , produzione e sapore. Da rivedere.	Sovracoloro chiaro, cascola pre-raccolta, frutto asimmetrico, triangolare.

in **grassetto** le cv giudicate come le migliori del periodo

in *corsivo*, le ultime introduzioni

(1) Differenza di maturazione in giorni da Romestar

Pesche bianche

Cultivar	Maturazione 2012	+/- gg Roms (1)	Produzione	Calibro	Consistenza	Sapore	RSR (%)	Acidità (meqNaOH/100g)	Punti Forti	Punti Deboli
Manon	20-giu	-46	media	A	med-elev	buono	11,0	5,0	Sovracolore, produzione, consistenza. Pesca sub acido	Pezzatura, lesioni sutura, cascola. Da rivedere.
UFO 3	23-giu	-43	med-elev	A	media	med-elev	10,6	4,3	Produzione, sovracolore . Platicarpa subacida.	Scarsa tenuta, spaccature all'apice, pezzatura disforme. Lesioni nella cavità calicina e peduncolare durante la raccolta.
UFO 4	29-giu	-37	med-scarsa	A	media	med-elev	10,8	4,0	Platicarpa subacida. Sapore, consistenza, pezzatura e sovracolore.	Scarsa tenuta, spaccature all'apice. Lesioni nella cavità peduncolare durante la raccolta. Pezzatura disforme
Stark Saturn	10-lug	-26	med-elev	A	med-elev	buono	11,8	4,4	Pesco platicarpa . Sapore subacido gradevole e aromatico, produttività elevata forma frutto particolare. Buona pezzatura.	Apice incavato con rugginosità e lievi spaccature, necessita di diradamento per migliorare la pezzatura. Lesioni nella zona peduncolare alla raccolta.
<i>Maura</i>	16-lug	-20	media	A-AA	med-elev	med-elev	12,0	12,5	Pesca classica, pezzatura, produzione, sapore.	Tenuta. Cascola pre-raccolta.
Alipersie	17-lug	-19	media	A	med-elev	med-elev	nd	nd	Buona pezzatura , sapore consistenza e sovracolore.	Da verificare la pezzatura diforme, tenuta.
Maria Bianca	23-lug	-13	media	AA	med-elev	med-elev	12,0	12,0	Produzione media, pezzatura e consistenza elevata, buon sapore. Di particolare interesse per questo areale di produzione.	Sovracolore scarso ma migliorabile con tecniche di potatura verde. Tenuta e cascola alla raccolta.
<i>Alirosada</i>	25-lug	-11	media	A-AA	media	med-elev	12,4	13,6	Sovracolore, produzione, sapore. Aspetto del frutto.	Frutto a volte disforme, triangolare e presenza di cucitura sulla linea di sutura. Tenuta
Sweet Cup	08-ago	3	media	A-AA	media	med-elev	14,3	4,8	Pesco platicarpa. Produzione, pezzatura, sovracolore e sapore. Frutto attraente di buon sapore,permette la realizzazione di una linea platicarpa a epoca di maturazione tardiva.	Cucitura. Rugginosità e fessurazione nella cavità calicina.
Benedicte	09-ago	4	media	AA	med-elev	med-elev	13,0	13,1	Pezzatura elevata, con produzione sufficiente	Consistenza, tenuta del frutto.
Tendresse	12-ago	7	media	A	media	medio	13,1	12,8	Interessante, pezzatura, produzione a volte incostante; buon sapore del frutto.	Forma del frutto irregolare di scarsa tenuta, sovracolore scarso e di tonalità chiara.
<i>Aliblanca</i>	20-ago	15	media	A	media	medio	13,8	10,4	Buona pezzatura, produzione e sovracolore.	Sapore acidulo. Frutto a volte disforme.Tenuta alla maturazione , leggera cascola pre-raccolta.
<i>Aliblanca</i>	20-ago	15	media	A	media	medio	13,8	10,4	Buona pezzatura e sovracolore.	Sapore non eccelso. Frutto a volte disforme. Produzione da verificare. 2° raccolta.
Maria Angela	23-ago	18	med-elev	AA	med-elev	med-elev	13,0	12,5	Tardiva, interessante per produttività, pezzatura e sapore (ottimo aroma).	Cascola pre-raccolta elevata, scarsa tenuta e occasionale presenza di callo e vuoto al nocciolo.
Maria Delizia	25-ago	20	media	A-AA	media	med-elev	11,4	12,6	Pezzatura, produzione e sapore.	Tenuta e sovracolore scarsi, presenza di monilia. Vuoto e callo al nocciolo. Cascola pre-raccolta.

Douceur	30-ago	25	media	B	med-elev	medio			Consistenza	Scarsa produzione e pezzatura insufficiente. Cascola pre-raccolta. Scartata
Gladis	12-set	38	media	A-B	med-elev	med-elev	14,3	13,3	Sapore e consistenza.	Sovracolore scarso, cascola pre-raccolta e lesioni sutura.

in **grassetto**, le cv giudicate come le migliori del periodo in *corsivo*, le ultime introduzioni

(1) Differenza di maturazione in giorni da Romestar, stimata al 5 agosto 2012

Nettarine gialle

Cultivar	Maturazione 2012	+/- gg Roms (1)	Produzione	Calibro	Consistenza	Sapore	RSR (%)	Acidità (meqNaOH/100g)	Punti Forti	Punti Deboli
e Diamond	22-giu	-44	media	B	med-elev	buono	8,5	11,2	Epoca di maturazione precoce, sapore, consistenza e sovracolore. Produzione sufficiente.	Pezzatura e rugginosità.
June Brite	22-giu	-44	med-scarso	B	med-elev	medio	10,3	15,3	Sapore, sovracolore e consistenza	Pezzatura, sapore acidulo
Rita Star	24-giu	-42	med-elev	A	elevata	buono	10,2	15,7	Interessante per il sovracolore elevato, la consistenza, il sapore, la produttività e la tenuta.	Pezzatura variabile (necessita di diradamento accurato), rugginosità. Presenza di cracking e monilia del frutto.
Big Bag	25-giu	-41	media	A	med-elev	med-elev.	10,1	6,7	Sapore, consistenza, consistenza e sovracolore.	Pezzatura disforme, rugginosità.
Laura	27-giu	-39	med-elev	A-AA	med-elev	buono	10,1	17,3	Interessante per il sapore, la consistenza e il sovracolore.	Tende a intenerire nella parte basale del frutto. Produzione incostante, rugginosità frutto.
<i>Bigi Lara</i>	01-lug	-35	media	A	med-elev	Med-elev	11,8	15,6	Consistenza, produzione, sovracolore, aspetto e sapore del frutto	Pezzatura disforme, rugginosità, sciolto e monilia.
Diamond Bright	01-lug	-35	scarsa	B	med-elev	medio	11,4	14,3	Sovracolore,	Produzione e pezzatura. Rugginosità e spaccature.
<i>Big Sunshine</i>	01-lug	-35	med-elev	A-B	media	med-elev	11,3	13	Sapore, sovracolore, produzione e pezzatura.	Pezzatura non uniforme, cascola, forma frutto.
<i>Alice</i>	01-lug	-35	media	A-B	med-elev	buono	10,8	13,8	Pezzatura, sovracolore e sapore.	Sapore acidulo, cascola pre-raccolta, leggera rugginosità. Produzione incostante.
<i>Cristina</i>	01-lug	-35	media	A	med-elev	med-elev	10	13,7	Sovracolore, aspetto del frutto, produzione, pezzatura, sapore e consistenza.	Uniformità della pezzatura, forma del frutto leggermente triangolare. Rugginosità.
Big Haven	03-lug	-33	media	A-B	med-elev	med-elev	12,4	14,9	Aspetto del frutto, sovracolore e consistenza.	Produzione da verificare. Monilia su frutto.
Alice	04-lug	-32	media	A	med-elev	buono	10,8	13,8	Pezzatura, sovracolore e sapore.	Sapore acidulo, cascola pre-raccolta, leggera rugginosità. Produzione incostante.
Super Crimson Gold	06-lug	-30	med-elev	A	med-elev	buono	13,2	16,8	Buona la pezzatura, il sovracolore e il sapore con produzione sufficiente.	Presenza di rugginosità, cascola pre-raccolta.
Big Top	10-lug	-26	Med-elev	A	Med-elev	elev			Pezzatura, sovracolore, consistenza, sapore, tenuta	Produzione a volte insufficiente,
Maria Dorata	12-lug	-24	media	A-B	med-elev	elevato	9,0	12,5	Colore di fondo, produzione, consistenza sapore.	Pezzatura, alcune spaccature, nocciolo grande. Sensibilità alla monilia, leggera cascola pre-raccolta e scarsa tenuta del frutto.

Guerriera	14-lug	-22	med-elev	A-AA	media	med-elev	13,2	8,6	Produzione sapore e sovracolore.	Pezzatura disforme e tenuta del frutto alla maturazione. Presenza occasionale di umbone. Frutto allungato e dal sapore acidulo.
Eureka	15-lug	-21	media	A	media	medio	12,1	11,1	Pezzatura produzione e sovracolore (90%)	Maturazione disforme del frutto, monilia, cascola pre-raccolta, vuoto al nocciolo. Scatolato. Forma frutto.
Honey Kist	15-lug	-21	media	A	med-elev	med-elev	n.d.	n.d.	Buona consistenza e sapore.	1° produzione
Spring Red	15-lug	-21	media	A-B	media	buono	12,0	17,5	Produzione, sovracolore e sapore.	Frutto disforme.
Antony	15-lug	-21	med-elev	A	med-elev	med-elev	10,8	12,1	Sapore, pezzatura, consistenza e sovracolore. Polpa croccante.	Rugginosità del frutto, callo al nocciolo
Maria Carla	16-lug	-20	med-elev	A	med-elev	medio	11,4	13,9	Sovracolore, sapore, produzione e pezzatura.	Produzione, sapore acidulo, rugginosità, pezzatura disforme.
Romagna Big	19-lug	-17	med-elev	A-AA	med-elev	med-elev	13,0	6,0	Aspetto e consistenza del frutto, pezzatura, sapore sub-acido, sovracolore.	Occasionale presenza di rugginosità, da rivedere
Romagna Gold	19-lug	-17	scarsa	AA-A	med-elev	med-elev	n.d.	n.d.	Aspetto e consistenza del frutto, pezzatura, sapore e sovracolore.	da rivedere
Alitop	19-lug	-17	med-elev	A	med-elev	med-elev	13,8	7,5	Pezzatura, sovracolore, consistenza e sapore.	Leggera cascola pre-raccolta. Pezzatura poco uniforme. Rugginosità
Amiga	22-lug	-14	media	A-AA	med-elev	med-elev	12,0	17,0	Pezzatura, consistenza e sovracolore.	Incostanza di produzione. Frutto asimmetrico
Corindon	25-lug	-11	media	A-B	med-elev	medio	n.d.	n.d.	Buon sapore, sovracolore, consistenza e pezzatura.	Produzione, pezzatura, da verificare. 1° raccolta
Fire Top	26-lug	-10	med-elev	A	med-elev	med-elev	10,8	16,0	Produzione, consistenza, sovracolore e sapore.	sapore a volte acidulo, corineo, pezzatura variabile
Stark Redgold	03-ago	-2	media	AA-A	med-elev	med-elev	13,0	19,0	Buona la consistenza e il sapore e le caratteristiche organolettiche.	Presenza di rugginosità, produzione incostante e necessita di ottimo diradamento.
Early Zee	05-ago	0	med-elev	A	med-elev	medio	n.d.	n.d.	Buona consistenza, produzione.	sapore acidulo, pezzatura disforme, 2° raccolta, da rivedere
Romagna Queen	07-ago	2	med-elev	AA-A	med-elev	med-elev	14,0	5,6	Aspetto e consistenza del frutto, pezzatura, sapore e sovracolore.	Rugginosità, 1° raccolta, da rivedere
Honey Royal	07-ago	2	media	A	med-elev	med-elev	16,2	5,4	Sapore sub-acido. Buona consistenza, pezzatura e sapore.	Verificare la produzione, leggera rugginosità, 1° produzione
Honey Glo	08-ago	3	media	A	med-elev	med-elev	16,0	4,5	Sapore sub-acido. Buona consistenza, pezzatura e sapore.	Verificare la produzione, pezzatura disforme, leggera rugginosità, 1° produzione
Nectaross	10-ago	5	elevata	A-AA	med-elev	med-elev	12,5	15,8	Buona la produzione, la pezzatura, le caratteristiche organolettiche e il sovracolore	Sporadica presenza di scatolato e rugginosità sui frutti
Alma	12-ago	7	med-elev	A-AA	med-elev	med-elev	15,2	17,0	Buona consistenza produzione e pezzatura.	Rugginosità frutti, sapore acidulo, 1° produzione
Romagna Giant	15-ago	10	media	AA-A	med-elev	med-elev	15,3	5,2	Aspetto e consistenza del frutto, pezzatura, sapore e sovracolore.	Rugginosità, leggera cascola, 1° raccolta, da rivedere
Max	15-ago	10	med-elev	AA	med-elev	med-elev	12,0	13,2	Cultivar interessante per produzione, pezzatura, sovracolore e consistenza e sapore.	Presenza di monilia sui frutti. Necessita di potatura verde per migliorare il sovracolore. Rugginosità.
Venus	16-ago	11	med-elev	AA	med-elev	med-elev	13,0	14,6	Frutto di bell'aspetto, attraente, buona la pezzatura, le caratteristiche organolettiche e in la consistenza.	Necessita di potatura verde per migliorare il sovracolore. Sporadica presenza di vuoto e callo al nocciolo

Morsiani 60*	18-ago	13	media	A	med-elev	medio	nd	nd	Pezzatura, consistenza, sovracoloro, produzione.	Sapore al limite, cascola pre-raccolta, rugginosità e monilia.
Orion	19-ago	14	media	A-AA	med-elev	med-elev	10,2	13,0	Buone le caratteristiche organolettiche, il sovracoloro e la consistenza. Buona la tenuta del frutto	Produzione a volte incostante. Cascola pre-raccolta. Sporadica presenza di rugginosità, scatola, vuoto e callo al nocciolo.
Sweet Red	20-ago	15	media	A	med-elev	med-elev	14,0	17,5	Buone le caratteristiche organolettiche, la consistenza e il sovracoloro	Presenza di rugginosità e scatola, moniliosi.
Maria Dolce	26-ago	21	med-elev	A	med-elev	med-elev	13,9	3,6	Interessante per produzione medio-elevata e costante, buona consistenza, di sapore subacido ma molto gradevole.	Leggera rugginosità su frutto, presenza di callo al nocciolo, difetta nel sovracoloro (poco accentuato e disforme).
<i>Francesca</i>	02-set	28	media	A	med-elev	med-scarso	13,0	17,3	Produzione e consistenza . Buon sovracoloro	Cracking, rugginosità dei frutti , prima raccolta da rivedere.
August Red*	08-set	34	med-elev	A	med-elev	medio	15,8	20,5	Consistenza	Pezzatura, cascola, monilia, vuoto e callo nocciolo, scarso sovracoloro.
<i>Fairlane*</i>	18-set	44	med-elev	A	med-elev	medio	nd	nd	Produzione, consistenza.	Sapore al limite, sovracoloro al limite. Da rivedere
<i>Max 7*</i>	20-set	46	media	A	med-elev	med-elev	13,7	20,3	Sapore, pezzatura e consistenza.	Sovracoloro al limite, cascola pre-raccolta

in **grassetto**, le cv giudicate di maggiore interesse

in *corsivo*, le nuove introduzioni del 2011

(1) Differenza di maturazione in giorni da Romestar, stimata al 5 agosto 2012

Nettarine bianche

Cultivar	Maturazione 2012	+/- gg Roms (1)	Produzione	Calibro	Consistenza	Sapore	RSR (%)	Acidità (meqNaOH/100g)	Punti Forti	Punti Deboli
<i>Romagna Red</i>	02-lug	-34	med-elev	B	med-elev.	buono			Buone caratteristiche organolettiche, pezzatura e produzione.	Presenza di sciolto, forma del frutto a volte irregolare, scarsa tenuta alla maturazione.
Caldesi 2000	02-lug	-34	med-elev	A	media	buono	11,9	15,6	Buone caratteristiche organolettiche, pezzatura e produzione.	Presenza di sciolto, forma del frutto a volte irregolare, scarsa tenuta alla maturazione.
Iris Rosso	09-lug	-27	media	A	media	medio	10,0	11,8	Produzione costante, buona pezzatura, sovracolori sufficienti.	Presenza di sciolto, limiti nella consistenza e tenuta del frutto. Cascola pre-raccolta.
<i>Romagna Star</i>	10-lug	-26	Med-elev	A-B	med-elev	med-elev	15,9	3,8	Aspetto e consistenza del frutto, sapore e sovracolori. Sub-acida	da rivedere
<i>Concettina</i>	13-lug	-23	elev.	A	med-elev.	buono	12,3	5,7	Sovracolori, buon sapore, aspetto del frutto. Nettarina platicarpa con limitate spaccature alla cavità calicina. Sapore sub-acido.	
<i>Magique</i>	18-lug	-18	media	A	med-elev	med-elev	13,0	8,6	Aspetto frutto, sovracolori, consistenza, sapore e pezzatura	Produzione non molto elevata. Oidio, Presenza occasionale di rugginosità.
<i>Romagna Top</i>	19-lug	-17	media	A	med-elev	med-elev	14,8	3,7	Sapore Sub-acido, aspetto e consistenza del frutto, sovracolori.	Pezzatura, da rivedere.
<i>Romagna Bright</i>	30-lug	-6	media	A-AA	med-elev	med-elev	13,5	19,7	Aspetto e consistenza del frutto, sapore e sovracolori.	Pezzatura, leggera cascola, da rivedere
<i>Romagna 3000</i>	31-lug	-5	media	A-B	med-elev	med-elev	n.d.	n.d.	Aspetto e consistenza del frutto, sapore e sovracolori.	Presenza di spaccature, rugginosità, da rivedere
Silver Giant	07-ago	2	media	A-AA	med-elev	medio	11,6	11,5	Sovracolori, pezzatura, consistenza e sapore	Rugginosità, produzione da verificare.
Caldesi 2010	10-ago	5	med-elev	AA-A	media	elevato	11,5	13,0	Ottimo aroma e pezzatura del frutto.	Frutti poco attraenti per sovracolori e colore di fondo verde, forma un po' irregolare e presenza di vuoto e callo al nocciolo.
Silver Moon	27-ago	22	media	A	media	medio			Pezzatura	Rugginosità e monilia, sapore al limite, produzione incostante, maturazione scalare,

in **grassetto**, le cv giudicate di maggiore interesse

in *corsivo*, le nuove introduzioni del 2011

(1) Differenza di maturazione in giorni da Romestar, stimata al 5 agosto 2012

Percoche

Cultivar	Maturazione 2012	+/- gg Roms (1)	Produzione	Calibro	Consistenza	Sapore	RSR (%)	Acidità (meqNaOH/100g)	Punti Forti	Punti Deboli
Jonia	17-giu	-49	media	B	med-elev	buono	11,0	11,3	Sapore, aspetto frutto, consistenza, produzione. Interessante per epoca di maturazione precoce per una percoca	Pezzatura insufficiente, lesioni alla sutura, tenuta del frutto.
Egea	06-lug	-30	media	B	med-elev	med-elev	15,0	6,5	Produzione, consistenza e sapore.	Pezzatura e tenuta. Scartata
Romea	12-lug	-24	Elevata	A	media	med-elev	8,4	11,7	Prodttività e caratteristiche organolettiche	A volte rosso al nocciolo
Carson	27-lug	-9	med-elev.	A-AA	media	medio	10,0	7,7	Interessante per la produzione e pezzatura del frutto.	
Andross	16-ago	11	med-elev.	AA	elevata	med-elev	14,0	7,6	Produzione e pezzatura elevata, frutti di buon sapore.	Cascola in pre-raccolta.
Jungermann	22-ago	17	med-elev.	A-AA	media	med-elev	12,2	10,3	Pezzatura, sapore.	Colore di fondo verde.
Baby Glold 9	05-set	31	media	A	med-elev	med-elev	12,0	8,4	Pezzatura e sapore.	Ottimo diradamento per pezzatura. Leggera cascola pre-raccolta.

in **grassetto**, le cv giudicate di maggiore interesse
in *corsivo*, le ultime ntroduzioni

(1) Differenza di maturazione in giorni da Romestar, stimata al 5 agosto 2012